



6nd





Flora von Mecklenburg

in

geographischer, geschichtlicher, systematischer,
statistischer u. s. w. Hinsicht geschildert

von

Ernst Boll.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

Neubrandenburg.

C. Brunsow. 1860.

Grundriss von Meissen

Separatabdruck aus dem Archiv des Ver. der Freunde der
Naturgeschichte in Meissenburg J. XIV.

	S.
Einleitung	1
I. Die Artenrechte	4
Wandelbarkeit der Wasserpflanzen	9
Einfluß des salzhaltigen Bodens	14
Aufzählung der Pflanzenvarietäten unserer Flora	18
Die Bastardbildungen	20
II. Die Pflanzennamen	25
Die lateinischen Gattungs- und Speciesnamen	25
Die plattdeutschen Pflanzennamen	27
III. Das Bürgerrecht	41
1. Die eingeborenen Pflanzen	42
2. Die eingebürgerten Pflanzen	43
3. Die erratischen (verwilderten und verirrt) Pflanzen Aufzählung aller diesen drei Classen angehörigen Pflanzen	45 48
IV. Geographische Verbreitung der Pflanzen	54
1. Die Haideflora	57
Der Elbstrand und die Lewitz	68
2. Die Sandflora	70
3. Die Lehmflora	74
Die Umgegend von Neubrandenburg	76
Die Tollenze und andere Landseen	87
4. Die Seestrands- und Salinenflora	90
5. Die Ostsee-Flora	96
V. Die Blüthezeit	98
Pflanzenkalender für Mecklenburg	100
VI. Die Nutzpflanzen und Giftpflanzen	110
1. Pflanzen die zu culinarischen u. dgl. Zwecken dienen Geschichte derselben	111 115
2. Die officinellen Pflanzen	117
3. Aenderweitige Nutzpflanzen	127
4. Zauberpflanzen	129
5. Zierpflanzen	131
6. Giftpflanzen	135

	S.
VII. Geschichte unserer Flora	141
Literatur der Flora, chronologisch geordnet . . .	141
Die mecklenburgischen Botaniker und ihre Leistungen, alphabetisch geordnet	146
Botan. Garten in Rostock und einige andere histor. Notizen	178
VIII. Statistil der Flora	179
Tabelle über die Entdeckungen der einzelnen Botaniker	179
Tabelle über die in den einzelnen Decennien gemachten Entdeckungen	182
Statistil der Phanerogamen; vielleicht noch zu ent- deckende Arten	182
Statistil der Farne; noch zu entdeckende Arten . .	192
der Laubmoose; desgl.	192
der Lebermoose; desgl.	193
der Algen; desgl.	194
der Flechten	197
der Pilze	198
IX. Systematische Aufzählung der Pflanzen . . .	201
1. Dicotyledonen	203
2. Monocotyledonen	302
3. Farne	326
4. Laubmoose	330
5. Lebermoose	342
6. Algen	346
7. Flechten	355
8. Pilze	362
X. Schluß (Berichtigungen und Zusätze)	393
Register der Gattungsnamen	398

Die Botanik ist die Wissenschaft, mit welcher ich meine naturhistorischen Studien zuerst begonnen habe. Schon im J. 1839 legte ich dem leider so früh verstorbenen Prof. Meyen in Berlin, dessen anregende botanischen Vorlesungen ich damals besuchte, eine von mir gefertigte tabellarische Uebersicht der mecklenburgischen, pommerschen und holsteinischen Flora vor, und wurde von ihm zur Herausgabe derselben ermuntert. Die Veröffentlichung unterblieb aber, theils weil bald darauf andere Studien mich mehr fesselten, theils aber, weil ich Gelegenheit hatte mich zu überzeugen, wie sehr alle Ausgaben der gedruckten Florenverzeichnisse jener drei Länder, die ich bei der erwähnten Arbeit als Quellen benutzt hatte, einer sorgfältigen kritischen Revision bedurften, bevor sich ein zuverlässiges Resultat aus ihnen gewinnen ließe. Ich gab daher meinen Plan auf, und wendete nun fast gänzlich meine Thätigkeit einem noch brachliegenden Felde der vaterländischen Naturkunde zu, nämlich der Erforschung der Geognosie Mecklenburgs, indem ich mir dabei im Stillen mit der Hoffnung schmeichelte, daß inzwischen einer unserer vielen Botaniker, die das Studium der heimischen Flora ausschließlicher betrieben, als dies mit mir der Fall gewesen

war, uns mit einer neuen, sorgfältig gesichteten Uebersicht derselben beschenken würde.

Da aber diese Hoffnung unerfüllt blieb, entschloß ich mich endlich selbst wieder die Hand an das Werk zu legen. Mein früherer Plan genügte mir aber jetzt nicht mehr, denn seit dem J. 1839 hatten meine Anforderungen an eine Landes-Flora sich wesentlich gesteigert und erweitert. Dadurch aber waren auch die Schwierigkeiten, die sich mir in den Weg stellten, nur um so größer geworden, und oft noch, selbst nach dem Beginne der neuen Arbeit, war ich im Begriffe die Feder niederzulegen, weil ich fürchtete, meine Kräfte würden für dieselbe nicht ausreichen. Aber das lebhafteste Interesse, welches ich an der Sache selbst nahm, gestattete mir nicht, mich von derselben wieder los zu machen. So habe ich denn, freilich mit vielen Unterbrechungen, die Arbeit fortgesetzt, und sie nun, zwar nicht vollendet, aber doch zum Abschluß gebracht, was mir darum nöthig zu sein schien, weil sie mir täglich unter den Händen mehr und mehr anwuchs, und sie das bescheidene Maaß, welches die Geldmittel unseres Vereins für den Druck vorschreiben, weit zu überschreiten drohete.

Die Hilfsmittel, die mir bei dieser Arbeit zu Gebote gestanden haben, waren theils die sämmtlichen älteren, in dem langen Zeitraume von mehr als achtzig Jahren von den Freunden unserer Flora beschafften und an Werth sehr ungleichen literarischen Materialien, welche es hier nicht bloß zu sammeln, sondern auch zu prüfen, zu sichten und auf's Neue zu verarbeiten galt, — theils neue Mittheilungen vieler kenntnißreicher Botaniker, wie des Hrn. Dr. Wetke in Penzlin, des Hrn. Ober-Medic.

Nath Dr. G. Brückner in Ludwigslust, des Hrn. Dr. Fiedler in Dömitz, des Hrn. Pastor C. Griewank in Dassow, des Hrn. Apotheker F. Timm in Malchin, des Hrn. Dr. Weidner in Sülz, des Hrn. Zabel in Greifswald, des uns leider inzwischen durch den Tod entrissenen Wüstnei in Schwerin u. m. a., denen ich hier noch einmal öffentlich meinen Dank für ihre Mitwirkung ausspreche; endlich auch noch meine eigenen auf zahlreichen Excursionen in verschiedenen Landestheilen gesammelten Erfahrungen. — Die Art, wie diese Materialien verwendet sind, habe ich allein zu verantworten.

Die Aufgaben, welche ich mir zu besprechen gestellt habe, sind in der Kürze folgende: Erforschung der für viele Pflanzen unserer Flora noch streitigen Artenrechte; Feststellung der Pflanzennamen; Ermittlung derjenigen Pflanzenspecies, denen wirklich das Bürgerrecht in der mecklenburgischen Flora zukommt, sowie die Berichtigung ihrer Fundorte; Darlegung der geographischen Verbreitung dieser Pflanzen und Sonderung derselben in Gruppen, welche verschiedenen Perioden der Blüthezeit entsprechen; Angabe des Nutzens und Schadens, den die einheimischen Pflanzen stiften; Erörterung der Geschichte und Statistik unserer Flora; endlich eine systematische Aufzählung aller vom J. 1777 bis zum J. 1860 in Mecklenburg entdeckten Pflanzen. — Wir wollen diese einzelnen Punkte in dem Nachfolgenden noch etwas genauer ins Auge fassen. Wie aber immer aus denselbigen farbigen Glasstückchen durch Herumdrehen des Kaleidoskops verschiedenartige Bilder hervorgebracht werden, muß auch ich zu den floristischen Bildern, die ich hier vorzuführen gedenke, mich immer derselben Objecte bedienen.

Die Gefahr, den Leser durch dies Verfahren zu ermüden, liegt sehr nahe, und ich bitte daher um Nachsicht, wenn es mir nicht gelingen sollte, diese Klippe glücklich zu umschiffen.

I. Die Artenrechte.

Was zunächst die Abgränzung der einzelnen Pflanzenarten gegen einander betrifft, so fühle ich selbst sehr wohl, daß mir die Lösung dieser schwierigsten meiner Aufgaben nur sehr unvollkommen gelungen ist, und daß ich wahrscheinlich bei sehr vielen Botanikern durch die hier von mir befolgten Grundsätze großen Anstoß erregen werde. Ich kann mich nämlich, so weit meine eigenen Forschungen reichen, nicht davon überzeugen, daß alles das, was man in neuester Zeit als Species in Anspruch genommen hat, auch wirklich eine solche sei, sondern glaube, daß gar vieles ganz anders aufgefaßt werden müsse. Man hat sich hier (wie so oft nicht bloß im Leben, sondern auch in der Wissenschaft,) vor den Extremen zu hüten: der Speciesbegriff darf nämlich weder einem weiten Reifemantel gleichen, unter dem man gar manche Contrebande mit fortzuschaffen kann, noch auch einer Zwangsjacke, welche ihrem Träger auch nicht die geringste freie Bewegung gestattet. Während die älteren Botaniker gar häufig in das erste dieser beiden Extreme verfielen, sind in neuester Zeit die Floristen noch viel häufiger auf den zweiten jener Irrwege gerathen: Sie haben die Species mit wahrer „Kümmelspalterei“ auf die allerfeinlichsten Unterschiede begründet, und wenn sie dann die geringste Abweichung von dem Signalement auffinden, sind sie sogleich mit der Aufstellung einer neuen Species

fertig. Auf diese Weise sind in neuerer Zeit selbst sehr ansehnliche phanerogamische Pflanzenarten in mehrere Species zerlegt worden, welche in ihrem ganzen Habitus sich so gleich sind, daß man die Unterschiede kaum herausfinden kann. Aber die Natur spottet dieses künstlich hinaufgeschraubten Speciesbegriffes. Sie rächet sich an den Botanikern durch endlosen Hader über diese angeblichen Arten und durch endloses Verkennen derselben, indem sie sich in ihren Schöpfungen den so sehr ins Kleinliche gehende Diagnosen nicht immer gelassen fügt. Daher die vielen unglückseligen neuen Namen, welche die Folgen dieses Zwistes zu sein pflegen, und welche sicherlich da zum Vorschein kommen, wo die Pflanze sich nicht ganz genau dem polizeilichen Signalement der Diagnose anpassen will. So wächst die Masse der Synonymen lawinenartig von Tage zu Tage, und drohet mit baldigem Sturze Floras Reich unter einer starren und undurchdringlichen Decke zu begraben. — Und welcher Inconsequenz machen sich nicht die Naturforscher (denn das hier Gesagte gilt nicht von den Botanikern allein,) in der Verfolgung dieses Weges schuldig? Während sie einerseits durch die geringste Abweichung im Bau der Pflanzen und Thiere zur Creirung einer neuen Species sich berechtigt glauben, vertheidigen sie (wenigstens der Mehrzahl nach) noch immer die ebenso unberechtigte Meinung, daß alle habituell so sehr differirenden Menschen- und Hunderacen nur je eine einzige Species bildeten. Das heißt doch in der That Rücken durchseihen und Kameele mit Haut und Haar hinunterschlucken!

Wären die Floristen nicht so sehr dazu geneigt jede Erscheinung im Pflanzenreiche so isolirt aufzufassen, ohne

auf die Analogien Rücksicht zu nehmen, welche andere Pflanzen und selbst die Thierwelt darbieten, und welche zur Deutung des einzelnen vorliegenden Falles oft von großer Wichtigkeit sein können, so würde man den Speciesbegriff nicht willkürlich in so sehr enge Gränzen eingezwängt haben. Aber die subjective Beschaffenheit dieses künstlichen Begriffs verkennend, glaubt man daß er objectiv in der Natur begründet sei. Auch leistet ihm das fast jedem Floristen, man möchte sagen, angeborne Verlangen, als der Entdecker einer neuen Pflanzenspecies genannt zu werden, nicht geringen Vorschub, da es bei engen Speciesdefinitionen am leichtesten zu befriedigen ist. Ebenso auch die Sucht, für die Flora seines eigenen Landes eine möglichst große Anzahl von Pflanzenarten herauszurechnen; denn wie der erste jugendliche Ehrgeiz sich darin zu zeigen pflegt, daß jeder Knabe den Kirchturm seines Wohnortes für den höchsten hält, scheint der floristische Ehrgeiz sehr häufig darin gesetzt zu werden, daß man sich bemühet aus seinem Landesgebiete die möglichst größte Anzahl von Pflanzenarten namhaft zu machen.

Manche berühmte Botaniker sind erst mit zunehmenden Jahren auf den bezeichneten Abweg gerathen, wie z. B. C. Fries, dessen vielfache großen Verdienste um die Wissenschaft ich gewiß nicht verkenne; überblicke ich aber die ganze Reihe seiner botanischen Arbeiten, wie sie der Zeit nach auf einander folgen, werde ich recht lebhaft an die Gefängnisse erinnert, deren sich die Inquisition in Venedig bedient haben soll, und die angeblich so eingerichtet waren, daß ihre beweglichen Wände täglich mehr und mehr sich näherten, bis endlich der unglückliche In-

fasse zwischen ihnen zerbrückt wurde. Ebenso beweglich rücken die Speciesgränzen von Jahr zu Jahr näher zusammen. Dies ist ganz besonders bei Fries der Fall, wenn man seine früheren Arbeiten mit den späteren vergleicht; wie liberal und philosophisch spricht er sich in jenen (namentlich in den *Novitiis*) über die Natur der Species aus, und wie verfäht er nachher in der *Summa vegetabilium* nach ganz anderen Grundsätzen, wo nun, nachdem das Eis einmal durchbrochen, und die frühere Scheu neue Arten aufzustellen überwunden ist, eine *nova species* über die andere zum Vorschein kommt.

Langjährig fortgesetzter Verkehr mit der Natur, der nicht auf das Pflanzenreich allein beschränkt blieb, und bei welchem es mein hauptsächlichstes Bestreben war, ohne mich durch herkömmliche Meinungen leiten zu lassen, mit möglichst unbefangenen Blicke selbst zu prüfen, hat mich zu der Ueberzeugung hingeführt, daß wir die Hunderttausende von organischen Wesen, welche den Erdball bewohnen, überhaupt gar nicht mit einem und demselben starren Speciesmaasse messen dürfen.

Eine sehr große Anzahl derselben scheint zwar allerdings bei ihrem ersten Entstehen ein ganz bestimmtes Gepräge erhalten zu haben, von welchem die einzelnen, zu dieser Art gehörigen Individuen wenig oder gar nicht abweichen. Diese sind daher so unbeugsamen Characters, daß sie, wenn sie verschiedenen Lebensbedingungen ausgesetzt werden, dieselben, falls sie kräftig genug dazu sind, ertragen ohne sich zu verändern, oder sie erliegen den Einflüssen dieser neuen Bedingungen und gehen zu Grunde. Species von dieser Beschaffenheit gränzen sich

scharf und leicht von einander ab, weshalb ihre Determination und Classificirung den Botanikern und Zoologen keine große Schwierigkeit bereitet.

Es giebt aber neben diesen Arten auch noch gar viele organische Wesen, welche kein so unwandelbares Gepräge erhalten haben, sondern welchen eine größere Freiheit in der Entwicklung ihrer Formen verliehen ist, weshalb man sie in der beschreibenden Botanik und Zoologie nicht mit demselben starren Maaße messen darf, wie jene. Sie schwanken in ihren Formen um einen gewissen Mittelpunkt herum, indem sie einen kleineren oder größeren Cyclus von Abänderungen durchlaufen, und ihre Formen sich bald nach der einen, bald nach der andern Seite hin von dem Grundtypus entfernen. Was in jedem einzelnen Falle die Ursache sei, warum sie gerade nach dieser oder jener Richtung hin abändern, kann bei der großen Complication der Ursachen, und bei der geringen Aufmerksamkeit, welche man diesem Gegenstande bis jetzt gewidmet hat, nur erst selten nachgewiesen werden. Eine sehr wichtige Rolle bei diesem Formenwechsel spielen die veränderten Lebensbedingungen, denen diese Wesen ausgesetzt werden; es kommen dabei aber auch noch andere Ursachen ins Spiel, denn die Erfahrung hat gezeigt, daß Varietäten trotz eines Wechsels der Lebensbedingungen ihre Eigenthümlichkeiten von Generation zu Generation vererben können.

Unter jenen Lebensbedingungen, welche so wesentlich zu diesem Formenwechsel beitragen, verstehe ich Alles, was von außen her auf die organischen Wesen einwirkt: Temperatur, Druck und Feuchtigkeitsverhältnisse der

Luft, sonnigen oder schattigen Standort, geognostische und chemische Beschaffenheit des Bodens, und bei den Wasserpflanzen die Beschaffenheit des Wassers, in welchem sie leben, ob es leicht oder tief, ruhig oder bewegt, klar oder schlammig, süß oder salzig sei. Gerade diese letztere Klasse von Organismen, welche so ganz unter dem Einflusse eines Mediums stehen, das viel kräftiger auf sie einwirkt, als die Luft auf die in ihr lebenden Landpflanzen und Landthiere, zeigen fast alle eine der großen Veränderlichkeit jenes Mediums entsprechende Unbeständigkeit ihres Characters, welche z. B. bei den Algen so groß ist, daß Kützting durch das specielle Studium dieser Pflanzenklasse sogar zu dem Ausspruch veranlaßt ist: „es gäbe keine feststehende Species in der Natur, und alle Bestrebungen für exacte Begrenzung der Species seien unnütz.“

Dennoch bemühen sich die Botaniker unablässig diese protelischen Gestalten zu erfassen, aber vergebens! Die Pflanzen des süßen Wassers (denn diese trifft das hier Gesagte vorzugsweise, da das Meereswasser auf großen Räumen einen viel beständigeren Character zeigt,) lassen sich nun einmal nicht in enge Speciesgränzen einzwängen. Hätten die Botaniker nur den verwandten Bestrebungen der Zoologen größere Aufmerksamkeit geschenkt, so würden sie durch die trauerigen Erfahrungen, welche z. B. die Conchyliologen in Betreff der Formveränderlichkeit der Süßwassermollusken gemacht haben, an dem Erfolge ihrer eigenen Bestrebungen schon etwas zweifelhafter geworden sein. Mit der Gattung *Unio* z. B. war man in Deutschland schon bis zu mehr als 30 Arten hinaufgestiegen und noch immer fanden sich neue Formen, die sich den zahl-

reichen Diagnosen nicht anpassen wollten und daher mit demselben Rechte, wie ihre unfügsamen Vorgänger, zu neuen Arten erhoben werden mußten, als endlich tüchtige Forscher den eingeschlagenen Irrweg erkennend, die proteische Natur der Unionen richtig würdigten, und eine massenhafte Reduction der angeblichen Arten vornahmen.¹

Ähnlich verhält es sich mit den Pflanzen der süßen Gewässer, wofür uns sogleich eine der ersten Gattungen der mecklenburgischen Flora ein lehrreiches Beispiel darbietet. *Linnees Ranunculus aquatilis*, jetzt den Typus der Gattung *Batrachium* bildend, ist von den neueren Botanikern in eine große Anzahl von Arten zerpalten worden. Die deutschen Florenverzeichnisse führen jetzt als solche auf: 1. *Batr. aquatile* L. 2. *hololeucum* Lloyd. 3. *minutum* Döll. 4. *divaricatum* Schrk. 5. *paucistamineum* Tausch. 6. *fluitans* Lam. 7. *Bachii* Wirtg., welche alle im süßen Wasser vorkommen, und außerdem noch 8. *confusum* Godr. (*tripartitum* Nolte) und 9. *Baudotii* Godr. aus dem Brackwasser, denen Fries für Schweden noch ein *B. marinum* und mehrere andere hinzufügt. Auf den ersten Blick erscheinen allerdings manche dieser angeblichen Arten so verschieden, daß man eine specifische Trennung derselben für

1. E. Peiffer und Noßmähler. — Eine gleiche Unbeständigkeit des Speciescharacters zeigen fast alle Gattungen der Süßwassermollusken, nicht allein in Europa, sondern auch in Amerika und wahrscheinlich auch in den anderen Erdtheilen, wo man sie bis jetzt noch wenig beachtet hat. Man denke nur an das zahllose, jährlich noch wachsende Heer der nordamerikanischen Unionen! -- Der Einfluß mancher Gewässer auf die in ihnen lebenden Mollusken ist so groß, und ertheilt ihnen ein so eigenthümliches Gepräge, daß ein geübter Conchyliologe sogleich die ihnen entstammenden Exemplare herausfindet, wenn sie ihm mit denen anderer Fundorte gemischt vorgelegt werden.

gerechtfertigt halten möchte; allein bei genauerer Betrachtung des Verhältnisses, in welchem sie zu einander stehen und der Formveränderlichkeit, die sie zeigen, halte ich es dennoch nicht für unmöglich, daß ein tieferes Studium dieser merkwürdigen Formenreihe die Botaniker noch einmal veranlaßte, sie sammt und sonders wieder auf einige wenige Arten zurückzuführen. Besteht doch selbst Fries in der *Summa* S. 140 zu: *florum magnitudinem, staminum et carpellorum numerum manifeste variare vidimus, ut etiam foliorum natantium praesentiam et defectum*. Er hätte nur noch einen kleinen Schritt weiter zu gehen brauchen, und sämmtlichen Pflanzentheilen eine Veränderlichkeit innerhalb gewisser Gränzen zugestehen, so wäre das Räthsel vielleicht befriedigend gelöst gewesen. Denn außer den von Fries namhaft gemachten Organen, möchte auch noch der Stengel abändern (rund, oder etwas kantig, fluthend¹ oder aufrecht), die Gestalt und Festigkeit der Blattzipfel, die Anheftung der Blätter (sitzend, und kürzer oder länger gestielt), die Anzahl der Blumenblätter (5 bis 12), und die Oberflächenbeschaffenheit der ganzen Pflanze, besonders der Karpelle (glatt oder behaart). Je nachdem mehr oder weniger dieser Modificationen bei einem und demselben Pflanzenindividuum zusammentreffen, entfernt sich dasselbe

1. Daß der lange, fluthende Stengel des *R. fluitans* nichts für die spezifische Trennung dieser angeblichen Art von *R. aquatilis* beweiset, zeigen die analogen Erscheinungen bei *Montia fontana*, *Polygonum amphibium*, *Sparganium simplex*, *Juncus supinus* und *Hippuris vulgaris*, die auch alle mit fluthendem Stengel abändern. Mit der Var. *fluitans* der letztgenannten Art kommt *R. fluitans* auch noch in seiner häufig stattfindenden Unfruchtbarkeit überein. — Hinsichtlich der Veränderlichkeit der Blätter bei den Wasserpflanzen erinnere ich nur an das bekannte Beispiel des *Alisma Plantago*.

mehr oder weniger von dem Grundtypus und kann dadurch ein so eigenthümliches Gepräge erhalten, daß die Zersplitterung in mehrere Arten dadurch erklärlich, wenn auch nicht gerechtfertigt wird. Ähnlich, wie mit *Batrachium*, verhält es sich mit der Gattung *Potamogeton*; auch diese ist in so viele angebliche Arten zersplittert worden, daß z. B. Sonder aus dem kleinen Gebiete der Flora von Hamburg deren nicht weniger als 21 aufzählt, zu denen dann noch 13 Varietäten hinzukommen. In der Gattung *Callitriche* begnügen sich die deutschen Floren zwar mit 5 Arten, aber diese ändern nach dem *Compendium florae Germanicae* (ed. 2. 1836) von Bluff, N. v. Esenbeck und Schauer in 36 Varietäten ab. Auch die Gattung *Zannichellia*, von der man vor etwa 40 Jahren nur eine einzige Art in Deutschland kannte, ist durch Zerspaltung derselben jetzt schon auf 5, und *Nymphaea alba* L. auf fast ein Duzend Species gebracht worden. Erwägt man nun endlich noch die schon oben erwähnte Formveränderlichkeit der Algen, so wird es überflüssig sein, noch weitere Beispiele für die polymorphe Natur der Wasserpflanzen anzuführen.¹

1. Außer in ihrer Wandelbarkeit bieten die Süßwasserpflanzen Deutschlands auch noch eine andere Analogie mit den deutschen Süßwassermollusken dar, indem sie eben so weit und allgemein verbreitet sind, wie diese, während sich in den Landpflanzen (wie bei den Landmollusken) der einzelnen deutschen Florengebiete eine viel größere Differenz zeigt. Der Grund dieser Erscheinung liegt wohl hauptsächlich darin, daß erstere durch ihre Wasserbedeckung einer viel gleichmäßigeren Temperatur ausgesetzt sind, wie letztere, und daher von klimatischen Einflüssen, die in der Atmosphäre stärker hervortreten, weniger abhängig sind. Doch trägt zu ihrer weiteren Verbreitung ohne Zweifel auch die Leichtigkeit bei, mit der ihre am Gefieder der Wasservögel festklebenden Samen von einem Gewässer zum andern verschleppt werden können.

Aber auch manche Landpflanzen verändern je nach dem Standpuncte ihre Formen oft auf eine merkliche Weise, obgleich nicht so ins Unendliche wie die oben bezeichneten Wasserpflanzen; es finden sich zwar bei einzelnen Gattungen derselben, wie z. B. bei **Rubus**, **Mentha**, **Salix**, **Viola**, **Verbascum** u. s. w., ebenso zahlreiche und fast unentwirrbare Formenreihen, wie bei **Potamogeton** und **Callitriche**, doch haben zur Hervorbringung derselben andere Umstände eingewirkt, auf die wir hernach zurückkommen werden. Für die durch locale Einflüsse hervorgerufene Veränderlichkeit der Landpflanzen mag hier das Beispiel des **Lotus corniculatus** genügen. In allen nur einigermaßen sorgfältig durchsuchten deutschen Florengebieten wird man ihn in Gesellschaft des **L. uliginosus** antreffen; ich fand beide am Rhein unter denselben Verhältnissen, unter welchen sie hier in Mecklenburg vorkommen, und auch noch nach Schweden hinüber begleiten sie sich. Ihr Habitus ist so gleich, daß Anfänger in der Botanik sie in der Regel kaum zu unterscheiden vermögen, denn **L. uliginosus** erscheint nur als der üppigere **corniculatus**. Läßt sich nun diese üppigere Entwicklung, wodurch einzelne Theile eine kräftigere Ausbildung und etwas abweichende Gestalt bekommen, nicht ganz naturgemäß aus den verschiedenen Standpuncten der beiden Formen erklären, indem **corniculatus** an trockenen, sonnigen Plätzen (auf Tristen, trockenen Wiesen, an Uferändern, Dämmen, Aflerrainen und auf Sandplätzen) vorkommt, während die Form, welcher man den Namen **uliginosus** beigelegt hat, nur an feuchten, sumpfigen und schattigen Standorten angetroffen wird?

Von *L. corniculatus* ist in neuerer Zeit noch ein *L. tenuifolius* als dritte Art abgezweigt worden, welche nur auf salzhaltigem Boden am Seestrande gefunden wird. Sie leitet uns dazu hinüber, den wichtigen Einfluß, den ein solcher salzhaltiger Boden auf die Pflanzen ausübt, etwas genauer ins Auge zu fassen. Die am Seestrande wachsenden Pflanzen lassen sich in folgende Gruppen sondern:

1. Es findet sich daselbst eine beträchtliche Anzahl binnenländischer Pflanzen, welche mit einer so kräftigen Organisation begabt sind, daß sie den Salzgehalt des Bodens ertragen können, ohne die geringste Veränderung zu erleiden. So wachsen z. B. auf dem mit Geröllern bedeckten Seestrande der Halbinsel Dänemark *Rubus caesius*, *Convolvulus arvensis*, *Stachys palustris*, *Rumex crispus*, *Equisetum hiemale*, an steilen Felsküsten, *Hippophaë rhamnoides*, *Medicago falcata* und *lupulina*, *Tussilago Farfara*, *Equisetum Telmateja* u. s. w., auf sandigen Strecken *Ammophila arenaria*, *Elymus arenarius* u. s. w., welche sich alle von den gleichnamigen binnenländischen Pflanzen durchaus nicht unterscheiden.

2. Andere binnenländische Pflanzen wachsen zwar gleichfalls am Meeresstrande, erleiden dort aber eine mehr oder weniger auffallende Abänderung ihres ursprünglichen Habitus. Theils wirkt der Salzgehalt fördernd und kräftigend auf sie ein, und sie entwickeln sich entweder im Allgemeinen oder in einzelnen Organen üppiger, — theils aber tritt auch das Gegentheil ein. Ersteres zeigt sich z. B. bei der *Chondrilla juncea* β . *robusta*, welche Detharding früher sogar unter dem Namen *Ch. acanthophylla* als eigene Species unterschied; bei anderen Pflanzen wird die Be-

haarung stärker, wie z. B. bei *Ranunculus polyanthemos* var. *littoralis* Zab. (der auch größere Blumen, aber einen niederigeren Wuchs erhält), *Trifolium pratense* var. *maritimum* Zab., *Anthyllis Vulneraria*, *Galeophis Tetrahit*, *Euphrasia officinalis* β. *maritima*, *Taraxacum officinale* β. *hirtum*, *Plantago lanceolata* β. *lanuginosa*, *Artemisia campestris* β. *sericea*; bei *Sonchus oleraceus* werden die sonst glatten Blütenstiele drüsig behaart, *Equisetum arvense*¹ wird ganz rauh von scharfen Punkten; andere Pflanzen, wie z. B. *Malva neglecta* Wallr. β. *littoralis* Deth. erhalten größere Blumen, andere aber fleischigere Blätter, wie z. B. *Linaria vulgaris*, *Viola tricolor* var. *syratica*, *Polygonum aviculare* var. *salinum*, *Plantago major* var. *scopulorum* Fr., *Senecio vulgaris* var. *squalidus* Mey., *Chrysanthemum inodorum* β. *maritimum*, *Sagina procumbens* β. *maritima* Fr.; auch *Atriplex latifolium* durchläuft an salzhaltigen Orten eine ganze Reihe von Formveränderungen. — Eine Verkümmernng dagegen zeigt sich z. B. bei dem ästigen *Centunculus minimus*, von welchem Fries an dem schwedischen Strande eine var. *simplex* fand; bei *Polygonum aviculare* β. *littorale* und *Erythraea ramosissima*, welche gleichfalls weniger verästelt am Meeresufer auftreten; *Centaurea*

Atriplex latifolia
β. *salina*

1. Daß diese Art zwischen den Geröllen am Strande auf Jasmund (wo sie dem Wellenschlage häufig ausgesetzt ist,) wächst, habe ich schon in Archiv II S. 80 gesagt; Hr. Dr. Meyn hat dies in seiner Abhandlung über „die nachhaltige Vertilgung des Durocks“ (Weimar 1854) S. 40 übersehen, indem er aus meiner Schilderung der See- und Salinenflora einen Beweis dafür ableitet, daß alle Equisetaceen den Salzboden fliehen. Auch E. Telmateja und hiemalo wachsen auf Jasmund so, daß sie nicht selten mit dem Meereswasser in Berührung kommen.

Jacea, *Bupleurum tenuissimum*, *Sonchus arvensis*, *Cap-sella bursa pastoris* und *Jasione montana* sind gleichfalls im Binnenlande viel kräftiger, *Cerastium semidecandrum* kommt an der Küste mit 4theiligen und 4männigen Blumen vor, und *Taraxacum officinale* ändert auf recht naßsalzigem Boden mit sehr schmalen Blättern ab.

3. Zu allen diesen Pflanzen gesellen sich aber auch noch eine Anzahl solcher, die ausschließlich auf salzhaltigem Boden (am Meeresstrande und um Salinen) vorkommen, und welche sich sogleich auf den ersten Blick als von unseren binnenländischen Arten gänzlich verschieden zeigen. Dahin gehören z. B. an unserem Ostseestrande: *Cochlearia Linnaei* und *danica*, *Cakile maritima*, *Crambe maritima*, *Halianthus peploides*, *Pisum maritimum*, *Eryngium maritimum*, *Aster Tripolium*, *Artemisia maritima*, *Samolus Valerandi*, *Glaux maritima*, *Statice Limonium*, *Plantago maritima* und *Coronopus*, *Chenopodina maritima*, *Obione pedunculata*, *Salsola Kali*, *Salicornia herbacea*, *Juncus maritimus*, *Carex extensa* und *Triticum junceum*.

4. Neben diesen soeben genannten und von allen Botanikern als gute Arten anerkannten Pflanzen wachsen am Strande aber auch noch andere, die meistens gleichfalls als gute, dem Salzboden eigenthümliche Pflanzen gelten, bei denen aber die Berechtigung als selbstständige Arten beansprucht werden zu müssen, nicht so sehr in die Augen fällt, da sie mit anderen Strand- und binnenländischen Pflanzen in mehr oder weniger nahen verwandtschaftlichen Beziehungen stehen. In unserer mecklenburgischen Flora sind dies folgende:

Cochlearia anglica + *officinalis*.
Sagina stricta + *procumbens*.
Lepigonum marinum, *medium* + *rubrum*.
Lotus tenifolius + *corniculatus*.
Chrysanthemum maritimum + *inodorum*.
Erythaea linarifolia + *Centaurium*.
Euphrasia verna + *Odotites*.
Statice maritima + *Armeria*.
Atriplex litorale + *hastatum*.
Potamogeton marinus + *filiformis*.
Ruppia rostellata + *maritima*.
Zannichellia pedicellata + *palustris*.
Juncus balticus + *glaucus*.
Juncus Gerardi + *compressus*.
Blysmus rufus + *compressus*.
Glyceria maritima + *distans*.

Diese Gegenüberstellung der verwandten Arten darf aber nicht etwa so verstanden werden, als wollte ich damit bezeichnen, daß die im ersten Gliede stehenden Strandpflanzen alle auf die im zweiten Gliede genannten als Varietäten zurückzuführen wären; bei manchen aber wird dies geschehen müssen, und bei welchen ich mich dazu genöthigt gesehen habe, darüber werde ich in der späteren systematischen Uebersicht der Flora weitere Auskunft geben. Ich kann nicht umhin bei dieser Gelegenheit unseren Botanikern das sorgfältige Studium dieser Pflanzen ganz besonders dringend ans Herz zu legen. Denn der Einfluß, welchen salzhaltiger Boden oder salziges Gewässer auf die Umgestaltung der Pflanzen ausübt, ist noch viel zu wenig erforscht worden, und ich halte es nicht für unwahrscheinlich, daß er sich in der Folge noch als größer herausstellt, wie man jetzt zuzugeben geneigt ist. Ich habe diesen Ge-

genstand schon früher einmal zur Sprache gebracht¹, und gezeigt, wie vorsichtig wir in Beurtheilung der Artenrechte der in der Ostsee lebenden Pflanzen und Thiere sein müssen, weil dies Wasserbecken ein Mittelbing zwischen Meer und Landsee ist, und es seine Bevölkerung theils aus der Nordsee, theils aus den Flußmündungen erhalten hat, und daß Pflanzen und Thiere in diesem schwachsalzigen Wasser eine solche Umgestaltung erlitten haben, daß man manche derselben für neue, der Ostsee eigenthümliche Arten hielt. So machte man z. B. aus der *Clupea Harengus* der Nordsee eine baltische *Cl. Membras*, aus der *Tellina solidula* der Nordsee eine *T. baltica*, aus der *Neritina fluviatilis* unserer Landseen und Flüsse eine *N. baltica*, aus dem *Fucus vesiculosus* einen *F. balticus* u. s. w. — lauter Trennungen, die gänzlich unberechtigt waren. Dies Beispiel, im Verein mit den Thatfachen, die ich S. 14 f. schon über den Einfluß mitgetheilt habe, welchen salzhaltiger Standort auf manche binnenländische Pflanzen ausübt, rechtfertigt es gewiß, wenn ich die Ueberzeugung hege, daß die Acten über die Artenrechte mancher der oben genannten Pflanzen noch keineswegs geschlossen sind.

Der bequemern Uebersicht wegen will ich schließlich alle diejenigen angeblichen Arten, die ich als Varietäten einzuziehen mich genöthigt gesehen habe, hier zusammenstellen. Es sind folgende:

<i>Thalictrum flexuosum.</i>	<i>Cardamine sylvatica.</i>
<i>Ranunculus paucistamineus.</i>	<i>Camelina dentata.</i>
<i>tripartitus.</i>	<i>Cochlearia anglica.</i>
<i>nemorosus.</i>	<i>Viola Riviniana.</i>
<i>Barbareaa arenata.</i>	<i>Polygala comosa.</i>

1. In meiner Schilderung der Ostsee im 1. Bde. unseres Archivs.

<i>Sagina depressa.</i>	<i>Myosotis caespitosa.</i>
<i>Spergula maxima.</i>	<i>Solanum miniatum.</i>
<i>Spergularia media.</i>	humile.
marginata.	<i>Verbascum thapsiforme.</i>
<i>Alsine viscosa.</i>	<i>Moenchii.</i>
<i>Cerastium glutinosum.</i>	<i>Potentilla opaca.</i>
<i>Elatine triandra.</i>	polita.
<i>Malva Dethardingii.</i>	<i>Euphrasia verna.</i>
<i>Lotus uliginosus.</i>	<i>Thymus angustifolius.</i>
tenuifolius.	<i>Lamium incisum.</i>
<i>Vicia sativa.</i>	<i>Galeopsis versicolor.</i>
<i>Rubus suberectus.</i>	bifida.
affinis.	pubescens.
sylvaticus.	<i>Ballota borealis.</i>
discolor.	<i>Anagallis coerulea.</i>
villicaulis.	<i>Statice maritima.</i>
corylifolius.	<i>Atriplex prostratum.</i>
<i>Wahlbergii.</i>	Sackii.
thyrsiflorus.	laciniatum.
<i>Potentilla cinerea.</i>	<i>Rumex palustris.</i>
<i>Crataegus monogyna.</i>	<i>Ulmus suberosa.</i>
<i>Callitriche stagnalis.</i>	<i>Salix vitellina.</i>
platycarpa.	amygdalina.
<i>Montia rivularis.</i>	aquatica.
<i>Sedum purpurascens.</i>	uliginosa.
<i>Pimpinella nigra.</i>	repens.
<i>Chrysanthemum maritimum.</i>	fusca.
<i>Senecio aquaticus.</i>	argentea.
barbaraeifolius.	rosmarinifolia.
<i>Lappa minor.</i>	laeta.
tomentosa.	angustifolia.
<i>Hieracium vulgatum.</i>	<i>Potamogeton fluitans.</i>
boreale.	nitens.
rigidum.	acutifolius.
stoloniflorum.	<i>Zannichellia pedicellata.</i>

<i>Platanthera montana.</i>	<i>ericetorum.</i>
<i>Juncus effusus.</i>	<i>Oederi.</i>
<i>sylvaticus.</i>	<i>Alopecurus fulvus.</i>
<i>alpinus.</i>	<i>Koeleria glauca.</i>
<i>Gerardi.</i>	<i>Poa fertilis.</i>
<i>Heleocharis uniglumis.</i>	<i>Bromus racemosus.</i>
<i>Scirpus Tabernaemontani.</i>	<i>commutatus.</i>
<i>Carex divulsa.</i>	

Endlich finden sich an unserer Seeküste auch noch einige sehr merkwürdige Pflanzen, welche im Binnenlande noch nicht gefunden sind und die in ihrem ganzen Habitus geradezu die Mitte zwischen je zwei anderen am Strande häufigen Pflanzen halten. Es sind dies *Ammophila ballica*, zwischen *A. arenaria* und *Calamagrostis Epigeios* stehend, — *Triticum strictum*, zwischen *Tr. acutum* und *Elymus arenarius*, und *Triticum acutum*, zwischen *Tr. repens* und *junceum*. — Hrn. Prof. Röper gebührt das Verdienst uns diese räthselhaften Pflanzen zuerst richtig gebentet zu haben, indem er es bei der ersteren derselben mit Bestimmtheit, und hinsichtlich der anderen beiden als sehr wahrscheinliche Vermuthung aussprach, daß sie nichts anderes als Bastarde jener Arten seien, deren Kennzeichen sie theilweise in sich vereinigen.¹

Man hat sich in neuerer Zeit Seitens der Naturforscher schon mehrfach bequemen müssen althergebrachte Meinungen fallen zu lassen, und man wird sich endlich auch wohl zu dem Zugeständnisse entschließen, daß Bastardbildungen nicht allein weit häufiger sind und in weiteren Kreisen vorkommen, als man früher einräumen wollte, sondern auch, daß die Bastarde keineswegs immer un-

1. Röper zur Flora Mecklenburgs II. S. 192. 269—271.

fruchtbar sind. Zu Gunsten dieser so manches Räthsel lösenden Lehre von den Bastardbildungen erheben sich schon nach und nach immer mehr gewichtige Stimmen unter den Botanikern, wie z. B. von Wimmer, welcher in der Denkschrift der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur im J. 1853 (S. 143 ff.) 92 Pflanzenbastarde, worunter 56 allein der Gattung *Salix* angehören, aufzählt, und bei dieser Gelegenheit sagt: „so weit meine Erfahrungen bei den Weiden reichen, sind allerdings manche Bastarde unfruchtbar; andere dagegen geben keimfähigen Samen, wie ich dies namentlich bei *S. silesiaca* - *Lapponum* beobachtet habe, und wie Hr. Wichura an *S. ambigua* Ehr. und *S. Doniana* Sm. unzweideutig erwiesen hat. Durch die Versuche desselben scheint es auch dargethan zu sein, daß ein Bastard sich mit demselben Bastard, wie auch mit einem anderen befruchten lasse.“ — Muß man dies endlich in Bezug auf die Pflanzen als Thatsache zugestehen, so wird man auch wohl nicht umhin können, diese Lehre auf die Thiere anzuwenden, eine Lehre, durch welche die Entstehung der mannigfachen Gestaltungen, in denen sich z. B. das Menschengeschlecht zeigt, am einfachsten würde erklären lassen.^{1.}

Man verliert sich aber durch Anerkennung fruchtbarer Bastardbildungen hinsichtlich der Erkenntniß der Species, —

1. Diese ganz aus der Luft gegriffene Idee von der specifischen Einheit des Menschengeschlechtes ist für die Entwicklung des Speciesbegriffes ebenso verderblich gewesen, als die mosaikische Kosmologie für die Geologie. Die sogenannten Menschenrassen mußten alle in eine Species hineingepreßt werden, die Hunde gleichfalls, um für ersteres eine Analogie zu haben, und als man so Verschiedenartiges unter einen Hut gebracht hatte, da konnte man mit den „Species“ der übrigen organischen Wesen schalten und walten, wie es beliebte!

wenn dieselbe auch sehr dadurch erschwert wird, — nicht so völlig ins Bodenlose, wie dies auf den ersten Anblick erscheinen mag. Denn wie bei Weitem die Mehrzahl (wenigstens der phanerogamischen Pflanzen) einen durchaus constanten Artencharacter an sich trägt, und nur der Minderzahl ein variabler Character verliehen ist, ebenso verhält es sich mit den geschlechtlichen verwandtschaftlichen Beziehungen, welche zwischen den einzelnen Arten stattfinden. Zwischen den meisten scheinen gar keine solche vorhanden zu sein, und sie vermischen sich weder im freien Zustande, noch auch durch künstlichen Zwang mit einander. Unter manchen Arten aber giebt es eine Verwandtschaft, und je nachdem dieselbe schwächer oder stärker ist, kommen seltener oder häufiger Bastardbildungen zwischen ihnen vor. Lockerer ist offenbar diese geschlechtliche Verwandtschaft z. B. zwischen *Anemone nemorosa* und *ranunculoides*, zwischen *Geum urbanum* und *rivale*, als zwischen unseren *Verbascum*- und *Salix*-Arten; denn obgleich die ersteren der genannten Pflanzen so häufig in Mecklenburg durch- und nebeneinander wachsen, werden Bastarde unter ihnen doch nur selten angetroffen, während dort, wo mehrere Arten der beiden letzteren Gattungen zusammen vorkommen, auch ihre Bastarde nicht weit zu suchen zu sein pflegen. Es ist also der Bastardbildung von der Natur selbst eine ganz bestimmte Schranke gesetzt, und die Besorgniß, daß die Anerkennung dieser Bildungen die Erkenntniß der wirklichen Pflanzenarten aufheben würde, indem damit die Möglichkeit einer unendlichen Wandelbarkeit aller Pflanzenformen gegeben sei, ist eine durchaus unbegründete. In einigen Gattungen zwar, deren Arten sich geschlechtlich vorzugs-

weise nahe stehen, ist allerdings jene Befürchtung zur Wirklichkeit geworden, und ihre Arten sind theils durch ihren wandelbaren Character selbst, theils durch die in verschiedenen Richtungen dazwischen tretenden Bastarde, so unkenntlich gemacht und durcheinander gewirrt worden, daß die Botaniker fast daran verzweifelt sind, die ursprünglichen Arten noch herausfinden zu können.

Was die Pflanzen nun betrifft, die mir in unserer mecklenburgischen Flora für Bastarde gelten, so sind dies nicht etwa bloß Strandpflanzen, sondern sie finden sich durch das ganze Land zerstreuet. Ich rechne dahin nämlich:

Anemone sulphurea Pritz.

Nasturtium anceps Reich.

Tilia intermedia DC.

Geum intermedium Ehr.

Circaea intermedia.

Galium ochroleucum Wolf.

Cirsium hybridum Koch, oleraceo-acaule.

Hieracium Pilosello-Auricula Griew.

Verbascum ramigerum Lk., *collinum* Schr., *adulterinum* Koch,
Schottianum Schr., *collino-nigrum* Brockm.

Mentha nepetoides Lej.

Lamium intermedium Fr., *purpureo-maculatum*.

Stachys ambigua Sm.

Rumex maximus Schr.

Salix cuspidata Sch., *Russeliana* Sm., *undulata* Ehr. *ambigua* Ehr.,
angustifolia Fr.

Populus canescens Sm.

Calamagrostis baltica Schr.

Festuca loliacea Huds.

Triticum strictum Deth., *acutum* DC.

Wahrscheinlich wird sich dies Verzeichniß mit der Zeit noch durch mehrere Bastarde, zu denen auch wohl

die Gattung *Rubus* noch ihr Contingent stellen wird, vergrößern lassen. — Manche der vorstehend genannten Pflanzen sind durch künstliche Befruchtung schon als Bastarde erwiesen, andere sind durch das Consortium der Stammpflanzen als solche indicirt, und bei noch anderen macht sie der Doppelcharacter, in welchem sie sich zeigen (bald der einen, bald der anderen Stammpflanze in ihrem Habitus sich stärker zuneigend,) im höchsten Grade eines hybriden Ursprungs verdächtig.

Ich habe hier einige der hauptsächlichsten Schwierigkeiten angedeutet, mit denen der Botaniker bei der Abgränzung der Species zu kämpfen hat. Diese Schwierigkeiten für alle Pflanzen selbst nur eines so kleinen Pflanzengebietes, wie das unserige, genügend zu beseitigen, übersteigt bei weitem die Kräfte eines einzelnen Beobachters. Nur Theilung der Arbeit kann hier zu einem genügenden Ziele hinführen, und ich halte es für meine Pflicht unsere Botaniker darauf hinzuweisen, daß sie durch Lösung der vorstehend angedeuteten Fragen und Zweifel mehr zur wahren Förderung der Wissenschaft beitragen können, als wenn sie etwa eine neue, bisher innerhalb der Gränzen des mellenburgischen Landes noch nicht gesehene Pflanzenart aufspüren.

Demn außer dem, daß die Befolgung der von mir im Voraufgehenden entwickelten Grundsätze meiner Uebersetzung nach eine naturgemäßere Erkenntniß des Pflanzenreiches, als man durch das jetzt beliebte Zersplitterungssystem erlangt, anbahnt, wird dadurch auch die Orientirung unter den Gewächsen in vielen Fällen sehr erleichtert werden. Der Botaniker findet z. B. unter

den Bürgern seiner Flora *Thalictrum minus* und *flexuosum* aufgezeichnet: ersteres kennt er schon und will nun letzteres auffuchen, geht aber lange daran vorbei, weil er, — wozu der eigene Speciesname ihn berechtigt, — eine von *minus* wesentlich in ihrem Habitus verschiedene Pflanze sucht. Wird er dagegen auf *Thal. minus var. flexuosum* verwiesen, so wird ihn dieser Fingerzeig viel schneller ans Ziel führen. Warum also den Weg absichtlich erschweren, wenn dies auf eine so einfache Weise vermieden werden kann?

II. Die Pflanzennamen.

Der schwankende Zustand des Gattungs- und Artenbegriffes wirkt höchst nachtheilig auch auf die Namen der Pflanzen ein. Hinsichtlich dieser letzteren befinden sich unsere Floren fast in einem Zustande, wie der alte Heraklit die ganze Welt sich dachte, nämlich in einem beständigen Flusse (*πάντα ῥεῖ*). Raslos treiben sich viele Species von Gattung zu Gattung, nirgends wird ihnen eine bleibende Ruhestätte gewährt, weil beständig an den Gattungsgränzen gerückt wird, indem man dieselben bald enger bald weiter steckt. Wenn wir nun auch der Species (wenn wir gleich den Begriff derselben noch nicht bestimmt definiren können!) eine objective Gültigkeit zugestehen müssen, so ist dies doch mit der Gattung keineswegs der Fall. Diese ist nichts objectiv in der Natur begründetes, in dessen Auffassung sich endlich alle Botaniker nothwendig einigen müßten, sondern sie ist und bleibt etwas Subjectives, zur Erleichterung der Orientirung in dem großen Pflanzenheere durch menschlichen Scharfsinn Erdachtes, daher

aber auch etwas Schwankenbes. — Würde man nun nicht mehr in dem wahren Interesse der Wissenschaft handeln, wenn man jetzt, wo man kaum erst die Hälfte der Baumaterialien kennt, die zur Errichtung der *Flora universalis* benutzt werden müssen, einstweilen ruhig weiter bauete, um doch endlich einmal eine, wenn auch nicht fehlerfreie, Uebersicht über den ganzen Formenreichtum und viele andere Beziehungen der Flora, die wichtiger, als die endliche Feststellung der Gattungen sind, zu erhalten, als daß man fortwährend den kleinen schon dastehenden Theil des Gebäudes umgestaltete? Etwas conservative Gesinnung ist mitunter ganz gut, und ich glaube, daß sie bei der jetzigen Lage des botanischen Wissens gerade hier am rechten Orte sei. Ich werde daher in der später folgenden Aufzählung der mecklenburgischen Pflanzen manche Neuerung, die von anderen hinsichtlich der Gattungen vorgenommen ist, unberücksichtigt lassen.

Wo ich aber Umstellungen vorgenommen habe, da habe ich mir (wenigstens vorläufig bei den phanerogamischen Pflanzen,) hinsichtlich der lateinischen Speciesnamen eine Aenderung erlaubt, die mir sehr nothwendig erschien.

Die Ehre der Namengebung gebührt nämlich ohne Frage dem ersten Entdecker der Species. Indem nun aber späterhin die Gattungen andere Abgränzungen erfahren haben und daher viele Arten in andere Gattungen versetzt worden sind, als welchen sie von ihren ersten Entdeckern zugewiesen wurden, ist bei den Botanikern leider die Unsitte eingerissen, dann nicht den Entdecker der Art, sondern denjenigen, durch den die Versetzung bewirkt worden ist, als Autor der Species zu nennen. Auf diese

Weise wird Jahr für Jahr namentlich den älteren großen Koryphäen der Wissenschaft eine Art nach der anderen entzogen, und wenn dies noch einige Jahrzehnte so fortgeht, könnte es sogar dahin kommen, daß wir z. B. Linnees Namen ganz und gar aus unseren floristischen Handbüchern verschwinden sähen! Das darf nicht sein. — Ich habe daher die jetzt von den Paläontologen gebrauchte, zuerst von den Engländern vorgeschlagene Methode der Benennung auch auf die Pflanzen angewendet, und bei der Versetzung einer Species in eine andere Gattung den Namen ihres Entdeckers mit dem Zusätze *sp. (species)* als Autornamen hinzugefügt. Sollten dabei meinerseits einige Mißgriffe vorgekommen sein, so bitte ich dieselben durch den Mangel mancher literarischer Hülfsmittel, die zur genauen Feststellung der ersten Autorschaft nöthig sind, zu entschuldigen: ich wollte auch hier wenigstens den Weg andeuten, den man auch in dieser Hinsicht meiner Ueberzeugung nach zu gehen hat.

Auch die in Mecklenburg gebräuchlichen deutschen Pflanzennamen, zu deren näherer Begründung und Erklärung bis jetzt so gut wie Nichts geschehen ist, habe ich zwar mit in den Kreis meiner Forschung gezogen, aber hier bleibt noch gar vieles zu leisten übrig. Denn die Unsicherheit in der Benennung der einzelnen Pflanzen ist selbst bei den Leuten, welche ihr Lebensberuf am meisten in practische Berührung mit dem Pflanzenreiche bringt, zum Erstaunen groß. Befragt man die Landleute, so wissen sie viele sehr hervorragende Pflanzenarten entweder gar nicht zu benennen, oder sie taufen sie nach Belieben, oder sie bringen sie bei gewissen sehr dehnbaren Collectiv-

namen unter. Die Zahl derer, denen in weiteren Kreisen durchgängig ein bestimmter Name beigelegt wird, ist nur geringe.

Es giebt nun zwar schon ein älteres Verzeichniß der mecklenburgischen Pflanzennamen, welches Siemssen im J. 1793 im 2. Bde. des von ihm herausgegebenen Magazins veröffentlicht hat, und auch Niemann^{1.} u. a. haben späterhin dazu noch einige Beiträge geliefert, aber diese Verzeichnisse leiden an dem großen Uebelstande, daß sowohl manche Pflanzennamen aus Mangel einer feststehenden Schreibart sehr entstellt worden sind, als auch daß manche, da sie von Leuten gesammelt wurden, die keine Botaniker waren, eine unrichtige Deutung erfahren haben.

Man wundere sich daher nicht, wenn man in meinem nachfolgenden alphabetisch geordneten Namensverzeichnis viel weniger Namen, als bei meinen Vorgängern antrifft. Ich habe nämlich nicht allein manchen mir zweifelhaften Namen ausgeschlossen, sondern auch alle die plattdeutschen Namen, welche bloße Uebersetzungen der hochdeutschen sind. Von letzteren (den hochdeutschen) habe ich nur einige wenige aufgenommen, welchen bei uns eine andere Bedeutung, als im übrigen Deutschland, beigelegt wird, oder über deren Ethymologie einige Bemerkungen zu machen waren,^{2.} — von den plattdeutschen nur diejenigen allgemeiner verbreiteten, die wirklich einen von der hochdeutschen Benennung ganz abweichenden Namen führen. Eine Vergleichung dieser letzteren Namen mit den verwandten Sprachen zeigt, daß darunter noch manche alte

1. T. Niemann diss. inaug. sistens prodromum Idiotici Mecklenburgensis etc. Rostock 1798. 8to. 28 pag.

germanische Benennungen sind, die im Hochdeutschen verloren gegangen sind, sich aber im Plattdeutschen erhalten haben und deshalb auch festgehalten zu werden verdienen; doch darf dabei nicht außer Acht gelassen werden, daß vielleicht manche dieser Namen, besonders die mit den schwedischen verwandten, vielleicht durch die engen Beziehungen, in denen Mecklenburg und Vorpommern seit dem 30jährigen Kriege mit Schweden gestanden haben, erst in neuerer Zeit in unseren Gegenden wieder eingeführt worden sein mögen. Hinsichtlich der dänischen und schwedischen Pflanzennamen habe ich mich an *Neders Nomenclator botanicus* (zum Gebrauche bei der *Flora Danica*, Copenhagen 1769 8to) gehalten. Einige Ableitungen aus dem Gothischen theilte mir Hr. Stud. jur. K. Schröder (aus Treptow) mit.

Adebarsbloom, — *brod* (*Adebar* = Storch) soll *Iris-Pseud-acorus* heißen.

Adebarskasbeeren oder — *Kasperm* auch *Ahlbeeren*, sind die Früchte des *Ribes nigrum*, das von seinen stark duftenden Blättern auch den Namen *Stinkstruch* führt. — *Kasbeeren* oder *Kasperm* ist corrumpt aus dem alt-plattdeutschen *Karseebeeren*, welches wiederum von (*Prunus*) *Cerasus* abstammt; *Adebarskasbeeren* heißt also „Storchkirschen.“

Aecker, *Ecker* ist die Eichel; engl. *acorn*, gothisch *akran* (= Frucht.)

Aegel, *Egelhörn*, *Säkel* und *Säker* sollen alles Namen der *Stratiotes aloides* sein, wofür aber die verwandten Sprachen gar keine Analogien darbieten.

Aepelbuhrn, *Eperle* soll *Acer campestre* genannt werden.

Aesche und *Aespe*, — diese Schreibart ist wohl nach Analogie der verwandten Sprachen der gewöhnlichen (*Esche* und *Espe*) vorzuziehen. Ersterer Baum (*Fraxinus excelsior*) führt in Mecklenburg auch den Namen *gähe Aesche*, — die faule Aesche ist *Populus nigra*.

Die Aespe ist *Populus tremula*, die in *M.* auch Bewer=Aesch genannt wird.

Ahl nennen die Kinder die jungen Pflanzen des *Acorus Calamus*, mit denen sie im Frühlinge unter sich einen lebhaften Handel treiben.

Ahlbeeren s. Adebarskasbeeren.

Ahlboom aber ist *Lonicera Xylosteum*.

Ahtenflott wird in *M.* die Wasserlinse (*Lemna*) genannt, in Schweden heißt sie Andmat, in Dänemark Andemad, d. i. Entenspeise; flott stammt von flötern (engl. to float) und bezeichnet im Plattdeutschen die Sahne, weil sie oben auf der Milch schwimmt. Entenflott wäre demnach Enten=Sahne d. h. eine Lieblingspeise der Enten.

Alfranke, ist in Mecklenburg und Vorpommern *Lonicera Periclymenum*, in anderen Gegenden Deutschlands soll es *Solanum Dulcamara* sein.

Amtswieb wird in *M.* *Salix viminalis* genannt, weil diese Weide in den großherzogl. Aemtern von den Insassen vorschriftsmäßig in bestimmter Anzahl gepflanzt werden muß; auch Elfwieb (Elsweide) wird sie genannt.

Apen=ärseken soll nach Siemssen die Mispel in *M.* genannt werden, mir ist der Name noch nicht vorgekommen. Es wäre dies ein merkwürdiges Zusammentreffen mit dem englischen Volkswitz, der diese Frucht auf gleiche Weise bezeichnet, wie z. B. Mercutio in *Romeo und Julie* (II, 1) sagt: *maids call medlars, when they laugh alone, — an open arse.*

Beefinge stammt (nach Maßmann) von dem alt=gothischen Worte *basi* ab, und ist also nur ein Gattungsname, welcher „Beere“ bedeutet. Demgemäß deutet man bei dem Worte Beefinge durch hinzugefügte Bestimmungen an, welche Art von Beere gemeint sei: schwarze Beefinge sind *Vaccinium Myrtillus*, rothe B. *Vac. Vitis Idaea*, Erd=Beefinge aber Erdbeeren. — In Mecklenburg ist dies Wort wenig gebräuchlich, desto mehr aber in der benachbarten Mark Brandenburg.

Bewer=Aesch — s. Aesche.

Bewergras, von „bewern“ d. h. zittern, ist *Briza media*; im Dänischen heißt sie *Befvergraes* und im Schwedischen *Baefwegraes*.

Bitterwied (wegen des bitteren Geschmacks der Rinne) und Blankwied (wegen ihrer glänzenden Blätter) heißt *Salix pentandra*.

Bixbeeren, Bickbeeren, — aus Bockbeeren corrupt, heißen die Früchte des *Vaccinium Myrtillus*; hin und wieder hört man in M. dafür auch wohl den Namen schwarze Beesinge, er ist aber wenig gebräuchlich.

Blankwied s. Bitterwied.

Blaugras ist *Carex stricta*, wegen der bläulichen Farbe ihrer Blätter, — nicht *C. acuta*.

Boarendred d. i. Bärenbred, Brummelbeeren werden in M. die Brombeeren genannt; auch Theerbeeren soll man sie nennen.

Brookwied ist *Salix triandra* und *cinerea*, welche beide feuchte Standorte lieben.

Bullgrawen, Drunkelbeeren, Puttnaben sind Namen, welchen die Früchte des *Vaccinium uliginosum* führen sollen, von denen ich aber nur den zweiten aus eigener Erfahrung verbürgen kann.

Bullenpäsel heißen durch Metapher die Blüthenkolben der *Typha*-Arten; in England heißt die Pflanze bullrusch (rusch, welches sich in der deutschen Redensart „Rusch und Busch“ noch erhalten hat, bezeichnet überhaupt Sumpfgewächse verschiedener Art mit gras- und binsenartigen Blättern). Ob bei Shakespeare in Heinrich IV. Th. 1. A. 2. Sc. 4. Falstaff mit dem Bull's pizzle auch unsere Pflanze bezeichnet, oder ob der Ausdruck ohne Metapher zu verstehen sei, muß ich dahingestellt sein lassen. — In M. soll die Pflanze auch Rettik heißen, und in der Mirower Gegend Dunnerfue, dem dänischen *dønnemorskøller* entsprechend.

Butterblume heißt ganz allgemein in M. das *Taraxacum officinale*.

Dag un Nacht ist in vielen Gegenden Mecklenburgs *Parietaria erecta*; auch im Dänischen führt sie diesen Namen (dag og nat); bei Ludwigslust aber (wie im Schwedischen natt og dag) bezeichnet dieser Name eine andere Pflanze, nämlich *Melampyrum nemorosum*.

Dowe (d. i. taube) Kattel f. Kattel.

Dreeblatt (d. h. Drei-Blatt) ist *Menyanthes trifoliata*.

Drunfelbeeren f. Bullgraven.

Dull Bitterkruth, Dull Dill, Dullkruth ist alles *Hyoscyamus niger*.

Dunnernettel (d. h. Donner-Messel) ist *Urtica dioica*.

Duwif, Duwof (bei Hamburg Dunop) *Equisetum spec.*

Genbeeren, Enekenbeeren sind die Früchte des *Juniperus communis*, der in M. die beiden Namen Wachholder und Knirf führt; im Schwed. heißt er En, Enbuske, Enebaerstræd und im Dän. Enebaertrae, Jenbaertrae, Ene, Ener, und Eine.

Gelhörn f. Aegel.

Gibenbaum f. Ibenboom.

Elfwied f. Amtswied.

Eller, im Schwed. alder ist der niederdeutsche Name für die Erle oder Else (*Alnus glutinosa*); das sehr ähnliche englische Wort elder bezeichnet aber eine ganz andere Pflanze, nämlich den Hollunder (*Sambucus nigra*).

Eperle f. Aepelduhrn.

Erd-Beefinge f. Beefinge.

Ejelsfortt, ein unästhetischer Name, den *Onopordon Acanthium* in M. führen soll.

Fettgras *Triglochin spec.*

Finimstaart soll *Fumaria officinalis* sein.

Foßbeeren, d. i. Fuchsbeeren, auch Fumbsbeeren (?) sind die Früchte des *Rubus caesius*.

Foßenkruth *Chenopodium Vulvaria*.

Fuhl-Aesch f. Aesche.

Fuhl-Boom d. h. Faulbaum, wird gewöhnlich *Prunus Pädus* genannt, aber auch *Rhamnus Frangula* wird darunter verstanden.

Fuhl-Liese, rode Mähre ist *Anagallis arvensis*.

Gähf (d. h. gelb) Wied ist *Salix vitellina*.

Gerste; sollte der engl. Name Barley wohl nicht mit dem gothischen Baris zusammenhängen?

Gleusen sind die zum Gelbfärben benutzten Blumen der *Genista tinctoria*.

Gölling ist in M. *Calendula officinalis*.

Goosfleder, d. h. Gänsefleder, ist *Viburnum Opulus*.

Grän, — im Dän. und Schwed. Gran, ist *Pinus Abies*, — nicht *Picea*.

Grasnelle, ist *Statice Armeria* var. *maritima*.

Grundnettel (d. h. Grund = Nessel) ist ein Collectionname für verschiedene am Boden der Gewässer wachsende Pflanzen, namentlich *Potamogeton* spec. *Batrachium* spec und? *Chara* spec. Vergl. Schwänbel.

Habbil, ist *Raphanus Raphanistrum*. — Als hochdeutscher Name für diese Pflanze, wie auch für *Sinapis arvensis*, wird in den Floren immer Heberich angegeben, ein Name, der in den verwandten Sprachen für diese Pflanzen fehlt und welcher, wie ich glaube, nur der *Glechoma hederacea* gebührt, — vergl. Huder.

Haffburn, d. i. Meer- oder Seedorf, im Dän. und Schwed. Haftorn, ist *Hippophaë rhamnoides*.

Hagebuche, Weißbuche *Carpinus Betulus*.

Hambutten, Luus- (d. h. Läuse) Beeren, sind die Früchte der wilden Rosen.

Hartboom *Cornus sanguinea*.

Hasenbraam, englisch broom, *Sarothamnus scoparius*.

Hasenflewer (=flee), Schwedisch harsyra (Hasensäure) ist *Oxalis Acetosella*. Vergl. Ruckesalat.

Hasenpöppeln *Malva sylvestris*; die Früchte dieser und der *M. neglecta* sind Pöppelkees (d. i. Käse) und Rattenkees.

Hidbernettel, (corrupt in Hirrenettel) hochdeutsch Eider- oder Eiternessel, ist *Urtica urens*, schwed. etternässla, von dem alt-hochdeut. eidan brennen; (des schwed. ettar und dän. edder heißt Eiter, Schlangengift).

Himbeere, engl. hind-berry, (Beere der Himbin) dän. himbaer, himbaer, schwed. hinnbaer, ist die Frucht des *Rubus Idaeus*; bei Toitenwinkel sollen sie Hinselbeeren genannt werden.

Hölztk. (b. h. Holz) Appel und — Beer sind die Früchte der wilken Apfel- und Birnbäume.

Huder ist corruptirt aus *Hedera* (terrestris), dem pharmaceutischen Namen für *Glechoma hederacea*; vergl. Habbif.

Hülshusch, holländ. hulst, angelsächsl. holagn, engl. holly, ist *Ilex Aquifolium*, auerweitig auch Stechpalme genannt, wegen des Gebrauchs, den die katholische Kirche am Palmsonntage hin und wieder von den immergrünen Blättern dieses Strauches macht, wie Göthe dies in folgenden Zeilen erklärt:

„Im Vatican bedient man sich
Palmsonntags ächter Palmen,
Die Cardinäle beugen sich
Und singen alte Psalmen.
Dieselben Psalmen singt man auch,
Delzweiglein in den Händen,
Muß im Gebirg zu diesem Brauch
Stechpalmen gar verwenden,
Zulezt, man will ein grünes Reiz,
So nimmt man Weidenzweige“ —

und zwar nahm man ehemals in Norddeutschland dazu die Zweige der schönen, schon sehr früh im Jahre blühenden Saalweide (*Salix caprea*), die daher hier auch noch hin und wieder Palmweide genannt wird.

Hundebume, Hundecamille *Anthemis Cotula*.

Hundsbeer s. Foßbeeren.

Ibenboom, Eibenbaum *Taxus baccata*, so benannt, weil sein zähes Holz früher zur Anfertigung der Eiben (b. i. Armbruste) und Bogen benutzt wurde.

Kloß *Hedera Helix*.

Johannisblut *Scleranthus perennis*, an dessen Wurzeln der scharlachrothe *Coccus polonicus* lebt.

Kper, die kleinblättrige Ulme, *Ulmus campestris*.

Kattenkees s. Hasenpöppel.

Kenster, Marentafen soll *Viscum album* genannt werden.

Kettik s. Bullenpöfel.

Klaap *Pedicularis palustris?* (Siemssen).

Klette, plattdeutsch: Klieben (*Lappa spec.*), heißt im engl. burr, im Schwed. burrar und im Dän. burrer und burre, dieser Name scheint in den deutschen Dialecten aber nicht vorzukommen.

Klewer, hochdeutsch: Klee; dänisch: klevver; engl. clover.

Klöter=Jacob (Klapper=Jacob) *Rhinanthus Crista galli*. Diese Pflanze führt auch den Namen Dowe (taube) Rattel, engl. rattle-grass, dänisch rassel, — lauter Namen, die von dem Umstande entlehnt sind, daß ihre Samen in den Kapseln „klötern oder rasseln.“

Knidelbeeren sind die Früchte der *Fragaria collina* (nicht *vesca*!) weil das Abpflücken derselben vom Stelche einen knackenden Ton erzeugt.

Knirk s. Cenbeeren.

Knoop, schwed. knopp-graes ist *Centaurea Scabiosa*, deren Blüthenköpfe sehr groß und kugelig sind: daher erklärt sich auch der obssöne Name Papenklöten.

Kopp=Wied s. Kroppsweide.

Kramsbeeren heißen auf Mügen die Früchte des *Vaccinium Oxycoccus*.

Krazbeeren sollen nach Weigel und Siemssen die Früchte des *Rubus fruticosus* heißen, wahrscheinlich ist dies aber eine Verwechslung mit *R. saxatilis*, der im Schwedischen den Namen krassbaer führt.

Krefenboom *Prunus insititia*.

Krönsbeere (d. h. Kranichbeere) engl. cran-berry, Tytebeer dän. tyttebaer, Preusselbeere (ob von dem slavischen brussnitza durch Einschlebung der Sylbe — el, wie in Brummelbeere von Brombeere, und Hinselbeere von Himbeere?) auch rothe Beesinge, — sind alles Bezeichnungen der Früchte von *Vaccinium Vitis Idaea*. Schon im J. 1795, und früher, kam diese wohlschmeckende Frucht in kleine Tönnchen eingemacht, unter dem Namen „Lingon“ aus Norwegen nach Mecklenburg, und sie wird hier auch noch jetzt hin und wieder von dorthier eingeführt.

Kropp=Kruth ist *Tanacetum vulgare*, weil es gegen den Kropf der Pferde gebraucht wird.

Kropp=Weide, Kopp=Wied ist die gekröpfte (vergl. das engl. to crop d. h. abstoßen) *Salix alba*, deren Stamm durch diese Behandlung eine kopfförmige Anschwellung erhält.

Kübid, dän. kidike, ist *Sinapis arvensis*.

Kuhblume ist in M. durchgängig *Caltha palustris*; auch im Dän. heißt sie koeblomer.

Kufußsalat nennen die Kinder die säuerlich schmeckenden Blätter der *Oxalis Acetosella*; auch Hasenflewer heißen die Blätter.

Lügenblatt, schwed. laekeblad von laeka heißen, ist *Plantago major*, deren Blätter auf Wunden gelegt, für ein gutes Heilmittel galten. Der corrumpirte Name Lügenblatt hat zu einem Kinderspiele Veranlassung gegeben, indem die Kinder aus der Anzahl der aus einem durchrissenen Blatte hervorragenden Blattnerben die Anzahl der Lügen, die sie sich haben zu Schulden kommen lassen, ermitteln wollen.

Leetharl ist *Lolium arvense*; sollte der Name mit dem englischen darnel zusammenhängen?

Liesch, Lüsç, Rusç werden die breiten, schwertblöförmigen Blätter monocotyledonischer Wasserpflanzen (*Iris*, *Typha*) genannt. Erstere Namen könnten mit dem Namen flower de luce zusammenhängen, den die Schwertblölie (*Iris*) im Englischen führt.

Liese, die Faule, ist *Anagallis arvensis*.

Lilgenconsalgen, eine Corruption aus *Lilium convallium*, dem pharmaceutischen Namen der *Convallaria majalis*.

Lingon s. Kronsbeeren.

Löhn, dän. lönn, schwed. lonn, lunn, ist *Acer platanoides*.

Lünich, dän. lemmike, ist *Veronica Beccabunga*.

Lungraff *Lobaria pulmonaria*.

Luusbeeren, d. i. Läusebeeren (wegen der rauhen, kratzenden Samenförner), s. Hambutten.

Luuskrut heißt bei Ludwigslust *Pedicularis palustris*, weil dort, wo diese Pflanze wächst, das Heu nur lausig (d. h. schlecht) gedeihet. Im Dän. entsprechend: luuseurt, luusegraes.

Maibuche, Rothbuche *Fagus sylvatica*.

Marentaken s. Renster.

Marl ist *Melica coerulea*.

Mar-retsch, engl. horse-radish, ist *Cochlearia Armoracia*; dieser Etymologie gemäß ist also auch im Hochdeutschen „Märrettig“ zu schreiben, da der Name von Mähre = Pferd, und nicht von Meer abzuleiten ist. — Andere Beispiele ähnlicher aus Mißverständnis des Plattdeutschen entsprungener hochdeutscher Wortverbrechungen bieten die Namen Maulwurf und Reitwurm dar, welche Muffwurf und Reißwurm lauten müssen, so wie die bekannte Redensart: „sein Schäfchen ins Trockene bringen,“ in welcher aus dem „Schiffchen“ (plattb. Scheepken) gar ein Schaf gemacht worden ist.

Mihre ist *Alsine media*. Rode Mihre *Anagallis arvensis*.

Möhsch, schwed. möska, myska, myskja, dän. myske, mysike, heißt in M. der Waldmeister (*Asperula odorata*).

Muusklewer (Mäuskelee) ist *Trifolium arvense*, wegen seiner grauen, haarigen Blüthenköpfe.

Mägenknee, d. h. mit 9 Knien versehen, dän. knaegraes, heißt *Spergula arvensis*, wegen ihrer vielen (bis 9) starken Internodien.

Deschen, corruptirt aus Desterchen d. h. Osterblume, ist die um Ostern schon blühende *Anemone Hepatica*.

Palmweide s. Hülsebusch.

Papenklöten s. Knoop.

Plogstiert, Briewkruth ist *Ononis spinosa*. Diese Pflanze wird in M. als Anzeichen eines mergelhaltigen Bodens betrachtet, ist aber doch, wo sie häufiger vorkommt, dem Landmanne sehr unangenehm, da ihre starken, zähen und tief in den Boden hinabreichenden Wurzeln beim Pflügen sehr hinderlich sind; die Pflugschar soll sich mitunter eher umbiegen, als daß sie die Wurzel herausriffe.

Pöppelkees s. Hasenpöppeln.

Poggenstohl, engl. ebenso toadstool, ist eine generelle Bezeichnung der Pilze in Mecklenburg. Was mögen nach dem Volksglauben die Poggen (Frösche) mit diesen Pilzen zu thun haben?

Porst und Post, diese beiden Namen werden bei uns vielfach mit einander verwechselt, ersterer gebührt aber nur dem *Ledum palustre*, und mit letzterem bezeichnet man in Mecklenburg die Wasserleuchter-Arten (Characeen). Im Schwed. und Dän. ist pors = *Myrica Gale*, *Myrica* *Gale*, *Myrica* *Gale*.

Preesterkragen, dän. praestekrage, schwed. praestkrage, ist

eine von der Gestalt der Blume hergenommene, sehr bezeichnende Benennung des Chrysanthemum Leucanthemum.

Preusselbeeren s. Kronsbeeren.

Puttgnaden s. Bullgrawen.

Quecke (spottweise auch wohl Sandflewern genannt,) engl. quickgrass, schwed. quicka, quickrot, quickhwete, dän. quikku, quikketa, ist Triticum repens, weil es so quick d. h. voller Lebenskraft und schwer auszurotten ist. — Von eben diesem Worte stammt auch ab der Name:

Quitschenboom, engl. quicken-tree, wohl so benannt wegen der lebhaften rothen und weithin scheinenden Farbe ihrer Beeren. = *Min. wil*
langsam und nicht mit den Wurzeln zu quikken (stark) fließen.
 Kattel s. Klöterjacob.

Reeth, engl. reed, ist Phragmites communis. Im hochdeutschen hat sich der Name nur in dem Worte Niedgras (Carex) erhalten.

Remaas, ein jetzt verschollener Name, den noch im 16. Jahrhundert in Vorpommern das Allium ursinum führte, gehört wohl der slavischen Sprache an. In Schlesien heisst die Pflanze noch jetzt Ramisch.

Rode Mähre s. Mähre.

Rölleke, dän. und norweg. röllike, schwed. rölleka, ist Achillea Millefolium.

Rothbuche s. Maibuche.

Rusch s. Bullenpösel.

Saalweide ist Salix caprea, im Dänischen Selje Vidje, Schwedisch Sälge.

Säkel, Säker s. Aegel.

Salomonsjäger, — siegel (hochd.), Salomons Segl, S. Signet (dänisch), Salomon's Seal (engl.) Sceau de Salomon (franz.), trägt seinen Namen von den kreisrunden, siegelförmigen Narben, die der absterbende Stengel am Wurzelsiock zurückläßt. Eine so wunderbar von der Natur gezeichnete Pflanze mußte früher officinell sein.

Salzfraut, schwed. salt-graes, ist Triglochin maritimum, welches salzhaltige Standorte liebt, obgleich es nicht ausschließlich an solchen vorkommt.

Schalmbaum, dän. und schwed. alm, ist *Ulmus campestris*.

Schawrusch (nicht Schaffrusch!) engl. shavegras, schwed. skaf-roer von skafva schaben, also Schabe-gras oder -rohr, ist *Equisetum hiemale*, dessen rauhe Stengel zum Glätten und Abschaben von verschiedenen Handwerkern benutzt werden. Die Endsyllbe Rusch ist schon erklärt.

Schinnwatt, in der Umgegend von Münster (Westphalen) Schienefoot, ist *Chelidonium majus*.

Schmargeln und Schmarten sollen die Beeren des *Rubus alpinus* benannt werden.

Schnittgras sind *Carex spec.*, wegen der scharfen, beim Abpflücken schneidenden Ranten, welche die Stengel mancher Arten haben. Der hochdeutsche Name Segge findet sich auch in dem engl. sedge wieder. Vergl. Reeth.

Schriep wird in der Umgegend von Sülz *Plantago maritima* genannt.

Schwabengrüze sind die Samenkörner des Mannagrases (*Glyceria fluitans*).

Schwändel sind die Wasserranunkeln (*Batrachium aquatilo divaricatum*, *fluitans*), oder auch *Potamogeton spec.*, also ein Collectivname, wie Grundnettel.

Schwiebkohl (d. h. Schweine-) ist *Sonchus oleraceus* und *asper*.

Schwulstkruth, Bögelskruth ist *Senecio vulgaris*.

Spierbaum ist *Sorbus torminalis*.

Spillbaum d. h. Spindelbaum (engl. spindle-tree) ist *Eonymus europaeus*.

Sprickern, schwed. sprakved d. h. Holz, welches im Feuer knackt oder prasselt, ist *Rhamnus Frangula*.

Spricklilgen, Waldwinde, engl. woodbine (vielleicht aus woodbind, d. h. auch Waldwinde, corruptirt?) ist *Lonicera Periclymenum*.

Sprockwied (sprock = brüchig) ist *Salix fragilis*.

Stäckführn (d. h. Stechkörner) sind die als Volksmittel gegen Seitenstechen verwandten Samen der *Datura Stramonium* und des *Silybum Marianum*.

Stah up und geh weg (stehe auf und wandele!); mit diesem Namen bezeichnete man nach Simon Pauli schon um das J. 1640 in Mecklenburg *Erythraea Centaurium*, und zwar ohne Zweifel, weil diese Pflanze früher als Mittel gegen das Podagra gebraucht wurde. — In neuerer Zeit scheint aber jener Name für diese Pflanze gänzlich verloren gegangen zu sein, und man hat ihn irrthümlich auf die etwas ähnliche *Gentiana campestris* übertragen, wo er aber gar nicht motivirt ist. F. Schults sagte mir vor etwa 25 Jahren einmal, daß man damals jene beiden Pflanzen so benenne, — jetzt versteht man nur noch die letztere allein darunter.

Stechpalme s. Hülsebusch.

Stiernschott d. i. Sternschuß oder — schnuppe, ist *Nostoc commune*, welches sich nach warmem Regen oft plötzlich in Menge auf den Wiesen zeigt; daher im Schwed. ähnlich sky-fall d. h. aus den Wolken gefallen, und im Dän. skyefald.

Stinkstruht s. Adebarskasbeeren.

Sührken, dat rohde, ist *Rumex Acetosella*.

Taage (d. h. zähe) Aesche s. Aesche.

Teufelsabbiß (*Succisa pratensis*), dievelsbid (dän.), devil's-bit (engl.), mors de diable (franz.), ist von dem Eindruck der Zähne so benannt, den man an der Wurzel zu bemerken glaubte und den man dem Teufel zuschrieb; er biß die Wurzel ab, weil er ihre Heilskraft (gegen Zauberei) den Menschen nicht gönnte.

Theerbeeren s. Boarndreck.

Thremse ist *Centaurea Cyanus*.

Thunriede ist ein Collectivname für verschiedene die Bäume durchdringende Pflanzen, wie *Galium Aparine*, *Bryonia alba*, *Convolvulus sepium*.

Thunriede (Baunseide) aber ist *Cuscuta europaea*.

Tytebeeren s. Kronsbeeren.

Unvertreed (d. h. was nicht vertreten werden kann) ist *Polygonum aviculare*, eine äußerst wehrsame Pflanze, die daher auch im Schwed. den Namen trampgræs d. h. Tretgras führt.

Vögelkruth ist *Senecio vulgaris*, ein Lieblingsfutter für manche Stubenvögel, wie z. B. die Canarienvögel; s. auch Schwulstkruth.

Walbwinde f. Sprinklisgen.

Wäpelsburn soll *Rosa canina* sein; ebenso auch Weichselburn und Weichselburn, doch möchte ich glauben, daß mit letzteren Namen, wie mit dem schwed. wigeltorn, vielmehr *Rhamnus catharticus* bezeichnet werde.

Weedwinde ist *Convolvulus arvensis*.

Weißbuche f. Hagebuche.

Weizen stammt von dem gothischen hvateis.

Wesselbeeren (d. h. Wechsel-) heißen im Plattdeutschen die Bogelfirschen (*Prunus avium*).

Wied (Weide) f. die verschiedenen Arten unter „Amts-W., Bitter-W., Blank-W., Brook-W., Elf-W., Gäh-W., Kopp-W., Kropp-W., Palm-W., Saal-W., Sprock-W.“

Wintergrön (—grün) ein Collectionname für verschiedene immergrüne Pflanzen, wie *Hedera* und *Vinca*; im Dän. bez. vintergrön *Hedera*, *Pyrola* und? *Trientalis*.

Witt Wäselken, d. h. weißes Wieselchen, ist *Draba verna*.

Wödenbunt *Cicuta virosa*.

Wörnth, engl. worm-wood d. h. Wurmholz, ist *Artemisia Absinthium*; Water-W. ist *A. maritima*.

Wriewkruth f. Plogfiert.

Wulverlei, d. h. Wohl verlei, ist *Arnica montana*.

Zesenbraam ist *Mentha viridis*.

III. Das Bürgerrecht.

Hinsichtlich des dritten Punktes auf den ich bei meiner Arbeit besonders Rücksicht genommen habe, tritt uns sogleich die Frage entgegen: „darf jede innerhalb der Landesgränzen gefundene Pflanze mit gleichem Rechte Anspruch an das Bürgerrecht erheben, oder sind in dieser Beziehung bestimmte Unterschiede zwischen ihnen zu machen?“ Ich glaube, daß letzteres geschehen muß, indem man einen viel klareren Ueberblick über die Landesflora gewinnt, wenn

man ihre Bestandtheile nach verschiedenen Kategorien trennt. Ich unterscheide demnach in unserer Landesflora die eingeborenen, die recipirten und die erratischen Pflanzen als besondere Gruppen.

1. Unter den eingeborenen oder Urpflanzen verstehe ich natürlich nicht diejenigen Pflanzen, welche während einer der früheren geologischen Epochen zuerst auf dem Raume der Erdfugel, welcher jetzt Mecklenburg genannt wird, emporkeimten, sondern diejenigen, welche in dem ersten Zeitraume der gegenwärtigen Epoche, bevor der Mensch seinen cultivirenden Einfluß auf unseren Boden ausübte, sich aus freien Stücken hier ansiedelten. Dies geschah nachdem die tertiäre Flora, deren reiche, leider noch unerforschte Reste in den Braunkohlenlagern bei Malß und Parchim begraben liegen, durch die Diluvialkatastrophe vernichtet worden war, denn durch diese erhielt unser Boden eine neue, aus den Trümmern zerstörter Felsmassen bestehende Decke. Wie diese sich wieder mit neuem Pflanzentwuchs, — dem Grundbestandtheil unserer jetzigen Flora, — bekleidete, ist ein Räthsel zu dessen vollständiger Lösung uns die Hülfsmittel durchaus fehlen. Einzelne Arten tertiärer Pflanzen mögen in ihren Samen jene Katastrophe überdauert haben und von Neuem auf dem Diluvium emporgekeimt sein; die Samen anderer mögen uns mit den Diluvialmassen selbst aus nördlicheren Gegenden zugeführt sein¹; andere

1. Auf diesen Gegenstand hat G. Brückner zuerst meine Aufmerksamkeit gelenkt, und damit einen neuen Berührungspunkt zwischen den Botanikern und Geognosten Mecklenburgs aufgefunden. Wenn diese Hindernung auch jetzt noch ohne bestimmte Begründung dasteht, so kann sie vielleicht bei fernerer besonnener Forschung eine solche erhalten, und dann zu interessanten wissenschaftlichen Folgerungen führen,

wurden über den neuen Boden hin durch Wind, Vögel und andere Zufälle verbreitet, deren nähere Erörterung für uns von keinem erheblichen Interesse sein kann. Wie viel Zeit darüber verfloß, bevor das Land seinen neuen, aus den eben bezeichneten Bestandtheilen zusammengewebten Pflanzenteppich erhielt, kann uns ebenfalls gleichgültig sein; die Hauptsache für uns ist es, daß bei allen diesen Vorgängen die Mitwirkung des Menschen völlig ausgeschlossen war. Diese Pflanzen, welche sich ohne alle menschliche Beihülfe in der Urzeit der jetzigen geologischen Epoche hier ansiedelten, und welche auch jetzt noch immer der Zahl ihrer Arten nach ein großes Uebergewicht über die späteren Eindringlinge behaupten¹, betrachte ich als den wichtigsten Theil, den eigentlichen Stamm unserer Flora; ihnen, deren Ansiedlung allein durch Naturgesetze und Naturkräfte bedingt war, würde, wenn man mit aller Strenge verfahren wollte, auch nur allein das Bürgerrecht in unserer Flora zukommen.

2. Neben diesen Pflanzen hat sich aber später, seit Menschen dies Land bewohnten und cultivirten, noch eine ansehnliche Zahl von Arten unter der Aegide dieser Cultur hier eingenistet und sich ebenso völlig heimisch gemacht, als jene ersten Ansiedler es schon waren. Diese Pflanzen

weßhalb man sie im Auge zu behalten hat. Vielleicht, daß es noch einmal gelingt, eben so für die auffallenden Verbreitungskreise mancher unserer Pflanzen bestimmte, durch die Diluvialbildung bedingte Ausgangspunkte nachzuweisen, wie dies schon jetzt in Betreff mancher Gesteine, aus denen die Diluvialmassen bestehen, der Fall ist.

1. Fast völlig rein hat sich die große, wenigstens zwei Drittheile der mecklenburgischen Pflanzenarten enthaltende Classe der Acotyledonen von späteren Beimischungen erhalten, indem wir nur ein einziges Lebermoos und einige wenige auf bestimmten cultivirten Pflanzen schmarogirende Pilze als solche nachweisen können.

sind es, welche ich unter dem Namen der recipirten oder eingebürgerten zusammenfasse, und welche einen zweiten, secundären Bestandtheil unserer Flora bilden. Diese recipirten Pflanzen sind theils solche, welche man in früherer Zeit als Nahrungspflanzen, Färbepflanzen, officinelle Pflanzen und auch Zierpflanzen allgemeiner cultivirte, und welche entweder aus angeborenem Freiheitstrieb der Aufsicht ent-
 schlüpften, oder, weil man ihrer bei verändertem Cultur-
 zustande nicht mehr bedurfte, vernachlässigt die dargebotene Freiheit benutzten, und nun in Feld und Wald ent-
 schlüpfend, sich in ihrer Lebensweise den alten Bürgern unserer
 Flora völlig gleich stellten, wie dies z. B. mit *Humulus*
Lupulus, *Cochlearia Armoracia*, *Carum Carvi*, *Oenothera*
biennis, *Anthemis arvensis*, *Onopordon Acanthium*, *Acorus*
Calamus, *Datura Stramonium*, *Hyoscyamus niger*, *Ar-*
temisia Absinthium, *Ornithogalum nutans* u. s. w. der
 Fall gewesen zu sein scheint. Noch weit zahlreicher aber
 waren diejenigen Pflanzen, welche seit den ersten Anfängen
 der Acker- und Garten-Cultur hieselbst als unzertrennliche
 Begleiter der Culturpflanzen, wider den Willen des Men-
 schen, mit diesen zusammen als Unkräuter in das Land
 eingeschleppt wurden, und welche vermöge ihrer kosmopoli-
 tischen Natur, welche leider auch so vieles thierische Unge-
 ziefer besitzt, dies Land bald völlig als ihre Heimath zu
 betrachten anfangen¹. So schlepten z. B. die Cerealien

1. Bei manchen dieser Pflanzen ist aber (worauf Wahlberg schon vor längerer Zeit aufmerksam gemacht hat,) die Einbürgerung nur eine scheinbare, indem die Samen der Unkräuter jährlich mit den Culturpflanzen unabsichtlich eingeerndet und auch wieder ausge-
 säet werden; ohne menschliche Beihülfe würden sie, der winterlichen Kälte ohne Schutz Preis gegeben, bald zu Grunde gehen.

die Papaver-Arten, *Agrostemma Githago*, *Centaurea Cyanus*, *Ranunculus arvensis*, *Lolium temulentum*, *Avena strigosa*, *Sinapis arvensis* u. f. w. ein; der Lein: *Camelina sativa*, *Neslea paniculata*, *Lolium arvense*, *Lepidium sativum*, *Cuscuta epilinum*; der Hanf: die *Orobanche ramosa*, die Kückengewächse: *Euphorbia Peplus*, *Solanus nigrum*, *Fumaria officinalis* u. f. w. Einzelne Arten endlich haben auch durch anderweitige Zufälle noch in neuerer Zeit sich völlig bei uns eingebürgert, wie z. B. *Erigeron canadense*, *Leersia oryzoides* und? *Alyssum calycinum*; noch andere scheinen sogar noch gegenwärtig damit beschäftigt zu sein, wie z. B. *Galinsogea parviflora*, *Rudbeckia laciniata* und *Collomia grandiflora*.

3. Zu allen diesen vorstehend bezeichneten Pflanzen gesellen sich nun noch einige, die ich mit dem Namen der erratischen bezeichne. Ich verstehe darunter solche, welche durch ihren fremdartigen Character, ihr vereinzelt und unbeständiges Vorkommen und ihre auffallenden Standorte als nur temporär verwilderte oder durch Zufall ausgesäete Pflanzen sich zu erkennen geben. So ist z. B. durch Zufall manche cultivirte Pflanze zeitweise den Gärten ent-
schlüpft, was namentlich bei Ludwigslust geschehen ist, wo im Laufe des letzten Jahrhunderts theils in den fürstlichen, theils in privaten Gärten so viele ausländische Arten gezogen worden sind, von denen nun z. B. *Epimedium alpinum*, *Potentilla recta*, *Rosa pimpinellifolia*, *Omphalodes verna*, *Geranium phaeum*, *Biotia macrophylla*, *Allium carinatum* und manche andere über die Gränzen der Gärten hinausgeschweift sind, — lauter Pflanzen, welche unserer eingebornen norddeutschen Flora völlig fremd

sind. Manche Gartenpflanzen werden auch nicht selten mit Dung auf die Felder verschleppt, wo sie sich dann auf längere oder kürzere Zeit in kleinen Colonien ansiedeln, wie z. B. *Ornithogalum umbellatum*, *Muscari botryoides* u. a. Andere Fremdlinge zeigen sich hin und wieder unter dem Getreide, der Luzerne, dem Wein, aber stets nur vereinzelt und bald wieder verschwindend, weil ihr Same nur zufällig mit ausländischer Saat eingeführt wurde und sie sich hier nicht zu acclimatificiren vermögen, wie dies z. B. der Fall ist mit *Adonis aestivalis*, *Papaver hybridum*, *Saponaria Vaccaria*, *Silene noctiflora*, *Centaurea solstitialis* und *Calcitrapa*, *Helminthia echiodes*, *Specularia Speculum*. Noch andere Pflanzen dieser Art kommen endlich zufällig durch Schiffsverkehr an unsere Küsten, und zeigen sich an den Ballaststellen unserer Häfen und in der Nähe derselben, was namentlich bei Warnemünde und Rostock schon mehrfach beobachtet worden ist (z. B. *Fumaria densiflora*, *Diploxaxis tenuifolia*, *Hordeum maritimum*, *Bunias orientalis*).

Alle diese erratischen Pflanzen können nun ebenso wenig auf das Bürgerrecht in der mecklenburgischen Flora Anspruch machen, als z. B. die nordafrikanische *Otis houbara* und die südeuropäische *Sphinx Nerii* zu unserer Fauna gehören, obgleich beide schon einmal innerhalb der Gränzen unseres Landes als Streifzügler gesehen worden sind. Erwähnt müssen in den Florenverzeichnissen zwar auch diese verirrtten Pflanzen werden, es muß aber in der Weise geschehen, daß sie als ein fremdartiger Bestandtheil der Flora sogleich in die Augen fallen. Ich habe sie daher in dem späterhin folgenden Pflanzenverzeichnisse zwar namhaft ge-

macht, sie aber in der fortlaufenden Reihe unserer Pflanzenbürger ohne Zahl und mit kleinerer Schrift gedruckt, eingeschoben, so daß sie bei den statistischen Berechnungen nicht mit in Anschlag kommen.

Sehr wünschenswerth würde es sein, wenn wir auch die Gruppe der recipirten Pflanzen auf gleiche Weise aus unseren Florenverzeichnissen ausscheiden könnten, denn sie trüben sehr wesentlich die wissenschaftliche Erkenntniß und klare Anschauung der eigenthümlichen Landesflora, indem sie deren individuelle Eigenthümlichkeit verdunkeln und besonders die Vergleichung verschiedener Floren mit einander sehr trüglisch machen. Will man z. B. zwei deutsche Florengebiete (etwa die von Mecklenburg und Nassau) mit einander vergleichen, und berechnen, wie viele gemeinschaftliche Pflanzen beide haben, und wie viele jedem dieser Länder nur allein zukommen, so wird man, wenn die recipirten Pflanzen nicht vorher ausgeschieden werden, zu einem gänzlich falschen Schlusse über den Grad der Verwandtschaft zwischen diesen Floren gelangen, indem die große Anzahl der in beiden eingebürgerten Pflanzen dieselbe weit größer erscheinen lassen wird, als sie in der That ist, wenn man nur die ihnen ursprünglich angehörigen in Anschlag bringt. Für die wissenschaftliche Betrachtung der Landesflora wäre es also, wie gesagt, sehr vortheilhaft, wenn man auch alle diese Eindringlinge ganz unberücksichtigt lassen könnte, — allein dem steht leider ein großes Hinderniß dadurch im Wege, daß man bei vielen Pflanzen nicht mit Bestimmtheit nachweisen kann, ob sie eben Eindringlinge sind, oder nicht. Zwar tragen sie eine Art von Geburtschein in der eigenthümlichen Weise ihres Vorkommens bei sich, indem

sie meistens ausschließlich, oder doch vorzugsweise auf cultivirte Plätze beschränkt sind, und daher wohl anzunehmen ist, daß sie, bevor es Bodencultur im Lande gab, aus Mangel an zusagenden Wohnplätzen nicht vorhanden waren; allein allzu fest dürfen wir auch auf diese Annahme nicht bauen, da (wie Röper schon darauf hingewiesen hat,) auch einzelne Urpflanzen, deren Wohnplätze sich die Cultur bemächtigte, sich auf die cultivirten Räume geflüchtet und dort auch behauptet haben mögen. Doch dürfen wir wohl alle diejenigen Pflanzen wenigstens, welche durch weite Ländergebiete hindurch gleichmäßig und ausschließlich nur an cultivirten Orten vorkommen (wie sehr auch die Urpflanzen in diesen Ländern verschieden sein mögen), als fremde Eindringlinge betrachten, und von diesem Grundsatz ausgehend, werde ich in der später folgenden Uebersicht unserer Flora alle diejenigen Arten, bei denen es mir wahrscheinlich ist, daß sie in die Kategorie der recipirten Pflanzen gehören, zwar nicht aus der Zahl unserer Pflanzenbürger ausschließen, aber doch durch einen vorgesetzten Stern sogleich kenntlich machen.

Stellen wir alle unserer Flora ursprünglich fremden Pflanzen, nach der Art, wie sie ihr Einbringen in Mecklenburg bewerkstelligt haben mögen, zusammen, so wird sich etwa folgendes Resultat ergeben:

1. Es haben sich wider den Willen des Menschen, in den meisten Fällen aber doch mit dessen unabsichtlicher Beihülfe, eingeschlichen und vollständig eingebürgert:

Ranunculus arvensis.	Papaver Rhoeas.
Delphinium Consolida.	dubium.
Papaver Argemone.	Chelidonium majus.

<i>Fumaria officinalis.</i>	<i>Cirsium arvense.</i>
<i>Barbarea praecox.</i>	<i>Carduus acanthoides.</i>
<i>Sisymbrium officinale.</i>	<i>Onopordon Acanthium.</i>
<i>Erysimum cheiranthoides.</i>	<i>Centaurea Cyanus.</i>
<i>Sinapis arvensis.</i>	<i>Sonchus oleraceus.</i>
<i>Alyssum calycinum.</i>	asper.
<i>Camelina sativa.</i>	<i>Xanthium Strumarium.</i>
<i>Thlaspi arvense.</i>	<i>Campanula Rapunculus.</i>
<i>Lepidium campestre.</i>	rapunculoides.
sativum.	<i>Cuscuta Epilinum.</i>
<i>Senebiera Coronopus.</i>	<i>Lithospermum officinale.</i>
<i>Neslea paniculata.</i>	arvense.
<i>Raphanus Raphanistrum.</i>	<i>Anchusa arvensis.</i>
<i>Agrostemma Githago.</i>	<i>Solanum nigrum.</i>
<i>Oxalis stricta.</i>	<i>Hyoseyamus niger.</i>
corniculata.	<i>Antirrhinum Orontium.</i>
<i>Ervum hirsutum.</i>	<i>Linaria minor.</i>
tetraspermum.	Elatine.
<i>Oenothera muricata.</i>	vulgaris.
<i>Bryonia alba.</i>	<i>Veronica agrestis.</i>
<i>Falcaria Rivini.</i>	Buxbaumii.
<i>Aethusa Cynapium.</i>	hederaefolia.
<i>Caucalis daucoides.</i>	<i>Melampyrum arvense.</i>
<i>Chaerophyllum bulbosum.</i>	<i>Orobanche ramosa.</i>
<i>Sherardia arvensis.</i>	<i>Nepeta Cataria.</i>
<i>Asperula arvensis.</i>	<i>Lamium amplexicaule.</i>
<i>Valerianella olitoria.</i>	purpureum.
coronata.	<i>Galeopsis Ladanum.</i>
dentata.	ochroleucum.
Auricula.	<i>Stachys arvensis.</i>
<i>Erigeron canadensis.</i>	annua.
<i>Anthemis arvensis.</i>	<i>Marrubium vulgare.</i>
Cotula.	<i>Leonurus Cardiaca.</i>
<i>Chrysanthemum segetum.</i>	Marrubiastrum.
<i>Senecio vulgaris.</i>	<i>Anagallis arvensis.</i>

<i>Chenopodium hybridum.</i>	<i>Panicum filiforme.</i>
urbicum.	crus galli.
murale.	<i>Setaria verticillata.</i>
album.	viridis.
glaucum.	glauca.
polyspermum.	<i>Alopecurus agrestis.</i>
Vulvaria.	<i>Leersia oryzoides.</i>
<i>Blitum bonus Henricus.</i>	<i>Apera Spica venti.</i>
rubrum.	<i>Avena strigosa.</i>
<i>Artiplex roseum.</i>	fatua.
<i>Polygonum Convolvulus.</i>	<i>Bromus secalinus.</i>
dumetorum.	mollis.
<i>Euphorbia helioscopia.</i>	arvensis.
Peplus.	<i>Gaudinia fragilis.</i>
exigua.	<i>Hordeum murinum.</i>
<i>Mercurialis annua.</i>	<i>Lolium temulentum.</i>
<i>Urtica urens.</i>	perenne.
dioica.	arvenso.

2. Verwilderte, der Cultur entflohenen Pflanzen, von denen nur die mit einem * bezeichnete Minderzahl als local oder allgemein eingebürgert zu betrachten ist, sind nach meinem Dafürhalten folgende:

<i>Eranthis hiemalis.</i>	* <i>Viola odorata.</i>
<i>Helleborus viridis.</i>	* <i>Reseda luteola.</i>
foetidus.	* <i>Saponaria officinalis.</i>
<i>Berberis vulgaris.</i>	<i>Silene Armeria.</i>
<i>Epimedium alpinum.</i>	conica.
<i>Brassica oleracea.</i>	<i>Malva mauritiana.</i>
Rapa.	<i>Geranium phaeum.</i>
Napus.	pyrenaicum.
nigra.	<i>Erodium moschatum.</i>
* <i>Sinapis alba.</i>	<i>Cytisus nigricans.</i>
<i>Hesperis matronalis.</i>	<i>Medicago sativa.</i>
* <i>Cochlearia Armoracia.</i>	* <i>Melilotus alba.</i>

**Trifolium pratense*.

**repens*.

Galega officinalis.

Ervum monanthos.

**Prunus insititia*.

**avium?*

Potentilla recta.

alba.

Rosa pimpinellifolia.

cinnamomea.

turbinata.

**Oenothera biennis*.

Portulaca oleracea.

Sedum album.

hybridum.

**Ribes grossularia*.

**rubrum*.

**Carum Carvi?*

Bupleurum rotundifolium.

Levisticum officinale.

**Pastinaca sativa?*

Anthriscus Cerefolium.

Sambucus Ebulus.

**nigra?*

Aster salicifolius.

Novi Belgii.

Biotia macrophylla.

**Inula Helenium*.

Galinsogea parviflora.

Rudbeckia laciniata.

Helianthus tuberosus.

**Artemisia Absinthium*.

pontica.

**Matricaria Chamomilla?*

**Chrysanthemum Parthenium*.

**inodorum*.

Calendula officinalis.

Echinops sphaerocephalus.

Silybum marianum.

Tragopogon porrifolius.

Lactuca virosa.

Ligustrum vulgare.

Collomia grandiflora.

Omphalodes verna.

Borago officinalis.

Physalis Alkekengi.

Nicandra physaloides.

Atropa Belladonna.

Lycium barbarum.

**Datura Stramonium*.

Verbascum speciosum.

Blattaria.

Scrophularia vernalis.

Elsholtzia cristata.

Amaranthus Blitum.

retroflexus.

Blitum virgatum.

Atriplex hortense.

Daphne Mezereum.

**Aristolochia Clematidis*.

**Parietaria officinalis*.

Cannabis sativa.

**Humulus Lupulus*.

**Acorus Calamus*.

Narcissus Pseudo-Narcissus.

Leucojum vernalum.

aestivum.

Tulipa sylvestris.

**Ornithogalum nutans*.

umbellatum.

Allium Schoenoprasum,
carinatum.

**Muscari botryoides*.

Colchicum autumnale.

**Panicum sanguinale*.

Phalaris canariensis.

Avena flavescens.

Lolium italicum.

3. Für verirrete, d. h. nur zufällig mit anderen Sämereien verstreute, aus den Gärten entflozene, oder durch den Schiffsverkehr mit der Ballasterde fremder Länder an unsere Küste verschleppte Pflanzen, welche nur zeitweise in unserer Flora auftauchen und immer bald wieder verschwinden, halte ich folgende:

Adonis aestivalis.

Papaver hybridum.

Fumaria densiflora.

Arabis pauciflora.

Diplotaxis tenuifolia.

Lepidium latifolium.

Bunias orientalis.

Viola uliginosa?

Reseda lutea.

Saponaria Vaccaria.

Silene noctiflora.

Dianthus barbatus.

Lathyrus tuberosus.

Ononis arvensis.

Medicago maculata.

Rosa lucida.

Scandix Pecten.

Asperula tinctoria.

Carduus pycnocephalus.

Centaurea calcitrapa.

solstitialis.

Helminthia echioides.

Specularia Speculum.

Nonnea pulla.

Linaria arvensis.

Echinopsilon hirsutus.

Obione portulacoides.

Chenopodium Botrys.

Polygonum tataricum.

Calamagrostis litorea.

Avena brevis.

Polypogon monspeliensis.

Poa procumbens.

Hordeum maritimum.

Lunularia vulgaris.

4. Endlich kommen auch noch einige für unsere Flora zweifelhafte Pflanzen in Betracht. Es sind dies theils Pflanzen, deren ganzes Vorkommen zweifelhaft ist, da dasselbe niemals durch einen bestimmt nachweisbaren

Fund dargethan worden ist, theils diejenigen, bei denen die Richtigkeit der specifischen Bestimmung Zweifel erweckt. Es gehören in diese Kategorien:

<i>Glaucium luteum.</i>	<i>Pulmonaria angustifolia.</i>
<i>Viola persicifolia.</i>	<i>Veronica praecox.</i>
<i>Dianthus arenarius.</i>	<i>Teucrium Scorodonia.</i>
<i>Cerastium brachypetalum.</i>	<i>Utricularia spectabilis.</i>
<i>Trapa natans.</i>	<i>macroptera.</i>
<i>Bryonia dioica.</i>	<i>Asarum europaeum.</i>
<i>Galium parisiense.</i>	<i>Narthecium ossifragum.</i>
<i>Convolvulus Soldanella.</i>	<i>Stipa pennata.</i>

Welche Ursache des Zweifels in Betreff jeder einzelnen der hier aufgezählten Pflanzen obwaltet, wird in der systematischen Uebersicht der Flora genauer erörtert werden, da diese ohne Ausnahme alles enthalten wird, was bis jetzt (mit Recht oder Unrecht) zur mecklenburgischen Flora gerechnet worden ist. Wie sehr man daher auch von den Principien abweichen möge, welche ich bei dem später folgenden Floren-Verzeichnisse befolgt habe, so wird es doch bei dem practischen Gebrauche, wie ich hoffe, Niemand im Stiche lassen; denn wenn man nur wissen will, was bis jetzt gefunden worden ist und wo es vorkommt, so bleibt es gleichgültig, ob eine Pflanze als Species, Varietät oder Bastard, aufgeführt, und ob ihr das Bürgerrecht ertheilt oder vorenthalten worden ist.

Standorte habe ich nur bei den Phanerogamen, Farnen und Algen angeführt, und zwar auch nur bei den seltneren, nicht allgemein durch das Land verbreiteten Pflanzen. Auch hier that eine Revision sehr Noth, und ich habe stillschweigend manchen verdächtigen Fundort, der

von meinen Vorgängern angegeben war, ausgeschlossen. — Den einzelnen Arten Beschreibungen hinzuzufügen, würde eine überflüssige Raumverschwendung sein, da es ja schon so viele allgemeine deutsche Floren mit Gattungs- und Speciesdiagnosen giebt (z. B. von Garcke für die Phanerogamen und von Rabenhorst für die Kryptogamen), aus denen der Botaniker sich Rathes erhalten kann.

IV. Geographische Verbreitung der Pflanzen.¹

Wenn auch das gesammte Gebiet unserer Flora nur klein ist, indem es nur einen Flächenraum von etwa 292 □M. umfaßt, so treten darin dennoch, wenn man die geographische Verbreitung der einzelnen Pflanzen ins Auge faßt, einige der näheren Berücksichtigung werthe Erscheinungen hervor. Da unserem Lande Gebirge gänzlich fehlen,

1. Bei der Ausarbeitung dieses Abschnittes ist mir das botanische Tagebuch sehr zu Statten gekommen, welches ich auf den Rath meines Oheims G. Brückner seit dem Jahre 1834 über alle meine Excursionen geführt, und worin ich Namen und Standort jeder Pflanze aufgezeichnet habe, die mir von einigem Interesse zu sein schien. Jetzt thut es mir Leid, daß diese Notizen nicht noch umfangreicher ausgefallen sind, denn vieles, was mir damals der Aufzeichnung nicht werth schien, hat bei der vorliegenden Arbeit große Bedeutung für mich erlangt. — Durch eigene Erfahrung belehrt, kann ich daher nicht unterlassen allen denen, welche die Natur zu ihrem Studium machen, noch einmal (vergl. Archiv IV. 178 ff.) dringend ans Herz zu legen, alle ihre Beobachtungen sogleich an Ort und Stelle niederzuschreiben, und die eingesammelten Objecte sogleich sorgfältig zu etikettiren. Ich berufe mich für diesen Rath auf eine Autorität, die kein Naturforscher unbeachtet lassen darf, — auf Saussüre. Derselbe sagt: „Eine sehr häufige Quelle von Irrthümern ist es, wenn man der Treue seines Gedächtnisses oder der Richtigkeit seiner ersten Wahrnehmung ein allzu großes Vertrauen schenkt. Zu diesen beiden Arten von Vertrauen ist man sehr leicht geneigt, und man kann sich gegen die häufig aus denselben entspringenden Irrthümer nur dadurch sichern, daß man sogleich an

— denn die höchsten Erhebungen des Bodens erreichen kaum die Höhe von 600 Fuß, — so können auf diesem kleinen Areale klimatische Ursachen, die sonst einen so bedeutenden Einfluß auf die Vertheilung der Pflanzen ausüben, hier zur Erklärung der angedeuteten Erscheinung nicht herbeigezogen werden. Es verbleibt uns dazu nur die verschiedenartige geognostische Beschaffenheit des Bodens in einzelnen Landestheilen, so wie der Einfluß, den eine gewisse chemische Beschaffenheit des Wassers, durch welches die Wurzeln der Pflanzen getränkt werden, an einigen Localitäten auf dieselben ausübt.

Auch hinsichtlich der geographischen Vertheilung der einzelnen Pflanzenspecies läßt sich unsere Flora in mehrere Elemente zerlegen. Nämlich während gewisse Species in größerer Anzahl durch das ganze Gebiet ziemlich gleich-

Ort und Stelle alle Beobachtungen, welche von einiger Wichtigkeit zu sein scheinen, vorzüglich wenn sie etwas verwickelt sind, aufschreibt, und sorgfältig etikettirte Proben der Gegenstände mitnimmt, welche das Object der Beobachtung bilden: denn es sind nicht allein die seltenen und außergewöhnlichen Gegenstände, von welchen man Proben einsammeln muß. Der Zweck des Naturforschers ist nicht der, eine Sammlung von Curiositäten zusammen zu bringen, sondern er muß Proben von den scheinbar gemeinsten Dingen einsammeln, weil die genaue Untersuchung ihrer Beschaffenheit für die Wissenschaft von Interesse sein kann. Er sichert sich dadurch die Mittel seine ersten Wahrnehmungen zu bestätigen oder zu berichtigen, und tiefere Untersuchungen und Vergleichen anzustellen, welche sogleich an dem Fundorte selbst vorzunehmen ihm unmöglich war.“ — An einer anderen Stelle sagt Saussure noch über denselben Gegenstand: „Zuweilen habe ich aus kleinen Umständen Licht gezogen, die ich, ohne ihren Werth zu kennen, aus bloßer Liebe zur Genauigkeit an Ort und Stelle selbst zu Papier gebracht hatte. Allein wie oft habe ich nicht herzlich bedauert, daß ich die Aufzeichnung von irgend einem Detail vernachlässigte, dessen Werth ich erst einsah, wenn es mein Gedächtniß nicht mehr zurückerufen konnte.“

mäßig verbreitet sind, andere Arten aber nur vereinzelt und so sporadisch vorkommen, daß sich daraus bei uns wenigstens keine gesetzmäßige Beziehung zu den geognostischen Eigenthümlichkeiten des Bodens erkennen läßt, bleibt endlich noch eine beträchtliche Anzahl von Pflanzen übrig, bei denen eine solche Beziehung mehr oder weniger deutlich zu Tage tritt, indem sie entweder ausschließlich, oder vorzugsweise in Gegenden von einer bestimmten geognostischen Bodenbeschaffenheit zum Vorschein kommen. Doch ist die Abhängigkeit der Pflanzen von der mineralischen Beschaffenheit des Bodens hier lange nicht so groß und in die Augen fallend, als man dies in anderen Ländern mit schärfer ausgeprägten geognostischen Eigenthümlichkeiten gefunden haben will. „Beobachtung der einheimischen Flora, (so habe ich mich über diesen Gegenstand schon an einer anderen Stelle ausgesprochen^{1.}), würde unsere Botaniker nimmer auf die Lehre von den bodensteten, bodenholden und bodenvagen Pflanzen geführt haben, da erstere (mit Ausnahme der ausschließlich auf Salzboden wachsenden,) hier fast gar nicht vorkommen, die bodenholden aber, je nachdem sie den Kalk, Thon oder Sand lieben, meistens mit so geringen Quantitäten dieser Stoffe sich begnügen, daß sie die zu ihrer Existenz nöthige Menge derselben in unseren buntgemischten diluvialen Lagern häufig auch da antreffen, wo keins dieser Mineralien vorzugsweise den Character des Bodens bestimmt, — ja mitunter dem bloßen Auge gar nicht einmal vorhanden zu sein scheint.“ Dennoch können wir, je nachdem auf der Oberfläche un-

1. Die Insel Rügen. Reise = Erinnerungen von E. Boll. Schwerin 1858 S. 170.

feres diluvialen Bodens in größerer Erstreckung Haide, Sand oder Lehm vorkommt, auch drei diesen Bodenarten entsprechende Florengebiete unterscheiden, deren charakteristische Eigenthümlichkeit aber weniger in dem ausschließlichen Vorkommen gewisser Pflanzenarten innerhalb der einzelnen Gebiete, als in dem häufigeren Vorkommen, der üppigeren Entwicklung und in der bestimmten Zusammengruppirung gewisser Pflanzen besteht, von denen wir aber die meisten vereinzelter, und mit anderen Arten vergesellschaftet, auch noch in anderen Florengebieten wieder antreffen. Es scheint also weniger der mineralische Stoff des Bodens, als (wenn ich mich so ausdrücken darf,) die ganze physische Constitution desselben zu sein, welche die Wahl der Pflanzen auf bestimmte Standorte hinlenkt.

1. Das Hauptgebiet unserer **Haideflora** ist die 40 bis 50 □M. große Haideebene, welche von der Stör und Elbe im N., der Elbe im S. W., Lauenburg im W. und durch eine vom Nordende des Schalsees bis zur Südspitze des Schweriner Sees gezogene Linie im N. begrenzt, den südwestlichen Theil Mecklenburgs bildet. Sie bildet einen Theil der großen Haidesteppe, die in Jütland beginnend, durch Schleswig, Holstein, Hannover und Holland bis zur Mündung der Schelde sich hinzieht, und ist eine an Seen und Teichen sehr arme, aber von vielen Nebenflüssen der Elbe durchzogene, von N. N. (Spiegel des Schweriner Sees c. 118' Par.) nach S. W. (Elbspiegel bei Dömitz 32' Par.) allmählig sich senkende Fläche, aus der nur sporadisch und inselartig einige unbeträchtliche Bodenschwellungen hervortreten. In malerischer Hinsicht eine

trauerige Einöde, ist sie für den Geognosten von großem Interesse. Denn außer dem mächtigen Gypsstock, der hier bei Lüthten und Probst Jesar auftaucht, so wie der unsern Carenz entspringenden Salzquelle, nebst den bei eben diesem Orte entdeckten, der Kreideformation angehörigen Lagern, entwickelt sich in dieser Haideebene die Tertiärformation am mannigfaltigsten und ausgedehntesten. Man kennt hier ein ansehnliches Braunkohlenlager, Maunerde und Septarienthon, — kurz, tertiäre Schichten scheinen hier vorzugsweise die nächste anstehende Unterlage für die diluviale Bodendecke zu bilden. Letztere zeigt hier eine ganz eigenthümliche Beschaffenheit, welche es mir sehr wahrscheinlich macht, daß hier die Diluvialmassen ihren Ursprung hauptsächlich zerstörten tertiären Lagern verdanken. Denn das nordische Diluvialmaterial tritt hier auffallend gegen die tertiären Stoffe zurück, namentlich sind Gerölle sehr selten. Die tieferen diluvialen Bodenschichten bestehen aus mannigfach wechselnden Lagern eines Sandes, welcher viel feiner ist, als der gewöhnliche Diluvialsand, und unverkennbar aus tertiären Lagern stammt; aber er ist nicht mehr in seiner ursprünglichen Reinheit vorhanden, sondern mit den diluvialen Feldspathcrystallen gemengt. Darüber pflegt die verrufene Fuchserde zu lagern, ein braungelber, stark eisenschüssiger und bisweilen steinartig verhärteter Sand, welcher diesen Eisengehalt ohne Zweifel gleichfalls zerstörten tertiären Lagern (in denen er z. B. in Mecklenburg durch den Sternberger Ruchen und den Limonitsandstein vertreten war,) verdankt, und welcher wahrscheinlich wieder das Material zur Bildung des Raseisensteines abgiebt, der in so großer Menge in der

Haideebene vorkommt. Die oberste Decke des Bodens, wo der flüchtige Sand nicht unmittelbar zu Tage tritt, bildet ein saurerer, kohligharziger Humusboden, zu dessen Bildung wahrscheinlich zerstörte tertiäre Torfmoore, vielleicht auch Braunkohlenlager, das hauptsächlichste Material hergegeben haben.

Stellenweise tritt auch auf größeren Strecken der feine und daher auch sehr flüchtige Sand unmittelbar zu Tage. Wer ihn genauer kennen lernen will, darf nur einmal die beweglichen Felder von Bokup, Wendisch-Wehningen oder Belsch (südwestlich von Schwerin) im trockenen Sturme gesehen haben. Auf halbe Meilen weit trüben gelbe Sandwolken die Luft bis zu einer Höhe von mehr als 100', und der Landmann ist in solchen Gegenden genöthigt, seine Felder durch Anpflanzung von Tannen vor der Versandung zu schützen, aber auch diese vermögen nur unter dem Schutze von Tannenreißern, mit denen die ganze junge Pflanzung überdeckt werden muß, Wurzel zu fassen und empor zu wachsen. Ein kleines Loch in der schwachen Narbe solcher Sandfelder erweitert der Sturm oft binnen wenigen Jahren zu einem wahren Sandsee, aus dem noch einzeln stehende Bänke, wie Inseln von 4 bis 6' Höhe, hervorragen, als Merkzeichen, wie groß die Masse des weggeführten Sandes sei. An diesen Bänken sieht man denn auch deutlich, wie dünne Schichten von Dammerde wohl 3 bis 4 Mal und öfter mit mehr als fußdicken Sandschichten wechseln, und wie also dieselbe Stelle schon mehrere Male das Schicksal der Versandung erlitten hat. In dem großen Bauerdorfe Iabel, 2 M. südwestlich von Ludwigslust, ist der Sand so flüchtig, daß ich dort die

Särge auf dem Kirchhofe theilweise entblößt sah, weil der Wind die sie bergende Decke hinweggeweht hatte.

Rehm Boden kommt nur in den vorhin erwähnten isolirten hügelartigen Bodenaufschwellungen zum Vorschein: es sind dies gleichsam kleine fruchtbare Dasen in der großen mecklenburgischen Haldesteppe.¹

Der flüchtige Sand, die Fuchserde und jener saure Humusboden gehören alle zu denjenigen Stoffen, welche einer gedeihlichen Pflanzenentwicklung am wenigsten günstig sind, und daher zeigt denn auch die Flora überall wo sie zu Tage tritt im Allgemeinen einen sterilen, kränklichen Character. Doch giebt es auch manche Pflanzenarten, denen ein solcher Boden besonders zusagt, und die daher in Mecklenburg nur hier, entweder ausschließlich, oder doch in größerer Anzahl und Ueppigkeit, angetroffen werden, so daß also auch dies Gebiet dem Botaniker manches Eigenthümliche und Interessante darbietet. G. Brückner hat schon im Jahre 1841 im Anhang zu Langmanns Flora von Mecklenburg eine so treffliche Schilderung der Haldeflora gegeben, daß ich nicht umhin kann, dieselbe der nachfolgenden Darstellung zu Grunde zu legen.

Die Nadelholz-Waldungen der Haideebene werden durch *Pinus sylvestris* gebildet, die aber sich hier lange nicht so kräftig entwickelt, als dies in dem Gebiete der später zu erwähnenden Sandflora der Fall ist. In diesen

1. Weitere Auskunft über die geognostische Beschaffenheit der verschiedenen mecklenburgischen Landestheile geben meine Geognosie der deutschen Ostseeländer (Neubrandenburg 1846), und meine geognostischen Wanderungen durch Mecklenburg (im Archiv f. meklb. Landeskunde, Schwerin 1855 S. 335 ff. und 525 ff.).

Wäldern herrschen von den Laubmoosen *Hypnum cupressiforme* und *uncinatum* vor, — merkwürdiger Weise aber fehlen alle Usneen; unter den Pilzen sind häufig *Agaricus muscarius* und *emeticus*, *Cantharellus cibarius*, *Boletus luteus* und *edulis*. Eine mehr vereinzelte Erscheinung in den Tannenwäldern der Haide bleibt *Anthericum Liliago*, *Hypericum pulchrum*, und ganz wieder ausgerottet soll *Lycopodium Chamaecyparissus* bei Quast sein. Auf den großen offenen Haideflächen bildet *Calluna vulgaris* die vorwaltende Bedeckung des Bodens, und dazwischen treten, wo derselbe sandiger wird, *Hypnum albidans*, *Racomitrium canescens* und *ericoides*, so wie auch Cladonien sehr häufig auf; auch *Trematodon ambiguus* ward bei Ludwigslust an einer solchen Stelle gefunden. Wo der Boden etwas feuchter wird, mischt sich die zierliche *Erica Tetralix* in großen Rasen darunter, und wird stellenweise sogar überwiegend. Zwischen diesen beiden Haidekräutern finden sich häufig *Genista anglica* und *pilosa*, *Potentilla Tormentilla*, *Anthericum ramosum*, *Rhynchospora alba* und *fusca*, *Triodia decumbens*, *Nardus stricta*, *Molinia coerulea*, *Juncus squarrosus*, *Succisa pratensis* und (wenngleich einzeln, doch gar nicht selten,) die prachtvolle *Gentiana Pneumonanthe*, *Cicendia filiformis*, *Arnica montana*, *Pedicularis sylvatica*, *Thesium ebracteatum*, *Sanguisorba officinalis*, und, obwohl nicht häufig, und in neuerer Zeit immer mehr verschwindend, gruppenweise *Scorzonera humilis*. Nimmt die Masse des Bodens zu, so zeigen sich einzelne Polster von *Sphagnum cymbifolium* und *Dicranum glaucum* auf denen *Drosera rotundifolia* und *intermedia* häufig sind, während zwischen ihnen

Litorella lacustris, *Sagina procumbens*, *Peplis Portula* und *Ranunculus Flammula* var. *reptans* in Menge vorkommen; feuchten sandigen Boden liebt *Galium saxatile*. Die Wiesen charakterisiren sich durch das häufige Vorkommen von *Senecio paludosus*, *Euphorbia palustris*, *Thalictrum flavum*, *Cnidium venosum*, (seltener *Seseli annuum*), *Helosciadium inundatum*, *Gratiola officinalis*, *Veronica longifolia* und *Teucrium Scordium*; unter den Laubmoosen finden sich *Hypnum cuspidatum* und *filicinum* nebst *Climacium dendroides* sehr häufig. Wird der Boden torfiger, so gewinnen *Vaccinium uliginosum* und *Oxycoccus*, *Ledum palustre* und *Andromeda polifolia* die Oberhand. — Bei zunehmender Trockenheit des Bodens treten nächst den Heidefräutern (*Calluna* und *Erica*) die beiden *Scleranthus*, *Alchemilla Aphanes*, *Spergula arvensis* und *Spergularia rubra* häufig auf, zwischen denen *Corrigiola litoralis*, *Illecebrum verticillatum* und *Anemone pratensis* gedeihen. Noch größere Dürre bezeichnen *Anemone Pulsatilla* und *A. vernalis* (welche aber in diesem Gebiete nur ein einziges Mal gefunden wurde, ebenso wie *Jurinea cyanoides*), *Genista anglica* und *pilosa*, *Viola canina* und *tricolor*, *Corynephorus canescens*, *Nardus stricta*, *Carex arenaria*, — seltener *Ammophila arenaria* und *Elymus arenarius*. Es finden sich in den Sandhöhlen und Tannenwäldern dieses Gebietes fast alle gewöhnlichen Sandpflanzen (auch die meisten *Pyrola*-Arten), aber weit seltener und kümmerlicher, wie in der eigentlichen Sand-Flora. Eine eigenthümliche Erscheinung (auf welche mich G. Brückner aufmerksam machte,) ist es aber, daß lange anhaltende Dürre den

tiefwurzelnden Culturpflanzen der Haideebene weniger nachtheilig wird, als denen des Sandgebietes. Es muß dies in den geognostischen Verschiedenheiten beider Gebiete seinen Grund haben.

Den Uebergang der Haide in trockenen Laubwaldboden bezeichnet vorzugsweise *Vaccinium Myrtillus*, seltener *V. Vitis Idaea*, *Genista tinctoria* und *germanica*, *Trientalis europaea*, *Galium saxatile* und *Ilex Aquifolium*, welcher, obgleich nicht häufig und in neuerer Zeit in seinem Vorkommen immer mehr beschränkt, doch mit *Salix aurita*, *Prunus Padus*, *Rhamnus catharticus*, Birken, Erlen und Brombeergesträuchen, das sparsame Unterholz dieser Waldungen bildet, die selbst aus Birken, Eichen (seltener aus Buchen), und wo es feuchter wird, aus Erlen bestehen, — in der Lewiz sogar stellenweise aus *Acer Pseudo-Platanus*. Die Hauptbedeckung des feuchten Waldbodens ist *Pteris aquilina*, dem sich an Farnen auch noch *Polystichum spinulosum* und *Asplenium Filix femina*, *Osmunda regalis*, an Laubmoosen *Hypnum squarrosum* häufig zugesellen; auf offeneren Stellen sind häufig: *Mercurialis perennis*, *Melandrium rubrum*, *Lamium maculatum*, *Galebodolon luteum*, *Paris quadrifolia*, *Oxalis Acetosella*, *Viola palustris* (und stellenweise auch *canina* var. *lactea*), *Circaea lutetiana* und *alpina*, *Cardamine pratensis*, *amara*, *hirsuta*, *Melampyrum cristatum*, und in Sümpfen *Calla palustris*, *Utricularia vulgaris*, *intermedia* und *minor*. — Diese Laubwälder entbehren mit dem Unterbüsch der Waldungen in dem Gebiete der Lehmflora, welches aus Haseln, Linden, *Cornus sanguinea*, *Lonicera Xylosteum* u. a. besteht, auch viele der häufigsten und

schönsten Schützlinge desselben, die hier entweder gänzlich fehlen, oder doch nur so selten und vereinzelt vorkommen, daß sie auf den Character dieser Flora keinen Einfluß haben können, wie z. B. *Anemone Hepatica* und *Ranunculoides*, *Pulmonaria officinalis*, *Dentaria bulbifera*, *Corydalis cava*, *Asperula odorata*, *Melica nutans*, *Campanula persicifolia*, *Orobis vernus* und *niger*, *Polystichum Filix mas*. — Den Ackerfeldern, auf denen nur Roggen, Hafer und Buchweizen cultivirt wird, fehlt fast gänzlich die Zierde des *Papaver Rhoeas*, *Delphinium Consolida*, der Chamille und die Plage des *Bromus secalinus*: sie besitzen dafür strichweise häufig *Muscari botryoides*, *Galeopsis ochroleuca*, und leider zu häufig *Chrysanthemum segetum*. Den Hügeln und Weideplätzen fehlen *Viola hirta*, *Trifolium montanum*, *Salvia pratensis*, *Barbarea vulgaris*, *Malva Alcea* und *Plantago media*; an Sumpfpflanzen fehlt *Helosciadium repens*; an Ruderalpflanzen fehlen oder sind sehr selten *Hyoscyamus niger*, *Marrubium vulgare*, *Xanthium strumarium* und *Anthemis tinctoria*, statt deren aber stellenweise *Atriplex rosea* und *Atropa Belladonna*, doch letztere nur auf Bauerhöfen verwildert. An alten hölzernen Zäunen findet sich *Weisia cirrhata* sehr häufig; den Granitgeröllen fehlt *Lecidea geographica* gänzlich. — Als eine charakteristische, wenn auch nicht häufige Pflanze unseres Haidegebietes nenne ich endlich noch *Gnaphalium luteo-album*, welches an Kirchhofsmauern (z. B. bei Ronow!) u. a. D. vorkommt. Auch zwei Pflanzen, welche keineswegs gerade Haidepflanzen sind, wurden bis jetzt nur erst in diesem Gebiete gefunden, nämlich *Chrysosplenium oppositifolium* und *Potamogeton*

densus. Häufiger, als in anderen Gegenden des Landes kommt *Callitriche autumnalis* hier vor.

Das Aussehen der Haldeebene hat sich übrigens im Laufe der Zeit sehr verändert. Sie war nicht allein früher viel walddreicher, indem auf einer Charte vom Jahre 1552 unter dem Namen der Jabelhaide ein großer Wald dargestellt ist, der den ganzen Raum zwischen Walsmühlen, der Ende, Redefin, Picher und Kraak ausfüllte, sondern auch noch im Anfange des zweiten Decenniums unseres Jahrhunderts waren ihre flachen breiten Thäler, durch welche die oben erwähnten inselartigen Höhen getrennt werden, namentlich die Thäler Elde, Rognitz und Ende, regelmäßig im Frühling und Herbst größtentheils von dem sich dort ansammelnden und bei der geringen Neigung des Bodens keinen Abfluß findenden Regenwasser bedeckt, und in sehr nassen Jahren verlief sich das Wasser das ganze Jahr hindurch nicht. Jetzt ist aber durch zweckmäßige Abzugsgräben fast das ganze Terrain trocken gelegt, und bedeutende Ortschaften (z. B. Langenhaide, Neu-Bresegard, Mendendorf, Neu-Karstädt, Neu-Fresenbrügge u. a.) sind dort im Laufe der letzten Jahrzehnte entstanden, deren Obstpflanzungen und Getreidefelder den Beweis liefern, daß auch dieser Boden dem fleißigen Arbeiter den Ertrag nicht versagt. — Bei Langenhaide sind jedoch noch einige Wasserlachen übrig geblieben, die eine bemerkenswerthe Erscheinung zeigen. Sie sind von nur geringer Ausdehnung, sehr flach, und entstehen ebenfalls durch Ansammlung von Regenwasser, welches in der wärmeren Jahreszeit austrocknet, so daß der Boden der Lachen dann zum Vorschein kommt. Dieser besteht aus einer ganz schwarzen,

oft nur wenige Zoll dicken Erdschicht, welche unmittelbar auf Sand lagert; es zeigt sich dann aber auf ihm auch nicht die geringste Spur einer Vegetation, sondern ganz nackt bleibt er den Sommer über liegen. Auf diesem schwarzen, pflanzenleeren Boden erheben sich aber inselartig in großen Zwischenräumen einzelne schroff aufsteigende Bänke, deren Oberflächen-Ausdehnung durchschnittlich 9 bis 12 Quadratuß, und deren Höhe 2 bis 4 Fuß betragen mag; ihre Seiten fallen senkrecht zum Boden der Lache ab. Nach G. Brückner's Ermittlung¹ bestehen diese Bänke aus den abgestorbenen Wurzeln verschiedener Sumpfpflanzen, die an diesen vereinzeltten Stellen einen ihnen zusagenden Boden fanden. Da sich aber diese Pflanzen nicht über die ihnen von der Natur gesteckten Gränzen hinaus in horizontaler Richtung verbreiten konnten, mußten sie sich nach oben hin auszudehnen suchen, und so siedelte sich denn die eine immer wieder auf den abgestorbenen Resten der anderen an. *Carices* legten das Fundament, auf welchem später *Vaccinium Myrtillus* und *uliginosum*, so wie *Calluna vulgaris* fortbaueten; zuletzt erschienen sogar einige *Salices*. Diese Bänke, mit so scharf begränzten Umrissen auf dem pflanzenlosen Boden ruhend, sind so auffallend, daß sie gewiß von jedem bemerkt werden, den sein Weg durch diese Gegend hinführt. — Erst in neuester Zeit hat eine ganz ähnliche Erscheinung, welche die Moore Ungarns in der Gegend von Pesth zeigen, die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich gezogen. Auch dort erblickt man auf nacktem künstlich trocken gelegten Moorboden derartige aus Wurzelgeflecht bestehende

1. G. m. Geognosie der deutschen Ostseeländer 1846 S. 18 f.

isolirte Säulen von 2 bis 4' Höhe, — daselbst Zsombék genannt, — deren Hauptmasse, nach Dr. A. Kerner's Untersuchung, aus den Stolonen und Wurzeln der *Phragmites communis* besteht, auf denen sich dann oben Rasen von *Carex stricta* angesiedelt haben; ja bei einzelnen der von ihm untersuchten Zsombék-Säulen, waren die verflochtenen Rhizome der *Phragmites* noch gar nicht abgestorben, sondern vegetirten noch fort, indem sie rings um die Säule herum Rohrhalm trieben.¹

Auch der eigentliche trockene Haideboden wird in Mecklenburg durch die Cultur von Jahr zu Jahr mehr beschränkt. Seine waldfreien, uncultivirten Flächen werden meistens zur Viehweide benutzt, aber auch durch das sogenannte Abplaggen (d. h. Abschälen der bewachsenen Boden = Narbe durch eine eiserne, sehr breite Hacke,) sehr ruinirt. Der so gewonnene dünne und sehr trockene Rasen (Plaggen genannt,) wird mit wenigem Dunge gemischt in viereckigen Bänken aufgeschichtet, um später als sehr mittelmäßiger Dung für den Acker zu dienen. Die abgeplagkten Stellen aber tragen viele Jahre hindurch nichts als *Ceratodon purpureus* und einige andere kümmerliche Kryptogamen, wie z. B. *Polytrichum piliferum*, *aloides* und *nanum*, mehrere *Cladonien*, so wie *Stereocaulon tomentosum*. — Mit besserem Erfolge wird dort jetzt seit etwa 10 Jahren die Gründüngung mit *Lupinus luteus* betrieben; ich sah sie daselbst auf einer Reise, die

1. Kerner in den Verhandlungen der zool. botan. Gesellschaft in Wien Bd. VIII. Sitz.-Ber. S. 35 und Abhandlungen S. 315 wozu auch auf Taf. 7 ein anschauliches Bild dieser Zsombék-Moore gegeben ist.

mich im Jahre 1852 durch diese Gegend führte, zum ersten Male, und vernahm, daß sie erst seit kurzer Zeit dort zur Anwendung käme.

Eine besondere Zierde erhält dies Haidegebiet an seiner südwestlichen Gränze, so weit die Elbe dasselbe bespült, noch dadurch, daß diesem Strome mehrere Pflanzen, ohne grade Haidepflanzen zu sein, hierher aus dem südlichen Gränzgebiete gefolgt sind, und nun einen Bestandtheil seiner Uferflora bilden. Dahin rechne ich *Erysimum strictum*, *Oenothera muricata*, *Eryngium campestre*, *Petasites tomentosus*, *Senecio nemorensis*, *Villarsia nymphaeoides*, *Mentha Pulegium*, *Scutellaria hastifolia*, *Salsola Kali*, *Plantago arenaria*, *Euphorbia Esula*, *Allium acutangulum* und *Scirpus maritimus*; auch *Cucubalus baccifer* und *Cuscuta monogyna* mögen auf diesem Wege nach Mecklenburg verschleppt sein. Eine ganz vereinzelte Erscheinung an unserem Elbstrande aber ist *Ononis arvensis*.¹

Ein anderer gleichfalls zum Gebiete der Haideebene gehöriger höchst eigenthümlicher Landstrich ist leider in botanischer Hinsicht fast noch eine terra incognita. Es ist dies die gegen 2 □ M. große ungefähr 120 Par. Fuß über dem Ostspiegel liegende Bruch- und Wiesenniederung, die den alten slavischen Namen Lewitz (d. h. Wald, Holz) führt, und sich vom südlichen Ende des Schweriner

1. *Malva rotundifolia* gehört gleichfalls zu den Zierden der Elbflora, ist aber dieser nicht ausschließlich eigen, da sie noch zahlreicher in der Seestrandflora vorkommt. *Anemone pratensis* wächst in einer merkwürdigen grünblühenden Varietät auf den Elbweiden bei Boizenburg.

Sees bis zur Mündung der Stör in die Elbe, nördlich von Neustadt, herabzieht. Sie wird in der Richtung von N. nach S. von der Stör durchflossen, und ihr Boden liegt so horizontal, daß die Geographen früher in Zweifel darüber waren, ob jenes Gewässer als ein Abfluß, oder als ein Zufluß des Schweriner Sees zu betrachten sei. Nach einer Notiz aus dem 16. Jahrhundert wurde sie damals als fürstlicher Thiergarten benutzt, und noch zu Anfang des 17. Jahrhunderts gab es dort „wilde“ (d. h. verwilderte) Pferde. Wie Siemssen berichtet, wurde auch früher die herzogliche Küche aus der Lewitz mit Wassernüssen (*Trapa natans*) versehen, — einem Gewächs, welches seit die Botanik in Mecklenburg wissenschaftlich betrieben wird, hier im Lande nicht mehr gesehen worden ist. Ob es jetzt auch dort (wie in manchen anderen Gegenden Deutschlands und im ganzen Schweden,) ausgestorben sei, bleibt noch sorgfältig zu ermitteln, da jenes negative Zeugniß, daß keiner unserer Botaniker diese Pflanze gesehen hat, nichts entscheidet. Denn nur selten betritt der Fuß eines solchen jenes schlangen-¹ und wasserreiche, von einem Labyrinth von Flüssen, Canälen und Gräben durchschnittene Gebiet, und er beschränkt sich dann auch wohl nur auf den etwas zugänglicheren Rand desselben; ein Versuch das Innere genauer wissenschaftlich zu durchforschen, ist wenigstens noch niemals zur öffentlichen Kunde gelangt, und auch wahrscheinlich noch niemals — gemacht worden.

1. Die giftige, sonst nur sporadisch in Mecklenburg vorkommende schwarze Otter (*Vipera Berus*) soll in der ganzen Haideebene, — vorzüglich aber in der Lewitz, — noch sehr häufig sein. Vergl. Archiv 5, 199.

Zur Zeit des 7jährigen Krieges war die Lewitz noch in ununterbrochenem Zusammenhange mit der Neustädter Bürgerhorst, dem Wöbbelin-Warlow-Ludwigslust-Cummerschen Holz und die Zuflucht für Männer, Pferde und Rind vor den aufgreifenden Preußen. Noch vor wenigen Decennien sah man durchreisend auf den freien Wiesenflächen Heerden von 20—30 Hirschen ruhig weiden oder im Grase liegen und die Zahl der Hirsche in der Lewitz wurde damals auf 3000 geschätzt.

Ein zweites kleineres Haidegebiet liegt im nordöstlichen Mecklenburg zwischen Rostock, Warlow, Ribnitz und der Ostsee, und erstreckt sich von da in das angrenzende Neu-Vorpommern hinein, über den Dars, den Zingst bis nach Barth und Stralsund. Seine Flora ist der jenes größeren sehr ähnlich, und an besonderen Eigenthümlichkeiten wüßte ich nur das häufigere Vorkommen der *Anemone vernalis*, so wie das Auftreten der in jenem Gebiete fehlenden *Myrica Gale* zu nennen. Das isolirte Erscheinen von *Allium ursinum* muß in besonderen Verhältnissen (des Standortes?) seinen Grund haben, da diese Species auch anderweitig als eigentliche Haidepflanze nicht vorkommt.

2. Die Sandflora. — Ihr Gebiet ist ein sandiger Landstrich, welcher den südlichen Theil von Mecklenburg-Strelitz, in der Breite von Weissbin ($\frac{1}{2}$ M. nördlich von Neustrelitz) bis Fürstenberg einnimmt und sich dann in nordwestlicher Richtung bis auf das südliche Ende des Schweriner Sees hin fortzieht, bevor er dasselbe aber erreicht, sich nordwärts wendet, und in allmählig abnehmender Breite endlich bei Kirch-Mulsow ausläuft. Grünow,

Weissdin, Waren, Serrahn, Zehna und Sternberg bezeichnen ungefähr die nördliche Gränzlinie dieses Gebietes, während die südliche durch Fürstenberg, die Müritz, den Rölpin, den Hefen-See, Malchow, das nördliche Ende des Plauer Sees, Goldberg und Krivitz angedeutet wird. Diese im ganzen sehr flache und einförmige Gegend gehört dennoch zu den am höchsten gelegenen Theilen Mecklenburgs, indem sie den Rücken einer durch Seen-Reichthum ausgezeichneten, etwa 250–300' hohen Bodenschwellung einnimmt, welche in der Richtung von S.=D. nach N.=W. unser Land durchzieht, und hier die Wasserscheide zwischen Ost- und Nordsee bildet. Ihre Oberfläche besteht aus nordischem Geschiebesande, welcher viel reicher an Feldspath ist, wie der im vorigen Abschnitte erwähnte Haidesand. Unter demselben kennt man an einigen Punkten Kalklager, welche der Kreideformation angehören (bei Babels, Roggentin, Rossentin, Sparow, Malchow), und bei Grünow in Mecklenburg-Strelitz bildet tertiärer Septarienthon die Unterlage des Bodens.

Der Reichthum dieses Sandes an Feldspath, der sich unter atmosphärischen Einflüssen leicht zersetzt, erklärt es, warum seine Flora lange nicht so kümmerlich ist, wie die der Sandschollen der Haideebene, obgleich sie mit diesen, wie schon oben bemerkt wurde, viele gemeinschaftliche Pflanzen besitzt. Auch hier ist die Tanne der vorherrschende Waldbaum, aber sie ist von schlankem, kräftigen Wuchs, und der Boden des Waldes ist mit reichen Laubmoospolstern bedeckt, in denen alle Arten von *Pyrola*, zumal die schöne *P. umbellata*, ferner *Lycopodium complanatum*, *annotinum* und *Selago*, *Goodyera repens*, *Monotropa hypo-*

pithys, *Empetrum nigrum*, *Linnaea borealis*, *Epilobium angustifolium*, *Senecio viscosus* und *sylvaticus*, hin und wieder auch *Genista pilosa* und *germanica* üppig vegetiren. In Waldlichtungen erblickte ich stellenweise häufig ein großes *Verbascum*, — wahrscheinlich *thapsiforme*, an den Waldrändern den prachtvollen, goldgelben Hasenbräm. Die ziemlich trockenen begrasten Hügel schmückten sich zeitig mit *Anemone Pulsatilla* und *pratensis*, *Potentilla opaca* und *verna* (nebst deren Varietät *cinerea*), *Viola canina*, *Carex praecox*, *ericetorum* und *montana*, seltener mit *Berteroa incana* und *Plantago arenaria*. Naekte Stellen werden hin und wieder mit *Teesdalea nudicaulis*, *Cerastium semidecandrum*, *Spergula arvensis* und *Illecebrum verticillatum* bekleidet. Südlich von der Müritz ist im südlichen Theile von Mecklenburg-Strelitz, etwa von Neustrelitz an, *Euphorbia Cyparissias* sehr häufig, und sie läßt sich von da in fast ununterbrochenem Zuge bis 2 M. südwärts von Berlin verfolgen; vereinzelte Erscheinungen in eben diesem Mecklenburg-Strelitzschen Landestheile sind *Arabis arenosa* und *Astragalus arenarius*, — das Vorkommen von *Dianthus arenarius* ist aber noch sehr zweifelhaft. — In manchen Gegenden dieses Gebiets, z. B. bei Neustrelitz, Mirow, Wessenberg, Fürstenberg u. s. w. haben die Tannenwälder eine eigenthümliche Pflanzsignomie und ihr Boden ist mit Ausnahme einer dünnen Narbe von Laubmoosen und Gräsern fast völlig kahl! Dies rührt daher, daß die Bewohner dieser Gegenden aus Mangel an Stroh gezwungen sind Fichtennadeln als Streue zu gebrauchen, und sie diese in den Wäldern zusammenharken, wodurch alle an-

deren aufkeimenden Pflanzen zerstört werden. Dieser Industriezweig ist dort so wichtig, daß im Jahre 1848 unter den vielen an die Landesherrschaft gestellten Forderungen auch mehrere Petitionen um freies Fichtennadeln-Sammeln vorkamen.

Andere durch häufiges Vorkommen charakteristische Pflanzen unseres Sandgebietes sind außer den schon genannten *Sagina procumbens*, *Spergularia rubra*, *Potentilla argentea*, *Galium verum*, *Erigeron acris*, *Helichrysum arenarium*, *Carlina vulgaris*, *Arnoseris minima*, *Hieracium pilosella*, *Calluna vulgaris*, *Arctostaphylos Uva ursi* (selten), *Vaccinium Vitis idaea*, *Thymus angustifolius*, *Trientalis europaea*, *Salix repens*, *Betula alba*, *Carex hirta*, *arenaria*, *Agrostis vulgaris*, *Airra flexuosa*, *Corynephorus canescens*, *Nardus stricta*, *Blechnum Spicant*, *Bryum argenteum*, *Hypnum albicans*, *purum*, *strigosum* und *Crista castrensis*, *Polytrichum piliferum*, *Racomitrium canescens* und *ericoides*, *Ceratodon purpureus*, *Jungermannia albicans* u. s. w. — Besonders interessant durch eine reiche Sandflora ist der große Tannenwald zwischen Zabel, Rössentin und Carow, der es verdiente, einmal in botanischer Hinsicht gründlich ausgebeutet zu werden.

Auch hier sind Roggen, Hafer und Buchweizen die wichtigsten Culturpflanzen auf den Aeckern; die Brachfelder haben Ueberfluß an *Filago arvensis* und *minima*, so wie an *Rumex Acetosella*; alle diese aber werden an Menge noch weit übertroffen durch den Mäuseflee, dessen Blüthenköpfe oft die Felder wie mit einem dichten, grauen Schleier überdecken.

Auffallend ist der Reichthum der Seen dieses Gebietes an Charen, welche mit einem Kalküberzuge bedeckt, fuderweise aus dem Wasser herausgefischt und unter dem Namen „Post“ zur Düngung der Sandfelder verwendet werden.¹ Ihr reichliches Vorkommen ist aber nicht dem Sande, sondern ohne Zweifel dem unter diesem lagernden Kalk zuzuschreiben, der ihnen das Material zur Bildung ihrer Incrustationen liefert. Welche Chara-Arten dort gefunden werden, ist aber leider eine noch nicht zu beantwortende Frage, weil ihnen unsere Botaniker bis jetzt noch gar keine Aufmerksamkeit geschenkt haben, wie überhaupt das ganze Sandgebiet in botanischer Hinsicht noch sehr vernachlässigt geblieben ist.

3. Die Lehmflora. — Den größten Theil der mecklenburgischen Bodenoberfläche, nämlich fast das ganze Ostseegebiet hindurch, — mit Ausnahme des kleinen, oben erwähnten Haidebistricts und einiger vereinzelter Sandschollen, — bildet glücklicher Weise der diluviale Lehmboden, welcher nach seinem geringeren oder größeren Kalkgehalt von zähem, strengen Thonboden in den mannigfachsten Abstufungen in lockeren Mergelboden übergeht; auch an der südlichen Landesgränze, zwischen der Müritz und der Elde-Mündung, ist der Boden von ähnlicher Beschaffenheit. Seine Unterlage bilden theils Schichten, welche der Kreideformation angehören, theils Thonlager, die wahrscheinlich tertiären Ursprungs sind. Diese, dem Anbau des Weizens, Roggens, der Gerste, des Hafers, Rapses, Tabacks, Leins, der Kunkelrübe, des Kleeß und

1. Vergl. darüber C. Voss im Archiv für mecklenburgische Landeskunde 1855 S. 567.

der Luzerne so günstigen Gegenden sind es, auf denen der gepriesene Bodenreichtum Mecklenburgs beruht, und in diesem Gebiete ist es denn auch, wo unsere Flora ihre üppigste Fülle und die Natur überhaupt ihre größten Reize entwickelt.

Die vorherrschenden Waldbäume sind hier entschieden die Roth-Buche und die Eiche, die erstere besonders da, wo der Boden einen stärkeren Kalkgehalt besitzt. Beide entwickeln sich mitunter in majestätischer Pracht, wie z. B. die Eichen bei Ivenack, deren stärkste unten am Stamme (4 Fuß über dem Boden gemessen,) einen Umfang von 31' 6" Par. besitzt; Buchen kamen noch vor etwa hundert Jahren 160 Fuß hohe, mit einem unteren Durchmesser von 8' vor, und auch noch jetzt giebt es sehr schöne z. B. bei Doberan und auf dem Sonnenberge bei Parchim.¹ Auch Birken und Tannen sind nicht selten, und vereinzelter kommen in den Laubholzwaldungen vor: die Weißbuche, die kleinblättrige Linde, Ahorne (*Acer Pseudo-Platanus* und *platanoides*), Ulmen (*Ulmus campestris* und *effusa*), Eschen, Holzapfel- und Holzbirnbäume, Faulbaum, Vogelkirsche und stellenweise auch *Sorbus torminalis*. Ein mannigfaches und schönes Unterholz von Linden, Ulmen, Haseln, Weiden (*S. caprea*, *pentandra*, *aurita*), *Cornus sanguinea*, *Viburnum Opu-*

1. Archiv XI. 135 ff. — Diesen riesenhaften Eichen und Buchen reihen sich noch einige colossal Lin den an, über die ich im Archiv XI, 138 schon berichtet habe. Schon den früheren slavischen Bewohnern Mecklenburgs war die Linde ein wichtiger Baum, wie die vielen von seinem Namen Lipa abgeleiteten Ortsnamen „Lipen, Leps u. a.“ zeigen. Was für Verlichkeiten aber mögen unter dem Namen „die Liep“ eigentlich bezeichnet werden? Es giebt deren z. B. bei Ludwigslust, bei Sildemow unweit Rostock und bei Königsberg in Ostpreußen.

lus, *Lonicera Xylosteum*, *Rosa canina* und auf kalkreicherem Boden *rubiginosa*, *Prunus spinosa*, *Acer campestre*, *Craetaegus*, *Rhamnus catharticus*, *Evonymus*, *Sorbus Aucuparia*, *Populus tremula* und *alba*, so wie *Juniperus* zeichnet diese Laubwälder aus; stellenweise tritt darin auch die schöne duftende *Lonicera Periclymenum* in üppiger Entwicklung als Schlingpflanze auf.

Doch es möchte am besten sein, die Schilderung dieses Florengebietes nicht in der begonnenen allgemeinen Weise fortzusetzen, sondern dieselbe an einen bestimmten concreten Fall anzuknüpfen. Ich wähle dazu die reiche Flora der Umgegend meines eigenen Wohnortes Neubrandenburg, welche seit etwa 1780 von A. F. L. Brückner und dessen Söhnen A. und G. Brückner,¹ so wie von Blandow, F. Schultz und mir selbst durchforschet worden ist. Schon innerhalb der Stadt selbst trifft man auf einige interessante Pflanzen, indem in den Gärten *Oxalis corniculata*, *Elsholtzia cristata* und *Linaria minor* als Unkräuter vorkommen, und an der aus Feldsteinen erbaueten Stadtmauer *Asplenium ruta muraria*, *Hypnum exiguum* und *murale* wachsen, während in den Spalten und Fugen derselben eine Conchylie lebt, die bisher in ganz Norddeutschland nur an dieser einzigen Stelle entdeckt worden ist, — nämlich *Balea perversa*. Die westliche Seite des Stargarder Thores überkleidet prachtvoller, blühender Ephen bis zur Höhe von etwa 40 Fuß. Sehr lohnend aber sind für den Botaniker die Wanderungen in die Umgegend, nach

1. A. Brückner schrieb im J. 1804 als Diss. inaug. einen *Prodromus Florae Neobrandenburgensis*, in welchem 679 Phanerogamen und 198 Kryptogamen aufgezählt werden.

welcher Seite hin man sich auch wenden mag. So trifft man z. B. auf dem Wege nach dem Brodaer Holze, einem schönen Buchenwald am westlichen Ufer des Tolensees schon vor dem Treptower Thore in den Pappeln und Obstbäumen die schmarozirende Mistel, in den Gräben an der Bleiche (neben Vergißmeinnicht und der weißen Brunnenfresse,) *Stratiotes aloides*, *Hydrocharis M. ranæ* und *Potamogeton pusillus*; im Tolensesfluß *Ranunculus divaricatus* und *Lingua*, *Butomus umbellatus*, *Sagittaria*, *Menyanthes*, *Potamogeton compressus* und *mucronatus*, *Sium latifolium*, während am Ufer desselben *Melilotus macrorrhiza* sehr häufig, sehr selten aber *Potentilla supina* vorkommt. Die aus Dornen geflochtenen Gartenzäune bei Broda sind durchraut von *Convolvulus sepium*, *Bryonia alba*, *Galium Aparine*, und auf dem Hahnenberge daselbst trifft man außer einigen stolzen Königsferzen (*V. thapsiforme*) auch *Campanula bononiensis* und *Stachys germanica*, zwei schöne, gleichfalls hochstrebende Pflanzen, die überhaupt in den Umgebungen der Tolense viel häufiger vorzukommen scheinen, als in anderen Gegenden Mecklenburgs; ferner *Gentiana campestris* und *Polycnemum arvense*, welches letztere im ganzen Strelitzschen Lande bisher nur an dieser einzigen Stelle gefunden worden ist.¹ Geht man weiter, so trifft man auf Belvedere *Bromus tectorum*, *Phleum Boehmeri*, *Orobis tuberosus*, *Vicia tenuifolia*, *Salvia pratensis*, *Stachys recta*, *Veronica latifolia*, *Saxifraga granulata*, *Cynanchum Vincetoxicum*,

1. Neben dem Hahnenberge, rechts von dem Fahrwege, der nach Belvedere hinaufführt, fand Schultz seine *Sagina ciliata*; ich habe sie dort später vergebens gesucht.

Dianthus prolifer und Armeria, Poterium Sanguisorba, so wie mehrere Arten der schwer zu enträthselnden Gattungen Rubus und Verbascum. Im Brodaer Holz endlich selbst wachsen Viola hirta, Ulmus campestris var. suberosa, Astragalus Cicer, Vicia angustifolia, Pyrola minor, Neottia Nidus avis, Hypericum humifusum, Polypodium Phegopteris und Dryopteris, am Seeufer Mentha sylvestris und am Rande eines kleinen Fennbruches unter den Raumen-Eichen Myosotis versicolor, so wie in dem Bruche selbst Scheuchzeria palustris, Lysimachia thyr-siflora, Utricularia minor, Droserae, Spargania, Hypnum stramineum, Aulacomnion palustre, Meesia tristicha u. dgl.; außerdem kommen an nennenswerthen Moosen im Walde noch vor: Trichostomum pallidum, Dicranum majus, Leptohymenium filiforme, Hypnum loreum, longirostrum, brevirostrum, piliferum, Diphyscium foliosum, Jungermannia trichophylla, Liochlaena lanceolata, Scapania nemorosa und undulata, Sarcoscyphus Ehrharti und Chiloscyphus pallescens; ferner Polyporus giganteus und viele andere Pilze. Aus diesem Walde holen die Kinder im Frühlinge vorzugsweise den schön duftenden Waldmeister, hier „Möhsch“ genannt, um ihn zu Kränzen gewunden in der Stadt zu verkaufen.

Das auf dem jenseitigen Seeufer gelegene Nemrower Holz ist ein schöner, mit Buchen gemischter Eichenwald, der außerdem auch noch alle oben als für dies Florengebiet charakteristisch bezeichnete Baum- und Straucharten enthält, und aus welchem Neubrandenburg im Frühlinge besonders mit „Eiljenconsalgen“ versorgt wird, die für die ärmeren Kinder einen Handelsartikel bilden. Auf meinen

Spaziergängen habe ich mehr als 150 Arten phanerogamischer Pflanzen angezeichnet, welche den bunten Teppich des Waldbodens bilden. Ich nenne darunter nur folgende in diesem Gebiete weit verbreitete:

Anemone Hepatica, *nemorosa*, *ranunculoides* und *pratensis*, *Ranunculus polyanthemos*, *Philonotis*, *lanuginosus*, *Turritis glabra*, *Corydalis intermedia*, *Viola sylvestris*, *Orobus vernus*, *niger* und *tuberosus*, *Lathyrus pratensis*, *Genista tinctoria* und *germanica*, *Astragalus glycyphyllos*, *Vicia cassubica*, *Trifolium alpestre*, *montanum* und *agrarium*, *Lychnis Viscaria*, *Silene nutans*, *Dianthus Carthusianorum*, *Stellaria Alsine*, *Holostea*, *palustris* und *graminea*, *Rubus Idaeus*, *saxatilis* u. a., *Fragaria vesca*, *Geum urbanum* und *rivale*, *Potentilla reptans* und *Tormentilla*, *Hypericum montanum*, *quadrangulare* und *perforatum*, *Lysimachia Nummularia*, *Asperula odorata*, *Galium sylvaticum*, *Sedum reflexum* und *Telephium*, *Saxifraga granulata*, *Cynanchum Vincetoxicum*, *Hedera Helix*, *Epilobium montanum*, *Sanicula europaea*, *Pimpinella Saxifraga* und *magna*, *Laserpitium pruthenicum*, *Solidago Virga aurea*, *Gnaphalium sylvaticum*, *Hieracium murorum*, *vulgatum* und *umbellatum*, *Campanula Trachelium*, *patula* und *persicifolia*, *Phyteuma spicatum*, *Myosotis intermedia*, *Pulmonaria officinalis*, *Vaccinium Myrtillus*, *Pyrola rotundifolia*, *minor* und *secunda*, an feuchten Orten *Impatiens Noli tangere*, *Melampyrum pratense* und *nemosum*, *Scrophularia nodosa*, *Veronica Chamaedrys*, *officinalis* und *latifolia*, *Ajuga genevensis*, *Stachys sylvatica*, *Thymus Serpyllum*, *Calamintha Acinos*, *Galeopsis versicolor*, *Clinopodium vulgare*, *Origanum vulgare*, *Primula officinalis*, *Plantago media*, *Mercurialis perennis*, *Humulus Lupulus*, *Orchis maculata* und *latifolia*, *Neottia Nidus avis*, *Convallaria majalis* und *multiflora*, *Gagea lutea*, *Carex digitata*, *vesicaria*, *Drymeja*, *remota* und *flava* (Oederi), *Agrostis arundinacea*, *Melica nutans*, *uniflora*, *Briza media*, *Festuca duriuscula*, *Poa decumbens*, *Phleum Boehmeri*, *Calamagrostis Epigeios*, *Bromus asper*, *tectorum* und *pinnatus*, *Polypodium vulgare* und *Dryopteris*, *Botrychium Lunaria*,

Polystichum spinulosum und *Filix mas*, *Asplenium Filix femina*, *Equisetum sylvaticum*.

Von besonderem Interesse in diesem Walde ist für den Botaniker das sogenannte „hohe Ufer“, eine bewaldete Anhöhe, die sich mehr als 100' über den See-
 spiegel erhebt. Er findet dort den in Mecklenburg so seltenen *Sorbus torminalis*, *Lonicera Xylosteum*, *Dentaria bulbifera*, *Corydalis cava*, *Viola mirabilis*, *Veronica spicata*, *Cardamine Impatiens*, mehrere seltenere *Carices*, *Botrychium Lunaria*, *Encalypta streptocarpa*, *Phascum nitidum*, *Didymodon capillaceus* und nicht weit von demselben *Vinca minor*, *Betonica officinalis*, *Dianthus Armeria*, *Campanula glomerata*, *Fragaria elatior*, die schön duftende bei uns seltene und von mir nun auch hier schon seit Jahren vergebens gesuchte *Convallaria Polygonatum*, und am Seeufer *Arabis hirsuta* und *Equisetum hiemale*. Hier ist auch die einzige Stelle, und zwar an dem steilen Uferabsturze zwischen dem Wege und der Tolense, wo ich in Mecklenburg den Epheu in freiem, wilden Zustande blühend angetroffen habe (zuerst im J. 1835), was mir um so auffallender ist, da er angepflanzt in unserem Lande eben gar nicht selten zur Blüthe gelangt; jetzt ist aber leider auch dies blühende Exemplar am hohen Ufer nicht mehr vorhanden, entweder durch Frost getödtet, oder durch muthwillige Knaben vernichtet.

Tiefer hinein im Walde trifft man in einer Schlucht, durch welche ein Fahrweg aus der Nähe des Tannen-
 truges zum See hinabführt, gleichfalls eine sehr schöne Flora. Die Bergabhänge sind vor einigen Jahren durch Holzschlag sehr gelichtet worden, und daher haben sich dort

nun manche Waldpflanzen, welche lichtere Standorte lieben, in großer Ueppigkeit entwickelt. Niemals habe ich die zierliche, weißblühende *Vicia sylvatica* und den schönen, rothen *Lathyrus sylvestris* in solchen Massen gesehen, wie dort; stellenweise waren die Gebüsch, und selbst der Erdboden, von ihnen wie mit einem dichten, bunten Teppiche überdeckt, und man hätte dort auf kleinem Raume einen Frachtwagen mit diesen beiden prachtvollen Pflanzen beladen können. Auch die weiße, wohlriechende Orchis (*Platanthera bifolia*), welche in den der Stadt näher gelegenen Theilen der Walbung durch die Kinder, die deren Knollen zum Verpflanzen in die Gärten ausgraben, schon ausgerottet ist, findet sich dort noch häufig, bezugleich die in Mecklenburg seltene *Actaea spicata*. Hier ist endlich auch der Zweifel gelöst worden, den ich selbst und auch andere mecklenburgische Botaniker bisher an dem Indigenat der schönen, auch in den Gärten häufig cultivirten *Aquilegia vulgaris* gehabt haben, völlig beseitiget. Schulz nahm im J. 1806 diese Pflanze in seiner Stargardschen Flora zwar unter die Zahl der einheimischen auf, strich sie aber im J. 1819 in dem Nachtrage zu seinem Prodrömus wieder, weil sie bis dahin nur in einem einzigen Exemplare in diesem Walde gefunden wäre, welches durch Zufall dahin gekommen sein könne. In den J. 1819 bis 55 wurde abermals (1835) nur wieder ein vereinzeltcs Exemplar am Rande des Waldes gefunden, aber im J. 1855 entdeckte ich zur Seite der erwähnten Schlucht auf einer der höchsten Bergkuppen mitten in diesem großen Walde, — also an einer Stelle, wo an zufällige Verwilderung gar nicht zu denken ist, — diese Pflanze in größerer Anzahl, und zwar auf dem humus-

reichen Boden so kräftig entwickelt, daß einzelne Gr. die Höhe von 3' 8" erreichten; die Blumen aller Gr. waren schön hellblau. Auch im Jahre 1859 habe ich sie an derselben Stelle in üppigster Blüthe angetroffen.

Noch weiter waldeinwärts, nach Kl. Nemerow zu, wird der Boden sandiger, und es treten Tannen an die Stelle der Eichen und Buchen. Hier erscheinen nun sogleich *Viola canina*, *Monotropa Hypopithys*, *Goodyera repens*, *Senecio sylvaticus*, *Epilobium angustifolium* u. a. dergleichen Boden liebende Pflanzen. Bei dem Dorfe Kl. Nemerow tritt aber wieder Lehmboden mit starkem Kalkgehalte auf, und hier findet man nun *Thalictrum minus*, *Allium Scorodoprasum*, *Vicia tenuifolia*, *Campanula bononiensis*, *Malva Alcea*, *Sedum reflexum*, *Veronica spicata* und *latifolia*, *Circaea lutetiana*, *Arabis hirsuta* und *Stachys germanica*, — letztere in solcher Menge auf den Feldern, wie ich sie nie an einem anderen Orte gesehen habe.

Auch die dritte der Stadt benachbarte Waldung, das hauptsächlich mit Eichen bestandene Mühlenholz, liefert manches Interessante. Am Eingange in dasselbe findet man *Campanula latifolia*, *Vicia dumetorum* und auch *sylvatica*; tiefer hinein birgt es *Silene inflata*, *Lonicera Periclymenum*, *Lathraea Squamaria* (in einem kleinen Erlenbruch in großer Menge), *Equisetum hiemale* und *pratense*, *Funaria hygrometrica*, *Dicranum longifolium*, *Leskea attenuata*, *Mnium stellare*, *Bryum roseum*, *Polytrichum angustatum*, *Marchantia conica*, sowie das zarte *Asplenium Trichomanes*; sogar *A. septentrionale* soll nach Schulz bei der hintersten Mühle vorkommen, ich habe es aber

noch nicht finden können, eben so wenig wie den *Dipsacus pilosus*, der dort gleichfalls früher gesehen worden ist. — Dieser Wald ist für Neubrandenburg der Hauptlieferant an „Deschen“, welche als zeitige Frühlingsblumen viel von den Kindern gesammelt und verkauft werden. — Auch mit Himbeeren und Erdbeeren wird die Stadt aus diesen drei benachbarten Wäldungen versorgt. Bizbeeren sind nicht in der nöthigen Menge hier vorhanden, und Preiselbeeren fehlen ganz und gar; letztere kommen in M.-Strelitz nur in dem südlichen Sandgebiete vor.

Ungemein buntfarbig und anmuthig ist die Pflanzenbekleidung der begrastten, sonnigen Hügel um Neubrandenburg, wie des Stargarder Berges, des Gerichtsberges und des Datzberges. — Ich nenne unter den dort vorkommenden zahlreichen Arten nur folgende, nicht durch ganz Mecklenburg verbreitete: *Ranunculus Philonotis*, *Turritis glabra*, *Arabis hirsuta*, *Alyssum calycinum*, *Helianthemum vulgare*, *Polygala comosa*, *Dianthus Carthusianorum*, *Trifolium alpestre*, *montanum*, *agrarium*, *Medicago falcata*, *minima*, *Vicia tenuifolia* (an dem Bierfeller auf dem Gerichtsberge und dem Datzberge sehr häufig), *Anthyllis Vulneraria*, *Fragaria collina*, *Poterium Sanguisorba*, *Saxifraga tridactylites*, *granulata*, *Sabiosa suaveolens*, *Tragopogon pratensis*, *Achyrophorus maculatus*, *Chondrilla juncea*, *Anthemis tinctoria*, *Centaurea maculosa*, *Gentiana cruciata* (nur am Datzberge), *Veronica spicata*, *latifolia*, *Melampyrum arvense*, *Salvia pratensis*, *Plantago media*, *Orchis Morio*, *Asparagus officinalis* (nur am Datzberge), *Phleum Boehmeri*, *Bromus tecto-*

rum, *Brachypodium pinnatum*, *Botrychium Lunaria*. — Diese Hügel sind auch im ganzen norddeutschen Flachlande die einzigen bekannten Fundstätten der *Pupa tridens* Müll., einer kleinen, sehr zierlichen Schnecke, die hier (namentlich auf dem Datzberge häufig) den bunten Pflanzenteppich bewohnt. Auch für den Geognosten und Petrefactologen ist wenigstens einer dieser Hügel von Interesse, nämlich der Gerichtsberg, indem derselbe aus einem durch Aufwühlung mit Diluvialmassen verunreinigten Lager von Septarienthon besteht, welches aber nur arm ist an den diese Tertiärschicht characterisirenden Versteinerungen. — Am Rande des hinter diesem Berge gelegenen kleinen Ihlenpohls trifft der Botaniker *Potentilla supina*, *Myosotis caespitosa*, *Limosella aquatica*, *Phascum patens* var. *megapolitanum*, *Physcomitrium sphaericum*.

Unter den Neubrandenburger Wiesen sind in floristischer Hinsicht die Ruhwiese, nebst den Torf- und Birchbuschwiesen, am Tolensefluß gelegen, die wichtigsten, da sie gleich manchen anderen großen Wiesenniederungen im östlichen Mecklenburg und Pommern (z. B. die Peene-, Trebel- und Recknitzwiesen), den merkwürdigen Anblick einer subalpinen Vegetation darbieten, die hier im Norden Deutschlands fast bis zur Meereshöhe herabgestiegen ist, denn diese Tolensewiesen liegen kaum 40' über dem Spiegel der Ostsee. Man erblickt hier die zierliche *Gentiana Amarella*, die goldgelbe *Saxifraga Hirculus*, vereinzelt auch die schöne rothe Mehlprimel (*Primula farinosa*), welche im nordöstlichen M.-Strelitz, z. B. auf den Wiesen bei Galenbeck (wo auch *Poa sudetica* wächst,) in solcher Menge vorkommt, daß dieselben wie mit einem

röthlichen Schleier bedeckt erscheinen; ferner die schwarzblaue *Sweetia perennis*, die kleine gespornte, ultramarinblaue *Pinguicula vulgaris*, die wohlriechende, rothe *Gymnadenia conopsea*, die so eigenthümlich gestaltete *Ophrys Myodes*, und neben der *Betula pubescens* noch eine andere strauchartige Birke mit kleinen, rundlichen, spitz-gesägten Blättern, die früher unsern Botanikern unter dem Namen *B. fruticosa* bekannt war, jetzt aber *B. humilis* heißt, weil man ermittelt hat, daß die ursprünglich von Pallas mit ersterem Namen belegte Pflanze in der That mit der unserigen nicht identisch ist; auch *Pedicularis sylvatica* kommt dort vor, aber die prachtvolle *P. Sceptum Carolinum*, welche noch zu Anfange dieses Jahrhunderts auf jenen Wiesen gar nicht selten war, scheint durch Torfstich jetzt völlig ausgerottet zu sein. Alle diese Pflanzen, welche zu den Zierden unserer Flora gehören, finden sich im mittleren und südlichen Deutschland nur in den Gebirgsgegenden wieder. Außer ihnen kommen an nennenswerthen Arten hier noch vor: *Lathyrus palustris* und *Veronica longifolia* im Ufergebüsch der Tolense, sowie auf den Wiesen: *Trollius europaeus*, *Cardamine hirsuta*, *Dianthus superbus*, *Stellaria crassifolia*, *Helosciadium repens*, *Peucedanum Oreoselinum*, *Hieracium pratense*, *Crepis paludosa*, *Cineraria palustris*, *Serratula tinctoria*, *Limosella aquatica*, *Utricularia vulgaris* und *minor*, *Salix rosmarinifolia*, *Orchis incarnata*, *Myriophyllum verticillatum*, *Stratiotes aloides*, *Triglochin maritimum*, *palustre*, *Scirpus pauciflorus*, *Schoenus ferrugineus*, *Carex pulicaris* und *dioica*, *Calamagrostis neglecta* und *Ophioglossum vulgatum*. — Von der Ruhweide wird die Stadt

auch mit Champignons (*Agaricus campestris*) versorgt. — In dem an dieselbe stoßenden Brüderbruche wurden *Ribes nigrum*, *Spiranthes autumnalis*, *Galium boreale* und *Mnium stygium* gefunden.

Als Ruderalpflanzen kommen hier z. B. vor: *Asperugo procumbens*, *Hyoscyamus*, *Datura*, *Anthemis tinctoria*, *Marrubium vulgare*, *Hordeum murinum*, — *Xanthium Strumarium* aber scheint in neuerer Zeit verschwunden zu sein. — Auf den Ackerfeldern erblickt man als Unfräuter *Papaver* (alle drei Arten), *Centaurea Cyanus*, *Agrostemma Githago*, *Delphinium Consolida*, *Ranunculus arvensis*, *Ervum tetraspermum*, *Melampyrum arvense*, *Sinapis arvensis*, *Raphanus Raphanistrum*, *Matricaria Chamomilla*, *Anthemis arvensis*, *Bromus secalinus*, *Lolium temulentum*.

An Pflanzen, welche in andern Gegenden des Rehm-Flora-Gebietes (aber zum Theil nur sehr sporadisch) vorkommen, fehlen bei Neubrandenburg z. B.: *Aconitum Napellus*, *Corydalis solida*, *Viola epipsila*, *Rubus horridus*, *rudis*, *Potentilla sterilis*, *Hypericum hirsutum*, *Ribes alpinum*, *Inula salicina*, *Centaurea phrygia*, *Senecio campestris*, *Echinospermum Lappula*, *Myosotis sparsiflora*, *Digitalis ambigua*, *Orobanche ramosa*, *coerulea*, *arenaria*, *Prunella grandiflora*, *Polemonium coeruleum*, *Orchis purpurea*, *Herminium Monorchis*, *Anacamptis pyramidalis*, *Gagea minima*, *Anthericum Liliago*, *ramosum*, *Carex Buxbaumii*, *strigosa*, *Poa bulbosa*, *sudetica*, *Festuca Myurus*, *borealis*, *Equisetum Telmateja*, *Timmia megapolitana*. Manche dieser Pflanzen scheinen überhaupt nur dem Westen Meßlen-

burgs anzugehören, wie z. B. *Potentilla sterilis*, *Hypericum hirsutum* und *Carex strigosa*, der Osten hat dafür Ersatz z. B. an *Trollius europaeus*, *Viola epipsila*, *Nuphar pumilum*, *Polygala comosa*, *Fragaria collina*, *Saxifraga Hirculus*, *Campanula bononiensis*, *Gentiana Amarella*, *cruciata*, *Sweetia perennis*, *Primula farinosa*, *Polemonium coeruleum*, *Echinospermum Lappula*, *Myosotis sparsiflora*, *Stachys germanica*, *Salvia pratensis*, *Pedicularis Sceptrum*, *Orobanche* (jene 3 Arten), *Betula humilis*, *Alisma parnassifolium*, *Orchis purpurea*, *Ophrys Myodes*, *Carex Buxbaumii*, *Poa bulbosa*, *Festuca borealis*.

Werfen wir nun, bevor wir von dieser Gegend Abschied nehmen, um auch den floristischen Character unserer Landseen kennen zu lernen, noch einen Blick auf die mehrfach schon erwähnte Tolense.¹ Dieser schöne See ist $1\frac{1}{2}$ M. lang und durchschnittlich etwa $\frac{1}{6}$ M. breit. Seine Längenausdehnung liegt in der Richtung von S. W. nach N. O., und ein ansehnlicher Theil seines östlichen, so wie seines westlichen Ufers wird durch bewaldete Hügelfetten gebildet, indem auf ersterer Seite das Nemerower Holz in einer Längenausdehnung von $\frac{5}{8}$ M., und auf letzterer das Brodaer Holz sogar fast 1 M. lang den See umsäumt. Die größte gemessene Tiefe des Wassers beträgt 100', der Boden ist Kiesgrund, stellenweise mit vielem Gerölle bedeckt. In seiner Flora spielen Binsen (*Juncus communis*) und Rohr entschieden die Hauptrolle; gleich einem grünen Kranze umschließen sie fast den ganzen schö-

1. Eine ausführliche Beschreibung dieses Sees habe ich 1853 im Archiv für mecklenburgische Landeskunde S. 1 bis 39 gegeben.

nen, klaren Wasserspiegel, und wenn man denselben von einem höher gelegenen Uferpunkte überblickt, sind sie es allein unter allen Seepflanzen, die durch ihre Masse sich bemerklich machen. Durchmustert man aber die Seeflora aus größerer Nähe, — was am besten geschieht, wenn man mit einem Rähne am Ufer entlang fährt, — so bieten sich auch noch manche andere Pflanzen den Blicken dar. Hin und wieder tritt die zierliche *Heleocharis palustris* in größerer Menge auf, mehr vereinzelt die hoch emporstrebenden Rohrkolben (*Typha latifolia* und *angustifolia*), *Scirpus lacustris*, der schöne *Butomus umbellatus*, *Alisma Plantago*, *Sagittaria sagittaeifolia*, *Lythrum Salicaria*, *Nasturtium amphibium*, *Lysimachia thyrsiflora*, *Equisetum limosum* und *palustre*. An Pflanzen mit schwimmenden Blättern erscheinen stellenweise die prachtvolle weiße Seerose (*Nymphaea alba*), eine der schönsten Blumen unserer Flora, sowie das gelbe Nümmelchen (*Nuphar luteum*), die goldgelbe *Utricularia vulgaris*, das zierliche, eine rothblühende Aehre über dem Wasserspiegel emporhebende *Polygonum amphibium*. Noch andere Pflanzen bleiben mit Stamm und Blättern unter dem Wasser verborgen, und stecken nur zur Blüthezeit ihre Blumen und Köpfchen etwas daraus hervor, wie die weiße Wasserranunkel (*Ranunculus divaricatus*), *Myriophyllum spicatum* und mehrere Samfräuter (*Potamogeton lucens*, *perfoliatus*, *praelongus*, *pectinatus* und *filiformis*). Manche Arten endlich bleiben gänzlich unter dem Wasser verborgen, wie *Najas*, *Hippuris*, *Fontinalis antipyretica* und sehr selten (bei Broda zwischen Steinen) *squamosa* und mehrere Species aus den Gattungen *Chara* (*foetida*, *hispida* und *ceratophylla*) und *Nitella*, so wie aus den Familien der *Nostochinae* und *Conservaceae*.

Manche seltene Pflanzen, die in anderen meßenburgischen Seen vorkommen, fehlen leider der Tolense, wie *Nuphar pumilum*, *Lobelia Dortmanna*, *Alisma ranunculoides* und *parnassifolium*, *Ceratophyllum demersum*, *Myriophyllum alterniflorum*, *Elatine Hydropiper* und *Alsinastrum*, *Callitriche autumnalis*, *Polamogeton nitens*, *Villarsia nymphaeoides* (falls sie wirklich im Schweriner See vorkommt), *Heleocharis ovata*, *Pilularia globulifera*, *Nostoc pruniforme*, *Aegagropila Froelichiana*. — Vielleicht werden auch noch einmal *Hydrilla verticillata*, *Najas minor* und *flexilis*; so wie *Isoetes lacustris*, die in den Nachbarländern vorkommen, in unseren Seen entdeckt, wenn dieselben genauer durchforscht werden, als dies bis jetzt geschehen ist, was ich hiermit unsern Botanikern dringend ans Herz gelegt haben will.

Für denjenigen Botaniker aber, für welchen nicht bloß die einzelne Pflanzenspecies als solche ein Interesse hat, sondern der sich auch an schönen Vegetationsansichten erfreuet, bieten die Fahrten auf der Tolense dazu eine reiche Gelegenheit dar. Die großen, dicht bis an den Rand des Sees herantretenden Waldungen bestehen an manchen Uferstrecken aus dem mannigfaltigsten und buntesten Gemisch von Baumarten und Gesträuchen, (und zwar nicht bloß Laub-, sondern auch Nadelholz). Ganz besonders zeichnet sich in dieser Beziehung eine Strecke am westlichen Ufer aus, nämlich die letzte Viertelmeile vor Meiershof, wo die am Ufer stehenden Bäume nicht selten ihre unteren, dichtbelaubten Zweige bis zum Wasserspiegel herabsenken, und im Sommer durch die mannigfache Gestalt ihres Laubes und die verschiedenartigen durch einander gemischten grünen Farbentöne ein reizendes Bild hervor-

zaubern, welches aber im Herbst noch viel effectvoller wird, indem sich dann dem Grün noch gelbe, braune und rothe Farbentinten in allen möglichen Abstufungen beismischen.

Eine besondere Berücksichtigung und Beschreibung verdiente die Flora des Kreidegebietes um den Malchiner See herum (ausgezeichnet durch Orchideen-Reichthum!), so wie des Malchower (bei Poppentin, Wendhof, Rossentin u. s. w.), Wittenborner, Salower u. s. w. Kreidegebietes. Wenn die Punkte, wo die Kreide zu Tage tritt, auch zu isolirt und die floristischen Erscheinungen, welche sie darbieten, nicht charakteristisch genug sind, um daraus ein eigenes von dem der Lehmflora getrenntes Florengebiet construiren zu können, so trägt doch die Vegetation an den bezeichneten Öertlichkeiten dazu bei, den Reiz und die Mannigfaltigkeit des eben geschilderten Gebietes local noch wesentlich zu erhöhen. Da es aber zu einer botanischen Beschreibung jener Kreidegebiete noch an allen Vorarbeiten fehlt, muß dieselbe der Zukunft vorbehalten bleiben.

4. Die **Seestrand-** und **Salinenflora** bildet das vierte floristische Gebiet Mecklenburgs.¹ Erstere umsäumt unseren Ostseestrand, und ihre wesentlichsten Pflan-

1. Ich habe dasselbe schon einmal in Archiv 2, 67 ff. beschrieben. Auch in meiner Schilderung der Insel Rügen (1858 S. 183) habe ich ein Verzeichniß der salzsteten Pflanzen gegeben, und deren geographische Verbreitung am südlichen Rande der Ostsee hinzugefügt; letztere Angaben aber bedürfen mancher Berichtigungen, indem ich aus Fr. Schmidts Flora des sibirischen Bodens von Ebstund, Nord-Pivland und Desel (Dorpat 1855), die mir erst nachträglich zu Gesicht gekommen ist, erfahre, daß manchen jener Pflanzen in nordöstlicher Richtung ein größerer Verbreitungsbezirk zukommt, als ich nach anderen älteren Angaben anzunehmen mich für berechtigt halten durfte.

zen sind, mit Ausschluß der im salzigen Wasser selbst wachsenden, folgende:

Cochlearia Linnaei Griew. (officinalis und anglica L.)

Meklenburg, Rügen O, in Pommern und Preußen selten | .

C. danica Meklenburg, Rügen, Waigat-Insel östlich von Desel | .

Cakile maritima Meklenburg, Pommern, Preußen u. s. w.

Crambe maritima Meklenburg, Rügen, Ehstland | .

Lepidium ruderales.

Viola tricolor var. *syrtica*.

Sagina maritima Meklenburg, Rügen, Pommern | .

Spergularia rubra var. *media*.

var. *marginata*.

Honckenya peploides Meklenburg, Rügen u. s. w.

Althaea officinalis.

Anthyllis Vulneraria var. *maritima*.

Melilotus dentata Meklenburg, Rügen, Pommern, Ehstland | .

Lotus corniculatus var. *tenuifolius*.

Pisum maritimum Meklenburg bis Preußen, und noch weiter?

Hippuris vulgaris var. *maritima*.

Eryngium maritimum Meklenburg bis Preußen | .

Apium graveolens.

Bupleurum tenuissimum Meklenburg, Rügen, Vorpommern | .

Oenanthe Lachenalii.

Aster Tripolium Meklenburg, Rügen u. s. w.

Artemisia campestris var. *sericea*.

A. maritima Meklenburg, Vorpommern, Rügen, Insel Desel | .

Chrysanthemum inodorum var. *maritimum*.

Taraxacum officinale var. *lividum*.

Sonchus arvensis var. *maritimus*.

Jasione montana var. *litoralis*.

Erythraea linariaefolia Meklenburg bis Ehstland. | .

E. pulchella var. *inaperta*.

Odontites rubra var. *litoralis*.

Samolus Valerandi Meklenburg bis Preußen | ; früher auch auf Desel.

- Glaux maritima* Mecklenburg u. f. w.
Armeria vulgaris var. *maritima*.
Statice Limonium Mecklenburg, Vorpommern | .
Plantago lanceolata var. *sericea*.
P. maritima Mecklenburg bis Petersburg.
P. Coronopus Mecklenburg bis Danzig | .
Suaeda maritima bis Ehstland | .
Salsola Kali Pommern u. f. w.
Salicornia herbacea bis Ehstland | .
Obione pedunculata bis Ehstland | ; in Preußen 0?
Atriplex litoralis c. var. Pommern u. f. w.
A. latifolium var. *prostatum*.
 — *Sackii*.
 — *laciniatum* Schk.
Rumex maritimus.
Polygonum amphibium var. *maritimum*.
P. aviculare var. *litorale*.
 — *salinum*.
Hippophaë rhamnoides.
Salix repens var. *argentea*.
Triglochin maritimum.
Asparagus officinalis.
Juncus balticus Pommern u. f. w.
J. compressus var. *Gerardi*.
Scirpus lacustris var. *Tabernaemontani*.
Blysmus rufus bis Dranienbaum bei Petersburg.
Carex extensa Vorpommern, Rügen, Ehstland | .
C. arenaria.
Phleum arenarium.
Calamagrostis armaria.
C. baltica (Bastard).
Koeleria cristata var. *glauca*.
Glyceria maritima bis Ehstland | .
G. distans noch weiter als die vorige.
Triticum junceum bis Preußen | .

T. acutum (Baftarb).

T. strictum (Baftarb).

Elymus arenarius.

Hordeum secalinum.

Lepturus incurvatus (et var.? filiformis?) *Mellenburg, Kügen* | .

Betrachten wir dies Verzeichniß etwas genauer, so werden wir sehen, daß die darin aufgezählten Pflanzen sich in folgende drei Gruppen bringen lassen:

a. den Grundbestandtheil, auf welchem der Character dieses Florengebietes vorzugsweise beruht, bilden die (mit gesperrter Schrift gedruckten) salzteten Pflanzen, d. h. solche, die zu ihrer Existenz nothwendig einen salzhaltigen Standort bedürfen, und daher auf dies Gebiet ausschließlich beschränkt bleiben. Ich habe bei der Aufzählung dieser Pflanzen, welche ohne Ausnahme auch an der deutschen Nordseeküste vorkommen, zugleich ihre Verbreitung am südlichen Ostseestrande durch Pommern, Preußen und die russischen baltischen Provinzen nachzuweisen versucht¹, wobei das Resultat sich herausstellt, daß ihre Anzahl sich nach dieser Richtung hin bald wesentlich vermindert. Dies könnte lediglich von klimatischen Ursachen herrühren, obgleich es auch möglich wäre, daß auch schon bei dieser Erscheinung, wie es unzweifelhaft bei der Verminderung der baltischen Flora und Fauna der Fall ist, die Abnahme des Salzgehaltes in der Ostsee nach der bezeichneten Richtung hin mit im Spiele wäre. — Diesen salzteten Pflanzen gesellt sich am sandigen Meeresufer, auf den Dünen und Strandwiesen

1. Der senkrechte Strich hinter dem Fundorte bezeichnet, daß die Pflanze dort die Endschafft ihres Vorkommens erreichen soll.

b. eine Anzahl salzhaltiger Sand- und Wiesenpflanzen, welche, da sie auch auf nicht-salzhaltigen binnenländischen Standorten gefunden werden, diesem Florengebiete zwar nicht eigenthümlich sind, aber durch häufiges Vorkommen doch zu dessen Charakteristik mit beitragen. — Endlich finden wir noch

c. manche binnenländische Pflanzen, welche hier in eigenthümlichen, durch den salzigen Boden bedingten Varietäten auftreten, die zum Theil von ihren Stammpflanzen so stark abweichen, daß die Mehrzahl der Botaniker sie als selbstständige Art anerkennt, eine Auffassung, der ich mich aus den S. 14 f. angedeuteten Gründen nicht anschließen kann.

d. Außer den auf jene drei Gruppen vertheilten Pflanzen giebt es nun noch eine große Anzahl von Binnenpflanzen, die ohne irgend eine erhebliche Abänderung zu erleiden, auch am Seestrande vorkommen. Alle diese gleichfalls namhaft zu machen, würde von keinem Interesse sein, und deshalb übergehe ich sie mit Stillschweigen.¹ Nur das auffallende Vorkommen unserer zwei (oder nach anderen Ansichten gar drei) *Botrychium*-Arten in den Dünenkesseln, darf wohl nicht ganz unerwähnt bleiben.

e. Daß endlich auch noch einige ausländische Pflanzen mit Ballasterde oder auf andere Weise zufällig an unsere Küste verschleppt worden sind, ist früher (S. 46 52) schon erwähnt worden. Dahin gehören: *Fumaria densiflora*, *Diplotaxis tenuifolia*, *Lepidium latifolium*, *Bunias*

1. Manche derselben hat G. Griewank in seinen Kritischen Studien S. 27. ff. aufgezählt.

orientalis, *Reseda lutea*, *Medicago maculata*, *Rosa lucida*, *Carduus pycnocephalus*, *Helminthia echiioides*, *Polypogon monspeliensis*, *Poa procumbens* und *Hordeum maritimum*. Alle diese Pflanzen sind in ihrem Verbleiben hier sehr unbeständig, und gehören gar nicht zu den Bürgern unserer Flora.

Im Binnenlande treffen wir die Salzflora, wenn auch nicht in der Vollständigkeit, wie am Seestrande, um die Salzquellen herum an. So wachsen z. B. um die Saline zu Sülz, wie Herr Dr. Weidner mir brieflich mittheilt, *Spergularia media* Wahlb., *Apium graveolens* L., *Aster Tripolium* L., *Erythraea pulchella* Fr., *Glaux maritima* L., *Plantago maritima* L., *Chenopodium maritima* L. sp. (sec. Zabel!), *Atriplex latifolium* Wahl. var. *Sackii* und *prostratum*, *Triglochin maritimum* L., *Scirpus Tabernaemontani* Gm., *Scirpus rufus* Schrad. und *Juncus Gerardi* Lois. — Bei Sülzen unweit Brühl fanden C. Griewank und Wülfel *Salicornia herbacea*, *Aster Tripolium*, *Atriplex latifol.* var. *Sackii*, *Triglochin maritimum*, *Apium graveolens*, *Spergularia media*, *Juncus bottnicus*, *Lepidium ruderales*, *Statice Limonium*, *Samolus Valerandi*, *Glyceria distans* und *Cochlearia officinalis*.¹ — Bei Sülz im Amte Eldena kommen nach G. Brückner vor: *Spergularia marina*, *Atriplex latifol.* var. *Sackii*, *Juncus Gerardi*, *Glyceria distans*, *Triglochin maritimum*. — Bei Soltow und Timkenberg in der Inselbau wachsen *Spergularia marina*, *Aster Tripolium*, *Atriplex*

1. Auch bei Neuenkirchen im Amte Bülow giebt es eine Salzquelle über deren Flora mir aber noch keine Angaben vorliegen.

Sackii, *Triglochin maritimum*, *Scirpus Tabernaemontani* und *Juncus bottnicus*. — Durch das Vorkommen von *Samolus Valerandi* am Rühner See, so wie der *Glaux maritima* zwischen Menkendorf und Bresgard in der Haideebene wird auch an diesen beiden Orten ein schwacher Salzgehalt des Bodens angedeutet.

5. Das letzte floristische Gebiet bildet endlich die **Ostsee** selbst, soweit sie unsere Küsten bespült. Phanerogamische Pflanzen kommen in derselben nur wenige vor, und unter diesen ist die zahlreichste, und nach meinen Erfahrungen auch die einzige, welche an dem offenen Seestrande vorkommt, *Zostera marina*, die große submarine Wiesen bildet. In den Meeresbuchten aber (den Wiesen und Bodden,) gesellen sich zu denselben noch verschiedene Varietäten des *Ranunculus aquatilis*, *Ceratophyllum submersum*, *Potamogeton pectinatus* var. *marinus*, *Potamogeton filiformis* (im fl. Sasmunder Bodden), *Ruppia rostellata*, *maritima*, *Zannichellia palustris* var. *pedicellata*, *Najas major*, *Juncus maritimus*, *Scirpus maritimus* und *parvulus* (im Saaler Bodden), *Blysmus rufus* und selbst noch *Phragmites communis*. — Die Algen aber haben hier entschieden das Uebergewicht. Aus dieser Klasse liefert die Familie der Diatomaceen zahlreiche, noch wenig erforschte mikroskopische Arten, desgleichen die Familie der Confervaceen manche Arten, wie z. B. *Conferva sericea*, *laetevirens* und *rupestris*, *Aegagropila Linnaei*, *Ectocarpus ochraceus*; ferner die Familie der Ulvaceen, wie z. B. *Enteromorpha intestinalis* und *compressa*, *Ulva latissima*, *Phycoseris Linza*; die Familie der Ceramiaceen, wie *Callithamnion repens*, *Ceramium diaphanum*

und *rubrum*, *Nemalion multifidum*, *Furcellaria lumbricalis* und *fastigiata*, *Ahnfeltia plicata*, *Phyllophora rubens*, *membranifolia* und *Brodiaei*, *Chondrus crispus*, *Polysiphonia violacea*, *allochroa* und *nigrescens*, *Rhodomela subfusca*, *Sphaerococcus confervoides*, *Delesseria sanguinea*, *Hypoglossum alatum*, *Phycodrys sinuosa*; die Familie der Phyceen: *Mesogloia vermicularis*, *Chorda Filum*, *Stilephora rhizoides*, *Laminaria saccharina* und *digitata*, *Fucus vesiculosus* und *serratus*, *Himanthalia lorea*, *Halidrys siliquosa*; die Familie der Characeen endlich: *Chara ceratophylla*, *hispida*, *crinita*, *baltica* und *aspera*.

Von der geographischen Verbreitung dieser Pflanzen (besonders der Algen) in der Ostsee gilt, was ich im J. 1847 schon von ihnen, wie auch von der Fauna dieses Meeres nachgewiesen habe,¹ daß sie nämlich um so mehr verschwinden, je mehr man sich von den drei Canälen, welche die Ost- und Nordsee verbinden, nach O. und N. hin entfernt. Der Grund hierfür ist der nach eben diesen Richtungen hin abnehmende Salzgehalt des Wassers. — Dies letzte Florengebiet ist übrigens dasjenige, welches noch am wenigsten von den mecklenburgischen Botanikern durchforscht worden ist, und zahlreiche neue Entdeckungen bleiben hier noch zu machen übrig.²

1. In meiner Schilderung der Ostsee im Archiv I. S. 80 ff.

2. G. Brückner, dem ich diesen Abschnitt im Manuscript mittheilte, schrieb mir: „Bei der Schilderung der einzelnen Florengebiete würde ich die Pflanzen nach den Standorten (Wasser, Wiese, Bruch, Wald, hohes Ufer, Berge, Tristen, Wege, Aecker und Gärten) gruppiren, und alle Arten fortlaffen, die in allen drei ersten Hauptgebieten häufig sind, es sei denn, daß sie durch massenhafte Vorkommen, Ausbildung u. s. w.

V. Die Blüthezeit.

Der pflanzen=geographischen Darstellung schließe ich noch einen chronologischen Abschnitt an, in welchem ich die Pflanzen unserer Landesflora nach der Zeitfolge ihres Blühens zusammenstelle. Dies giebt einerseits eine recht anschauliche Uebersicht über die verschiedenen Phasen, in welchen der bunte Teppich unserer Flora sich vom Frühling bis zum Herbst zeigt, andererseits aber gewährt dies beim Auffuchen der Pflanzen eine wesentliche Erleichterung, wenn man ungefähr weiß, um welche Jahreszeit man nach ihnen herumzuspähen hat, und was man zu einer bestimmten Zeit alles bei einander findet. — Hier nun wünschte ich aber ganz besonders, daß mein *G.* 54 erwähntes botanisches Tagebuch ausführlicher sein möchte, da es die Elemente zu dieser Arbeit liefern muß, mich aber oft dabei im Stiche läßt, da ich nicht immer bei den darin aufgezeichneten Pflanzen notirt habe, ob sie blühend gefunden wurden, oder nicht, — denn auch letzteres war häufig der Fall, wo ich seltene Pflanzen nur des Stand=

ein Gebiet charakterisirten, z. B. *Calluna vulgaris*, *Molinia coerulea*, *Pteris aquilina* in dem Haidegebiete, die *Pyroten* und *Lycopodien* im Sandgebiet. Dagegen würde ich die Species, welche den anderen Floren ganz fehlen, oder darin selten sind, durch gesperrte Schrift bezeichnen, und am Schluß jeder Flora allenfalls die Arten angeben, welche derselben noch ganz fehlen, während sie in den beiden anderen häufig sind. Das Bild der Flora wird durch diese doppelte (positive und negative) Behandlung viel deutlicher.“ — Der von meinem Oheim hier vorgezeichnete Weg ist jedenfalls der beste, dennoch habe ich ihn nicht einschlagen können, weil der ganze Verbreitungsbezirk aller einzelnen Pflanzenarten durch das Land noch zu wenig beachtet ist. Es müssen in dieser Hinsicht noch neue specielle Studien in der mecklenburgischen Flora gemacht werden, die ich hiermit unseren Botanikern bestens empfohlen haben will, damit künftig einmal nach dem von Brückner vorgezeichneten Plane verfahren werden könne.

ortes wegen anmerkte. — Doch auch ein sorgfältig geführtes Tagebuch, wenn es zu dem vorliegenden Zwecke ausgebeutet wird, kann Irrthümer verursachen; denn wenn man die Angaben über die Blüthezeit aus verschiedenen Jahrgängen zusammenträgt, kann es wegen der schnelleren oder langsameren Entwicklung der Vegetation in den einzelnen benutzten Jahren geschehen, daß man, auf den gleichen Datum fußend, dennoch Ungleichzeitiges zusammenstellt. Das beste und zuverlässigste Resultat würde man jedenfalls erhalten, wenn man alle, oder doch möglichst viele Data aus einem und demselben Jahre entlehnte, und das wäre so schwer nicht auszuführen, wenn nur ein Botaniker sich entschloße, diesem Zwecke vorzugsweise seine Thätigkeit einen Frühling, Sommer und Herbst hindurch zu widmen. — Bis dies geschehen, bitte ich den folgenden Abschnitt seiner Unvollständigkeit wegen nur als einen vorläufigen Versuch anzusehen, durch welchen ich nur andeuten wollte, wie auch in dieser Richtung hin, meiner Meinung nach, zweckmäßig weiter gegangen werden könnte.

Eine strenge durchgeführte Kalenderform schien mir bei dieser Aufzählung nicht anwendbar. Denn jeder Botaniker weiß, daß die Pflanzen sich mit ihrem Blühen nicht an einen bestimmten Kalendertag binden, sondern dasselbe, je nach der Witterung, bald früher, bald später, eintritt.

Betrachtet man aber den bunten Pflanzenteppich, der jährlich zu unseren Füßen aufgerollt wird, aus einem etwas allgemeineren Gesichtspuncte, so entdeckt man bald, daß derselbe aus einer ganzen Reihenfolge verschieden gestaltiger und verschiedenfarbiger Muster besteht, die an

ihren Rändern freilich in einander fließen, und sich daher nicht ganz scharf von einander abgränzen, in ihren Mittelfeldern aber dennoch wesentliche Unterschiede zeigen. Dies heißt mit anderen Worten: es giebt in der Landesflora eine Anzahl nach und nach sich ablösender Gruppen, deren Pflanzen gemeinschaftlich blühen, und dadurch temporär dem Teppich ein bestimmtes Gepräge verleihen.

In welcher Weise mir diese Gruppen gebildet zu sein scheinen, und wie sie der Zeit nach auf einander folgen, wird aus der folgenden Aufzählung deutlich werden. Die Dauer einer jeden umfaßt die Zeit von etwa einem halben Monat, und fällt auch so ziemlich mit einer bestimmten Kalenderzeit zusammen, die ich in Klammern dabei bemerkt habe. Letztere habe ich absichtlich nicht zur Grundlage der Eintheilung gewählt, weil die ganzen Gruppen durch die Bitterung mitunter ansehnlich entweder weiter vor, — oder zurückgeschoben werden, und sie dann mit der Kalenderzeit nicht zusammenstimmen. Den Vorläufer der ersten Gruppe bildet *Galanthus nivalis*, welcher schon zu Ende Februar und Anfang März erscheint.

I.

(März, zweite Hälfte.)

<i>Alnus glutinosa.</i>	<i>Gagea pratensis.</i>
<i>Anemone Hepatica.</i>	<i>Holosteum umbellatum.</i>
<i>Bellis perennis.</i>	<i>Populus tremula.</i>
<i>Corydalis intermedia.</i>	<i>Salix Caprea.</i>
<i>Corylus Avellana.</i>	<i>Tussilago Farfara.</i>
<i>Gagea lutea.</i>	<i>Viola odorata.</i>

II.

(April, erste Hälfte.)

<i>Adoxa Moschatellina.</i>	<i>Corydalis cava.</i>
<i>Caltha palustris.</i>	<i>Equisetum arvense.</i>

Gagea arvensis.	Populus pyramidalis.
Hippophaë rhamnoides.	tremula.
Lathraea Squamaria.	Ulmus effusa.
Petasites officinalis.	Viscum album.
tomentosus.	

III.

(April, zweite Hälfte.)

Acer platanoides.	Prunus insititia.
Anemone nemorosa.	spinosa.
pratensis.	Pulmonaria officinalis.
Pulsatilla.	Ranunculus Ficaria.
vernalis.	Salix aurita.
Barbarea praecox.	cinerea.
Betula alba.	repens.
Carex praecox.	viminalis.
Chrysosplenium alternifolium.	Veronica agrestis.
Draba verna.	arvensis.
Equisetum Telmateja.	Buxbaumii.
Erodium Cicutarium.	hederaefolia.
Fagus sylvatica.	opaca.
Glechoma hederacea.	polita.
Juniperus communis.	triphyllus.
Oxalis Acetosella.	verna.
Potentilla opaca.	Viola hirta.
Primula officinalis.	mirabilis.
elatior.	sylvestris.
Prunus avium.	

IV.

(Mai, erste Hälfte.)

Alchemilla vulgaris.	Cerastium arvense.
Anemone ranunculoides.	semidecandrum.
Barbarea arcuata.	Dentaria bulbifera.
Cardamine amara.	Empetrum nigrum.
hirsuta.	Euphorbia Cyparissia.
Carpinus Betulus.	Fragaria collina.

Fragaria vesca.
Luzula campestris.
 pilosa.
Lychnis flos cuculi.
Myrica Gale.
Orobus vernus.
Potentilla sterilis.
Prunus Padus.
Pyrus communis.
 Malus.
Quercus Robur.
Ribes Grossularia.

Ribes nigrum.
 rubrum.
Salix alba.
 fragilis.
 purpurea.
 triandra.
Stellaria Holostea.
 uliginosa.
Taraxacum officinale.
Valerianella olitoria.
Vicia lathyroides.
Vinca minor.

V.

(Mai, zweite Hälfte.)

Alyssum calycinum.
Andromeda polifolia.
Anthriscus Cerefolium.
 sylvestris.
 vulgaris.
Arabis hirsuta.
Arctostaphylos Uva ursi.
Asperugo procumbens.
Asperula odorata.
Barbarea vulgaris.
Chaerophyllum temulum.
Convallaria majalis.
Cornus sanguinea.
Evonymus europaeus.
Galeobdolon luteum.
Geranium pusillum.
Geum rivale.
Gnaphalium dioicum.
Hieracium Pilosella.
Lamium album.
 amplexicaule.

Lamium maculatum.
 purpureum.
Lonicera Xylosteum.
Majanthemum bifolium.
Melica nutans.
 uniflora.
Menyanthes trifoliata.
Mercurialis perennis.
Myosotis hispida.
 intermedia.
 stricta.
Odontites verna.
Orchis latifolia.
 Morio.
Orobus niger.
 tuberosus.
Paris quadrifolia.
Quercus sessiliflora.
Ranunculus acris.
 auricomus.
 lanuginosus.

Ranunculus Philonotis.	Stellaria nemorum.
Rhamnus cathartica.	Vaccinium Myrtillus.
Frangula.	uliginosum.
Rhinanthus major.	Vitis Idaea.
minor.	Valeriana dioica.
Salix cuspidata.	officinalis.
pentandra.	Veronica latifolia.
Salvia pratensis.	Viburnum Opulus.
Sanicula europaea.	Vicia tenuifolia.
Saxifraga granulata.	Viola canina.
tridactylites.	epipsila.
Sisymbrium Alliaria.	palustris.
Sorbus Acuparia.	

VI.

(Zuni, erste Hälfte.)

Actaea spicata.	Iris Pseud-Acorus.
Aegopodium Podagraria.	Ledum palustre.
Ajuga genevensis.	Leontodon hastilis.
Aquilegia vulgaris.	Lychnis Viscaria.
Barbarea stricta.	Myosotis palustris.
Cardamine Impatiens.	versicolor.
Cerastium glomeratum.	Neottia Nidus avis.
triviale.	Ophioglossum vulgatum.
Convallaria multiflora.	Orchis maculata.
Polygonatum.	purpurea.
Crataegus Oxyacantha.	Pinguicula vulgaris.
Cynoglossum officinale.	Pinus sylvestris.
Equisetum pratense.	Platanthera bifolia.
sylvaticum.	Polygala vulgaris.
Fragaria elatior.	Polygonum Bistorta.
Genista anglica.	Potentilla anserina.
germanica.	Primula farinosa.
Geum urbanum.	Pyrola uniflora.
Hieracium pratense.	Rosa canina.
Hottonia palustris.	tomentosa.

Rubus *Idaeus*.
saxatilis.
Sambucus nigra.
Sarothamnus Scoparius.
Scorzonera humilis.
Silene nutans.
Otites.
Sorbus torminalis.
Spergula arvensis.

Torilis Anthriscus.
Trifolium montanum.
Trollius europaeus.
Turritis glabra.
Ulex europaeus.
Veronica Anagallis.
Beccabunga.
officinalis.
serpyllifolia.

VII.

(Juni, zweite Hälfte.)

Arnica montana.
Botrychium Lunaria.
Briza media.
Calla palustris.
Campanula persicifolia.
Caucalis daucoides.
Chaerophyllum bulbosum.
Cochlearia officinalis.
Comarum palustre.
Epilobium montanum.
Euphorbia palustris.
Genista pilosa.
Geranium dissectum.
Robertianum.
Helosciadium inundatum.
Hordeum murinum.
Linnaea borealis.
Lithospermum officinale.
Lysimachia Nummularia.
thyrsiflora.
Malachium aquaticum.
Medicago lupulina.
minima.

Melampyrum arvense.
Nasturtium amphibium.
Ophrys Myodes.
Orchis incarnata.
Papaver Argemone.
Phyteuma spicatum.
Polygala comosa.
Potentilla argentea.
supina.
Poterium Sanguisorba.
Ranunculus arvensis.
polyanthemus.
Rosa rubiginosa.
Rubus corylifolius.
dumetorum.
fruticosus.
suberectus.
Wahlbergii.
Scrophularia nodosa.
Spergula arvensis.
Spiraea Filipendula.
Stellaria glauca.
graminea.

Thalictrum minus.
Thlaspi arvense.
Tilia platyphyllos.

Vicia dumetorum.
sylvatica.

VIII.

(Juli, erste Hälfte.)

Aethusa Cynapium.
Agrostemma Githago.
Alisma Plantago.
Allium Scorodoprasum.
Anchusa officinalis.
Anthyllis Vulneraria.
Arabis arenosa.
Astragalus glycyphyllos.
Ballota nigra.
Bryonia alba.
Calamintha Acinos.
Camelina sativa.
Campanula latifolia.
 patula.
 rapunculoides.
Centaurea Cyanus.
Cineraria palustris.
Clinopodium vulgare.
Convolvulus arvensis.
 sepium.
Delphinium Consolida.
Dianthus Armeria.
 Carthusianorum.
 deltoides.
 prolifer.
Echium vulgare.
Ervum hirsutum.
 tetraspermum.
Euphorbia Esula.
Galium Aparine.

Galium sylvaticum.
Genista tinctoria.
Helianthemum vulgare.
Honckeya peploides.
Hyoscyamus niger.
Hypochoeris glabra.
 radicata.
Juncus communis.
Lathyrus palustris.
 pratensis.
 sylvestris.
Lysimachia vulgaris.
Marrubium vulgare.
Matricaria Chamomilla.
Nepeta Cataria.
Neslea paniculata.
Ononis repens.
 spinosa.
Orobanche ramosa.
Oxalis corniculata.
 stricta.
Papaver dubium.
 Rhoeas.
Pedicularis sylvatica.
Pimpinella magna.
Pisum maritimum.
Polygonum amphibium.
Potamogeton filiformis.
 mucronatus.
 pectinatus.

Potamogeton perfoliatus.	Sagittaria sagittaeifolia.
Pyrola secunda.	Sedum acre.
umbellata.	Silene inflata.
Ranunculus aquatilis.	Thalictrum flavum.
divaricatus.	Tilia ulmifolia.
Lingua.	Tragopogon pratense.
Rubus affinis.	Thymus Serpyllum.
glandulosus.	Vaccinium Oxycoccos.
rudis.	Verbascum thapsiforme.
thyrsiflorus.	Vicia Cracca.

IX.

(Zufi, zweite Hälfte.)

Achillea Millefolium.	Cichorium Intybus.
Ptarmica.	Circaea alpina.
Achyrophorus maculatus.	lutetiana.
Allium oleraceum.	Cirsium arvense.
vineale.	lanceolatum.
Anthemis Cotula.	Crepis biennis.
tinctoria.	paludosa.
Arenaria serpyllifolia.	pinnatifida.
Armeria vulgaris.	tectorum.
Berteroa incana.	Cuscuta Epilinum.
Betonica officinalis.	Epithymum.
Cakile maritima.	europaea.
Campanula glomerata.	monogyna.
rotundifolia.	Cynanchum Vincetoxicum.
Trachelium.	Digitalis ambigua.
Carlina vulgaris.	Echinospermum Lappula.
Centaurea maculosa.	Elatine Alsinastrum.
Scabiosa.	Hydropiper.
Chondrilla juncea.	Epilobium angustifolium.
Chrysanthemum segetum.	hirsutum.
Leucanthemum.	parviflorum.
Parthenium.	palustre.
Cicendia filiformis.	roseum.

Epipactis Helleborine.
palustris.

Erigeron acris.
canadensis.

Erysimum cheiranthoides.

Eupatorium cannabinum.

Euphorbia Peplus.

Euphrasia officinalis.

Galium Mollugo.
palustre.
saxatile.
verum.

Gentiana cruciata.

Geranium columbinum.
palustre.
pusillum.
sanguineum.

Gnaphalium sylvaticum.

Goodyera repens.

Gymnadenia conopsea.

Gypsophila muralis.

Helichrysum arenarium.

Helosciadium repens.

Hydrocharis Morsus ranæ.

Hypericum perforatum.
quadrangulum.
tetrapterum.

Impatiens Noli tangere.

Inula britannica.
salicina.

Knautia arvensis.

Lappa tomentosa.

Leonurus Cardiaca.

Lepidium ruderales.

Linaria vulgaris.

Linum catharticum.

Lotus corniculatus.

Lycopodium clavatum.
inundatum.

Lycopus europæus.

Lythrum Salicaria.

Malva Alcea.
neglecta.
sylvestris.

Medicago falcata.

Melampyrum cristatum.
nemorosum.
pratense.

Melandrium album.
rubrum.

Mentha aquatica.

Monotropa Hypopitys.

Nuphar luteum.
pumilum.

Nymphaea alba.

Odontites rubra.

Oenanthe fistulosa.
Lachenalii.
Phellandrium.

Oenothera biennis.

Origanum vulgare.

Ornithopus perpusillus.

Orobanche coerulea.

Potamogeton natans.
praelongus.

Potentilla procumbens.
reptans.

Tormentilla.

Prunella grandiflora.
vulgaris.

*Pulicaria dysenterica.**vulgaris.**Radiola linoides.**Ranunculus sceleratus.**Rubus caesius.**discolor.**Radula.**Sprengelii.**thyrsoides.**villicaulis.**Sanguisorba officinalis.**Scabiosa Columbaria.**Scirpus maritimus.**Scutellaria galericulata.**Sedum boloniense.**reflexum.**Senecio Jacobaea.**Sium latifolium.**Sherardia arvensis.**Solanum Dulcamara.**nigrum.**Sonchus arvensis.**Spiraea Ulmaria.**Stachys germanica.**palustris.**Stellaria crassifolia.**Succisa pratensis.**Tanacetum vulgare.**Torilis Anthriscus.**Trifolium alpestre.**arvense.**pratense.**repens.**Utricularia vulgaris.**Verbascum Lychneitis.**nigrum.**Thapsus.**Verbena officinalis.**Veronica longifolia.**scutellata.**Vicia cassubica.*

X.

(August, erste Hälfte.)

*Agrimonia Eupatoria.**odorata.**Althaea officinalis.**Angelica sylvestris.**Apium graveolens.**Archangelica officinalis.**Arnoseris minima.**Artemisia Absinthium.**campestris.**vulgaris.**Asplenium Filix femina.**Ruta muraria.**Asplenium Trichomanes.**Aster Tripolium.**Astragalus Cicer.**Berula angustifolia.**Blechnum Spicant.**Bupleurum tenuissimum.**Callitriche autumnalis.**Campanula bononiensis.**Carduus crispus.**nutans.**Ceratophyllum demersum.**submersum.*

- Cicuta virosa.*
Cirsium acaule.
 oleraceum.
 palustre.
Cnidium venosum.
Conium maculatum.
Corrigiola littoralis.
Cystopteris fragilis.
Datura Stramonium.
Daucus Carota.
Dipsacus sylvestris.
Drosera anglica.
 intermedia.
 rotundifolia.
Equisetum hiemale.
Eryngium campestre.
 maritimum.
Erythraea Centaurium.
Falcaria Rivini.
Filago arvensis.
 germanica.
 minima.
Galeopsis Ladanum.
 ochroleuca.
 Tetrahit.
 versicolor.
Gnaphalium luteo-album.
 uliginosum.
Herniaria glabra.
Hieracium umbellatum.
Hippuris vulgaris.
Hydrocotyle vulgaris.
Hypericum humifusum.
 montanum.
Jasione montana.
- Illecebrum verticillatum.*
Jurinea cyanoides.
Lactuca muralis.
 Scariola.
Laserpitium pruthenicum.
Leontodon autumnalis.
Libanotis montana.
Linaria minor.
Lonicera Periclymenum.
Marrubium vulgare.
Melilotus alba.
 macrorrhiza.
 officinalis.
Mentha arvensis.
 Pulegium.
 sylvestris.
Myriophyllum spicatum.
 verticillatum.
Onopordon Acanthium.
Osmunda regalis.
Parnassia palustris.
Pastinaca sativa.
Peplis Portula.
Peucedanum Oreoselinum.
Picris hieracioides.
Pimpinella Saxifraga.
Polycnemum arvense.
Polypodium Dryopteris.
 Phegopteris.
Polystichum cristatum.
 Filix mas.
 Oreopteris.
 spinulosum.
 Thelypteris.
Pteris aquilina.

<i>Reseda Luteola.</i>	<i>Sonchus asper.</i>
<i>Salsola Kali.</i>	<i>oleraceus.</i>
<i>Scleranthus annuus.</i>	<i>palustris.</i>
<i>perennis.</i>	<i>Stachys arvensis.</i>
<i>Senecio aquaticus.</i>	<i>sylvatica.</i>
<i>barbaraeifolius.</i>	<i>Stratiotes aloides.</i>
<i>erucaefolius.</i>	<i>Solidago Virga aurea.</i>
<i>paludosus.</i>	<i>Thrinicia hirta.</i>
<i>sylvaticus.</i>	<i>Thysselinum palustre.</i>
<i>viscosus.</i>	<i>Xanthium Strumarium.</i>

XI.

(August, zweite Hälfte.)

<i>Bidens cernua.</i>	<i>Hedera Helix.</i>
<i>tripartita.</i>	<i>Heracleum Sphondylium.</i>
<i>Calluna vulgaris.</i>	<i>Lycopodium Selago.</i>
<i>Campanula Rapunculus.</i>	<i>Rubus horridus.</i>
<i>Dianthus superbus.</i>	<i>Salicornia herbacea.</i>
<i>Erica Tetralix.</i>	<i>Saxifraga Hirculus.</i>
<i>Erythraea linariaefolia.</i>	<i>Sedum Telephium.</i>
<i>pulchella.</i>	<i>Senecio nemorensis.</i>
<i>Gentiana campestris.</i>	<i>Sweetia perennis.</i>
<i>Pneumonanthe.</i>	

XII.

(September.)

<i>Artemisia maritima.</i>	<i>Lycopodium annotinum.</i>
<i>Gentiana Amarella.</i>	<i>Pilularia globulifera.</i>
<i>Hieracium boreale.</i>	<i>Scabiosa suaveolens.</i>
<i>Limosella aquatica.</i>	<i>Senecio vulgaris.</i>

VI. Die Nutzpflanzen und Giftpflanzen.

Zu dem vollständigen Bilde einer Specialflora gehört ohne Zweifel auch die Schilderung der practischen Beziehungen, in welchen die Pflanzen des Landes zu den Bewohnern desselben stehen. Wenn ich nun auch hierüber in dem Nachfolgenden einige Andeutungen gebe, so ist es

nicht etwa meine Absicht auch alle diejenigen einheimischen Pflanzen aufzuzählen, die vielleicht mit der Zeit noch einmal nutzbar gemacht werden könnten, sondern ich werde nur ein Blatt aus der Culturgeschichte der Gegenwart hier einreihen, indem ich nur über diejenigen Pflanzenarten einige Andeutungen geben werde, welche jetzt *thatsächlich* benutzt werden, wobei freilich einige Rückblicke auf die Vergangenheit sich nicht ganz werden vermeiden lassen. In welcher Weise ich den hier zu behandelnden Stoff ordnen sollte, darüber bin ich lange unschlüssig gewesen. Es standen mir dazu zwei Wege offen, nämlich entweder die betreffenden Pflanzen nach der Ordnung des natürlichen botanischen Systems abzuhandeln, oder sie je nach der Art des Nutzens, den man von ihnen zieht, in gewisse Gruppen zusammen zu ordnen. Letzterem habe ich der größeren Uebersichtlichkeit wegen den Vorzug gegeben.

1. Auffallend geringe ist der Nutzen, welchen unsere einheimischen wildwachsenden Pflanzen für Küche und Keller gewähren. Eigentliche Nahrungspflanzen sind gar nicht darunter, sondern was benutzt wird, dient dort nur zu untergeordneten Zwecken. Aus der Abtheilung der Phanerogamen verwendet man schon seit langen Zeiten die Erdbeeren, Himbeeren, Birbeeren, Hagebutten, Haselnüsse, Wachholderbeeren und Schwadengrübe; Wassernüsse sollen, wie S. 69 gesagt, früher vorhanden und gleichfalls benutzt worden sein, — eine andere, jetzt sehr beliebte und in manchen Gegenden des Landes sehr häufige Frucht blieb aber bis auf neuere Zeit ganz unbeachtet. Dies ist die Kröns- oder Preußelbeere, die freilich schon gegen Ende des vorigen Jahrhunderts in unseren Seestädten theils

aus Norwegen (S. 35), theils für Rostock aus dem pommerschen Darß eingeführt wurden. Erst um das Jahr 1815 machte der auf letzterer Halbinsel in Born wohnende Oberförster Niemann die Rostocker darauf aufmerksam, daß sie selbst in ihrer großen Haide einen reichen Vorrath dieser Beeren besäßen, worauf denn auch dort die Benutzung derselben ihren Anfang nahm; ¹ in den von der Küste entlegeneren Orten blieben sie aber noch längere Zeit unbekannt. Ich selbst lernte sie zuerst etwa um das Jahr 1830 zu Ludwigslust kennen, wohin ganze Wagenladungen, wenn ich nicht irre, aus dem Hannöverschen kamen, und in großen Mengen für die großherzogliche Küche eingemacht wurden. Zur Herstellung des magenstärkenden „Bitteren“ wird der Wermuth, zum Wachholderbranntwein werden die Knirkbeeren und zum Maltrank der Möhsch benutzt, — letzteres Getränk wird hier aber auch nur erst seit etwa zwanzig Jahren bereitet. Das früher sehr beliebte Birkwasser wird jetzt, in Folge der bessern Forstcontrolle, nur noch ins Geheim von den Kindern gezapft. — Aus der Klasse der Kryptogamen benutzt man nur Champignons und Morcheln. Erstere werden seit neuester Zeit auch schon hin und wieder auf Mistbeeten in Kellern cultivirt, und für letztere gab es schon früher in der benachbarten Mark Brandenburg, und wahrscheinlich auch bei uns, eine zwar sehr einfache, aber etwas kostspielige Culturmethode. Da man nämlich bemerkt hatte, daß dieser Pilz an den Orten, wo Kohlenmeiler gestanden hatten, besonders häufig und üppig emporspresse, bemüheten

1. A. v. Wehrs der Darß und Zingst. Hannover 1819. S. 112 Anm.

sich die Einsammlerinnen der Morcheln die Brandstätten möglichst zu vervielfältigen und richteten dabei so viele Waldbrände an, daß endlich die Gesetzgebung mit schweren Strafen gegen diesen Industriezweig einschreiten mußte.¹

Ebenso wenig zahlreich, wie die im wilden Zustande benutzten Pflanzen, sind diejenigen eingeborenen Arten, welche jetzt zu culinarischen u. a. verwandten Zwecken cultivirt werden. Dies zeigt ein Blick auf unsere Gärten und Ackerfelder, wo wir nur die wenigen vereinzelt, mit gesperrter Schrift gedruckten eingeborenen Pflanzenarten (deren Indigenat überdies bei manchen noch in Frage steht,) zwischen zahlreichen ausländischen Nutzpflanzen antreffen, welche letztere die eigentliche Grundlage unserer Pflanzenkost bilden.

Es werden nämlich in den Gärten als Gemüsepflanzen, Gewürze, Obst u. s. w. cultivirt: verschiedene Kohlarten, weiße Rüben, Kohlrabi, Märrettich, Rettich und Radies, der Weinstock, letzterer aber nur an warmen, geschützten Wänden und im Winter zugedeckt; die Saubohne, Erbse, Kriech- und Stangenbohne, der Pfirsichbaum und die Aprikose, — welche aber eine sehr geschützte Stelle haben und im Winter zugedeckt werden müssen; die Pflaume, und nur noch in Bauergärten die Krefe (*Prunus insititia*) und die Vogelfirsche (*Pr. avium*); die Kirsche, die Himbeere (*Rubus Idaeus*), die Erdbeere (*Fragaria elatior, grandiflora, virginiana*); selten die Mispel, desto häufiger aber Apfel und Birnen (*Pyrus malus, communis*); der Kürbiß, die Gurke, der Portulak, Stachel-

1. Dietrichs Pflanzenreich 1770 S. 1308.

und Johannisbeeren (*Ribes Grossularia, rubrum*, seltener *nigrum*); Sellerie (*Apium graveolens*), Petersilie, Rümmel, Pastinak, Korbwurz (Chaerophyllum bulbosum), Dill, Mohrrübe (*Daucus Carota*); Cichorie (*Cichorium Intybus*), Schwarzwurz (*Scorzonera hispanica*), Salat; der Erbsen (Helianthus annuus) nur noch selten in einigen Gegenden, überall aber die Kartoffel; Majoran, Pfefferkaut, Thymian; Runkelrübe (*Beta vulgaris*), Spinat, Sauerampfer; Hopfen, Walnußbaum, Haselnußstaude (*Corylus avellana, tubulosa*); Knoblauch, Porree, Schnittlauch, Zwiebel; Spargel (*Asparagus officinalis*); Mais, Hirse.

Lenken wir endlich unsere Schritte auf die Ackerfelder und überblicken wir die sämmtlichen dort im Großen zu verschiedenen Zwecken cultivirten Pflanzenarten, so treffen wir dort nur eine einzige Species an, die wir mit Sicherheit als eingeborene beanspruchen können. Es sind nämlich folgende: Erbsen, Linsen, die polnische Wicke (*Ervum monanthos*) als Mengfutter gebauet, die gemeine Wicke (*Vicia sativa* — einheimisch?), Klee (*Trifolium repens* und *pratense*, beide Arten wahrscheinlich nur eingebürgert, nicht eingeboren!) Luzerne, gelbe Lupinen (*Lupinus luteus*) in den Sand- und Haidegegenden; Rübsen, Raps (*Brassica Rapa, Napus*), Runkelrüben, Kartoffeln, Buchweizen, Taback (*Nicotiana Tabacum, rustica*) besonders in Meßlenburg-Strelitz; Spörck (*Spergula arvensis*), Flachs Hanf; Hafer (*Avena sativa*, seltener *orientalis* und *flavescens*), Roggen, Weizen (*Triticum vulgare*, seltener *turgidum, durum, polonicum, Spelta, monococcum, dicoccum*), Gerste (*Hordeum vulgare, hexastichon, disti-*

chon, Zeocriton), Mais, letzterer nur zum Grünfutter gebauet.

Wann diese ausländischen Culturpflanzen in Meßlenburg eingeführt worden sind, darüber fehlen uns leider fast alle sicheren Angaben, da man diesem interessanten Zweige unserer Culturgeschichte früher keine Aufmerksamkeit geschenkt hat. Das Wenige, was sich darüber noch ermitteln läßt, beschränkt sich hauptsächlich auf Folgendes:

Der Anbau mancher wichtigen Pflanze reicht hier schon ziemlich weit zurück, nämlich in die Zeit, als dies Land noch slavische Bevölkerung hatte. Denn als der Bischof Otto von Bamberg im J. 1124 zu unsern Nachbarn, den slavischen Pommern, kam, wurden dort schon Obstbäume gezogen, so wie *triticum*, *papaver*, *cannabus* et *cuncti generis legumina* gebauet. Flachs und Roggen werden im J. 1158 urkundlich unter den slavischen Abgabe-Artikeln genannt, Weizen wird urkundlich 1191, Hafer 1193, Erbsen und ein Birnbaum werden 1228, ein Weinberg¹. 1229, Gerste wird 1255 namhaft gemacht. Auch der Anbau des Buchweizens schreibt sich vielleicht schon von den Slaven her, doch können wir ihn nur erst in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts in Meßlenburg bestimmt nachweisen. Um das J. 1500 wurden auf den Feldern der Johanniter-Comthurei Mirow gebauet: Roggen, Weizen, Gerste, Hafer, Buchweizen, Hanf und Wein; nehmen wir noch die Erbsen dazu, so haben wir damit wohl alles zusammengefaßt, was um jene Zeit Gegenstand

1. Der Weinbau war den Slaven unbekannt; derselbe wurde erst durch die Geistlichkeit (um Abendmahlswein zu haben,) hier eingeführt.

des Unbaues im Großen auf den Ackerfeldern bildete. In den Gärten zog man im 16. Jahrhundert schon Weinstöcke, Pfirsichbäume, Maulbeerbäume, Walnußbäume und Johannisbeeren; veredelte Sorten von Kirschen wurden wahrscheinlich erst im J. 1506 in Mecklenburg eingeführt; über das Gemüse erfahren wir leider gar nichts, doch hat wohl damals schon der Kohl eine Hauptrolle darunter gespielt. Einen sehr bedeutsamen Zweig der städtischen Gartenkultur bildete aber der Hopfenbau, welcher gegenwärtig fast ganz darnieder liegt. — Die wichtigste neue Culturpflanze, deren Anbau im Laufe des 17. Jahrhunderts, und zwar in der zweiten Hälfte desselben, eingeführt wurde, war der Taback. Eine andere, noch viel nützlichere amerikanische Pflanze, die Kartoffel, fand erst im folgenden Jahrhunderte Eingang in Mecklenburg. Die ersten hier gebaueten Knollen sah ein glaubwürdiger Berichterstatter im J. 1736, und in einer Zeitschrift¹ vom J. 1749 handelt ein Artikel „von den in Mecklenburg etwas bekannter werdenden Kartoffeln“; im Großen auf den Feldern angebauet wurden sie jedoch erst seit etwa 1766. B ziemlich gleichen Schritt mit dem Anbau der Kartoffel hielt der Kleebau. Geringe Quantitäten von weißem und rothen Klee wurden zwar schon lange vor der Mitte des vorigen Jahrhunderts gebauet, aber erst gegen das J. 1775 fing man an die ganzen Schläge mit Klee zu durchsäen. Auch mit dem Anbau von Raps wurden schon im J. 1721, von Luzerne um 1750 und Runkelrüben um 1790 Versuche gemacht, — allgemeiner um sich gegriffen hat hier aber die

1. Schweriner Anzeigen 1749 St. 29.

Cultur dieser Pflanzen erst in viel späterer Zeit, nämlich seit etwa dem J. 1825.¹ Zu diesen sind in neuerer Zeit noch verschiedene Arten des Weizens, Hafers und der Gerste hinzugekommen und sodann im Laufe der beiden letzten Jahrzehnte noch der Mais, die gelbe Lupine und die polnische Wicke. Auch die Anlage größerer Maulbeerplantagen für den Seidenbau gehört der neuesten Zeit an, wenn auch vereinzelte Maulbeerbäume in den Gärten erweislich schon zu Anfang des 16. Jahrhunderts vorhanden waren. Eine ganz isolirte und auch schon wieder verschwundene Erscheinung war der Anbau von Krapp- und Weberkarden, der vor etwa 30 Jahren längere Zeit hindurch von dem Vater unseres beliebten humoristischen Dichters Fritz Reuter bei Stavenhagen im Großen betrieben wurde.

Manche Pflanze, welche früher zu culinarischen Zwecken angebauet wurde, ist zwar längst durch andere, wohl-schmeckendere Arten aus den Gärten verdrängt worden, hat sich aber doch verwildert in unserer Flora behauptet und eingebürgert, wie dies z. B. mit *Oenothera biennis*, *Borago officinalis* und vielleicht noch manchen anderen der Fall gewesen sein mag. Welche unserer Pflanzen alle in diese Kategorie gehören, würde sich nur dann mit Sicherheit nachweisen lassen, wenn man diese Seite der vaterländischen Culturgeschichte früher mehr beachtet hätte, als es in der That geschehen ist.

2. Ansehnlicher ist die Zahl der officinellen Pflanzen, welche unsere Flora liefert. Ueber diese hat

1. Eine ausführlichere Geschichte unserer Culturpflanzen haben mein Bruder und ich gegeben in meiner Geschichte Mecklenburgs I, 362 ff. 396 u. II, 518 ff. 523 ff.

mir mein Freund und Verwandter, Herr Apotheker F. Timm in Malchin, Auskunft gegeben, indem er mir nachfolgende nach dem natürlichen Systeme geordnete und von mir hin und wieder ergänzte Uebersicht der einheimischen Arzneistoffe, welche in seiner Apotheke vorrätzig gehalten werden, mitgetheilt hat. Dieselbe wird auch wohl so ziemlich auf alle mecklenburgische Apotheken Anwendung finden.

Anemone pratensis. Von dieser waren früher Kraut und Extract gebräuchlich, in jüngster Zeit wird sie hauptsächlich nur homöopathisch verwendet.

Papaver Rhoeas. Die Blumenblätter dienen zum Brustthee und zur Saftbereitung.

Chelidonium majus wird zur Extractbereitung und zur Tinctur verwendet, auch von Homöopathen, und in der Volksheilmittellehre braucht man die Blätter in Eierfuchen gebacken wider die Gelsucht, nach dem Grundsatz *similia similibus curantur*; nach einer gleichen Ideenverbindung gebrauchte man früher die steinharten Samenkörner des *Lithospermum officinale* gegen Stein- und Griesbeschwerden.

Fumaria officinalis zur Extractbereitung, ist ziemlich veraltet.

Nasturtium officinale zu Kräutersäften.

Cochlearia officinalis, deren Kraut officinell ist, wächst zwar an unserem Seestrande und um Salzquellen wild, wird aber dort wohl kaum eingesammelt. Timm cultivirt seinen Bedarf im Garten.

Von **Viola odorata* werden die Blumen zur Saftbereitung gebraucht, und von *V. tricolor* das Kraut als Pulver und zum Aufguss (*herba Jaceae*). Erstere ist wohl nur eingebürgert.

Malva sylvestris; die Blumen sind officinell.

Althaea officinalis; von dieser Pflanze, deren Wurzel officinell ist, gilt das von *Cochlearia* off. Gesagte.

Tilia platyphyllos und *ulmifolia*, haben officinelle Blüthen; auch als Volksmittel gebraucht.

Hypericum perforatum. Die Spitzen des blühenden Krautes sind unter dem Namen „Johannisraut oder — blut“ besonders als

sympathetisches Volksmittel gebräuchlich; in der homöopathischen Thierheilkunde wird es als blutstillendes Mittel gebraucht.

(*Geranium Robertianum* gilt in manchen Gegenden Deutschlands für ein die Sehkraft stärkendes Volksmittel, — ob auch in Mecklenburg, kann ich nicht sagen. In den Apotheken wird es nicht geführt.)

Rhamnus cathartica: die Beeren werden zur Bereitung eines abführenden Saftes gebraucht, und von *R. Frangula* dient die innere Rinde als abführendes Mittel zum Ersatz des Rhubarbers, — ein altes Volksmittel, dem die Aerzte erst in neuester Zeit Aufmerksamkeit schenken.

Genista tinctoria ein Harn und Schweiß treibendes Volksmittel.

Ononis spinosa und *repens*: die Wurzel noch wenig gebräuchlich gegen Steinbeschwerden u. s. w.

Melilotus macrorrhiza; die blühenden Trauben oder Zweigspitzen wurden früher innerlich gebraucht, jetzt nur noch als äußerlich erweichendes Mittel.

Trifolium arvense; das Kraut unter dem Namen Mäufellee ist als Volksmittel zum Thee nur noch wenig gebräuchlich.

Prunus spinosa. Die Blumen werden unter der Bezeichnung *flores Acaciae nostrat.* als auflösender, gelinde abführender Thee verwendet (Volksmittel.)

Prunus Padus. Die junge Rinde als schweißtreibendes Mittel ist ziemlich veraltet.

Geum urbanum, die Wurzel als Nessel- oder Benedictwurzel (*Radix caryophyllata*) von den Aerzten verordnet, ist ziemlich veraltet.

Rubus Idaeus. Die Früchte dienen zur Bereitung des Himbeersyrups und -wassers.

Potentilla Tormentilla. Die Wurzel als abstringirendes Mittel, besonders in der Thierheilkunde, gebräuchlich.

Agrimonia Eupatoria, das blühende Kraut ist ein wenig gebräuchliches Volksmittel.

Bryonia alba. Die Wurzel wurde früher von den Allopathen gegen Wicht, Manie und Epilepsie gebraucht; jetzt wird sie nur von den Homöopathen verwendet.

Sanicula europaea; das Kraut dient als Volksmittel innerlich und äußerlich gegen Wunden, Quetschungen und Geschwüre; jetzt noch selten angewendet.

Pimpinella Saxifraga; die Wurzel unter dem Namen *Radix Pimpinellae albae* bei Beschwerden des Halses und der Athmungsorgane auch als Volksmittel gebräuchlich.

Oenanthe Phellandrium; die Früchte als *Sem. Phellandrii seu Foeniculi aquatici* officinell.

Archangelica officinalis; die Wurzel ist officinell, und auch in der Thierheilkunde gebräuchlich; seltener das daraus gewonnene ätherische Del. — Obgleich diese und die vorhergehende Pflanze in der Umgegend von Malschin ziemlich häufig sind, werden sie dort doch nicht für die Apotheke eingesammelt.

Conium maculatum. Das Kraut ist als erweichendes, schmerzstillendes äußeres Mittel gebräuchlich, ebenso das aus dem frischen Kraut bereite Extract und auch ein Pflaster; in jüngster Zeit auch das daraus gewonnene sehr giftige Alkaloid „Coniin oder Cicutin.“

Viscum album; die jungen Zweige und Blätter sind officinell, werden aber nur selten angewandt, z. B. in Pulverform gegen Epilepsie u. s. w.

Sambucus nigra; die blühenden Trugdolden sind ein bekanntes schweißtreibendes Mittel.

Valeriana officinalis: die Wurzel und ein daraus gewonnenes ätherisches Del sind officinell. Da die auf Bergwiesen gewachsenen Wurzeln kräftiger sein sollen, werden sie in Mecklenburg (obgleich die Pflanze sehr häufig ist,) nicht eingesammelt.

Succisa pratensis, Kraut und Wurzel früher ein sehr beliebtes Volksmittel (*herba et radix Succisae seu Morsus diaboli*.)

Tussilago Farfara, die jungen Blätter als einhüllendes, die Schleimabsonderung beförderndes, auch zur Herstellung des Brustthees dienendes Mittel.

Solidago Virga aurea, die blühenden Spitzen als Mittel gegen Steinbeschwerden gebräuchlich.

Helichrysum arenarium; das blühende Kraut wird ebenfalls gegen Stein- und Harnbeschwerden verwendet, Volksmittel; wenn ich

nicht sehr irre, werden die Blüthenköpfe auch hin und wieder als Mittel wider Zahnschmerzen aus Pfeifen geraucht.

Artemisia Absinthium; das Kraut mit den blühenden Zweigspitzen, so wie ein daraus gewonnenes Extract, flüchtiges und fettes Del sind officinell.

Artemisia vulgaris; das Kraut mit den blühenden Zweigspitzen, besonders aber die Wurzel in Pulverform gegen Epilepsie gebräuchlich.

Tanacetum vulgare; die blühenden Trugdolben und das daraus gewonnene ätherische Del dienen gegen Wülmer, auch als Volksmittel und in der Thierheilkunde seltener gebräuchlich.

Achillea Millefolium; die Blätter sammt den blühenden Trugdolben, werden als Thee benutzt (ein bekanntes Volksmittel); auch der Extract wird verwendet, weniger das ätherische Del.

Matricaria Chamomilla; die Blüthenköpfe geben einen allgemein bekannten, krampfstillenden Thee; auch das sehr theuere ätherische Del wird benutzt. — Die Pflanze ist hier sehr gemein, und wird auch von armen Kindern gesammelt und für den Hausgebrauch in den Städten zum Verkaufe herumgetragen; die Apotheken sind aber meistens gezwungen ihren großen Bedarf von auswärts (namentlich aus Thüringen) zu beziehen, weil sie nur die Blüthenköpfe gebrauchen und die Einsammler zu faul dazu sind, diese allein zu pflücken. So müssen jährlich mehrere Hundert Thaler, welche hiesige Arme sich mit Leichtigkeit verdienen könnten, ins Ausland gehen.

Arnica montana; die Wurzel, noch mehr aber die blühenden Köpfe und die daraus bereitete Tinctur, besonders in jüngster Zeit auch als Volksmittel sehr bekannt, weniger das aus den Wurzeln gewonnene ätherische Del. — Vor etwa 60 Jahren war diese Pflanze bei Kummerow noch so häufig, daß sie dort noch für die Malchiner Apotheke eingesammelt wurde, jetzt kommt sie dort nur noch vereinzelt vor. Jetzt, glaube ich, beziehen alle unsere Apotheken ihren Bedarf von auswärts.

Lappa communis; die Wurzel ist officinell und wird zu dem bekannten Holzthee, so wie zu einer den Haarwuchs befördernden Salbe verwendet.

Centaurea Cyanus; die Randblüthen dienen als Harn treibendes

Volksmittel, und werden außerdem auch zum Räucherpulver verwendet.

Taraxacum officinale; die Wurzel und besonders das aus dem frischen Kraute bereitete Extract werden verwendet, — letzteres bildet einen Hauptbestandtheil der als sogenannte Frühlingscuren gebräuchlichen Pflanzen decocte.

Vaccinium Myrtillus; die Beeren sind adstringirend und officinell.

Ledum palustre wurde früher gegen Reuchhusten, Fieber und Hautkrankheiten gebraucht, jetzt nur noch selten als Mittel wider die Motten.

Menyanthes trifoliata; die Blätter, das daraus gewonnene sehr bittere Extract und eine Tinctur wurden früher häufiger gegen Wechsel- fieber gebraucht (*herba Trifolii fibrini*).

Gentiana campestris wird jetzt nur noch selten als Volksmittel unter dem Namen „Stah up un gah weg“ (vergk. S. 40) in den Apotheken gefordert. Im Handel bezieht man statt dessen oft *G. Pneumonanthe* und auch *G. Amarella*. Der officinelle Name ist *herba Gentianellae*.

Erythraea Centaurium; das ganze blühende Kraut, so wie das daraus gewonnene Extract sind officinell, und werden unter dem Namen Tausendgülbenkraut oft begehrt.

Cynoglossum officinale; die Wurzel war früher officinell, wird aber jetzt nur noch selten gebraucht und vorrätzig gehalten, obgleich sie in neuester Zeit, namentlich in Rußland, gegen den Biß toller Hunde angewendet wird.

Symphytum officinale; die Wurzel (*Radix Consolidae*) officinell, als Volksmittel in der Thierheilkunde und neuerdings auch in der Homöopathie verwendet.

Pulmonaria officinalis als Volksmittel gegen Schwindsucht u. s. w. gebraucht.

Solanum Dulcamara, die jungen Stengel und Aeste officinell; bei Malschin seit Ausrottung der Bräucher weniger häufig, und daher dort nicht mehr gesammelt.

* *Hyoseyamus niger*; die Blätter, das aus den frischen Blät-

tern gewonnene Extract, sowie die Samen sind officinell; letzterer wird unter dem Namen „Dull Dill“ als Volksmittel gegen Zahnschmerz gefordert.

* *Datura Stramonium*; Stengel, Blätter und Same, jedes für sich officinell; Stengel und Blätter auch als Volksmittel gegen das Asthma gebraucht, erstere aus einer Pfeife geraucht, letztere mit Taback zu Cigarren verarbeitet. In manchen Gegenden dienen auch die Samen unter dem Namen Stätkführn als Volksmittel gegen die Pleureisie. — Unter demselben Namen und zu gleichem Zwecke werden auch die Samen des *Silybum Marianum* hin und wieder gebraucht, einer Pflanze, die in M. nur selten verwildert gefunden wird. — Diese und die vorausgehende Art sind wohl nur eingebürgerte Pflanzen.

Verbascum Thapsus; die Blumen sind officinell und werden namentlich zu dem bekannten Brustthee verwendet.

Linaria vulgaris; das frische Kraut wird zur Bereitung einer nur selten gebrauchten Salbe verwendet.

Veronica Beccabunga; das frische Kraut wird sowohl von den Aerzten, als auch vom Volke als harntreibendes Mittel in der Wassersucht verwendet und in neuester Zeit sehr gerühmt.

Veronica officinalis als Volksmittel gegen Lungenucht, Rheumatismus und Sicht gebräuchlich.

Origanum vulgare als Volksmittel (brauner Duft) gegen Krämpfe, Rheumatismus und unterdrückte Menstruation gebräuchlich.

Thymus Serpyllum; das blühende Kraut für äußerliche Zwecke officinell.

Glechoma hederacea; das Kraut unter dem Namen *Hedera terrestris* officinell, bildet einen Bestandtheil des bekannten Brustthees, und wird auch vom Volke zu ähnlichen Zwecken gesammelt und verwendet.

Marrubium vulgare; das Kraut und das daraus bereitete Extract ist officinell, wird aber nur noch selten gebraucht.

(*Primula officinalis* liefert den Schlüsselblumenthee, ein beliebtes Volksmittel, — wird aber in den Apotheken nicht vorrätzig gehalten.)

Rumex conglomeratus, *crispus* und *obtusifolius* werden als Mutterpflanzen der Grindwurz (radix Lapathi) angegeben, welche aber veraltet und wenig gebräuchlich ist.

Urtica urens; das Kraut (Hibbennettel) ein Volksmittel gegen veralteten Husten, neuerdings auch von den Aerzten zu gleichem Zwecke verwendet.

Urtica dioica ist unter dem Namen herba *Urticae majoris* ein altes Mittel gegen Würmer und auch wohl gegen Schwindjucht.

Humulus Lupulus. Gebräuchlich sind die weiblichen Zapfenblüthen (*Strobuli Lupuli*), so wie die den jüngeren Blättern und Schößlingen aufsitzenden gelblichen Drüsen. — Mit den weiblichen Blüthen gestopfte Kopfstissen sind ein bekanntes gegen Schlaflosigkeit verwendetes Volksmittel. — Die Pflanze ist in den Erlenbrüchern so häufig, daß sie gesammelt werden kann.

Ulmus campestris; die innere Rinde der mehrjährigen Aeste wird zwar noch vorrätig gehalten, aber kaum noch verwendet.

Quercus pedunculata; die Rinde und die Früchte, letztere besonders im gerösteten Zustande, sind officinell. Eichelkaffee wird strophulösen Kindern häufig verordnet.

Salix pentandra, *fragilis*, *alba*, *amygdalina* und *purpurea*, — von allen diesen wird die Rinde zum äußerlichen Gebrauch gesammelt. In *S. pentandra* und *purpurea* soll das Weidenbitter (*Salicin*) in großer Menge enthalten sein.

Populus pyramidalis und *nigra* liefern die im Frühling gesammelten harzigen Knospen, welche früher auch zu Aufgüssen als harntreibendes Mittel gebraucht wurden, jetzt aber nur noch zur Bereitung der als Volksmittel dienenden Pappelsalbe Anwendung finden.

Juniperus communis; die Beeren und das daraus bereitete Extract und flüchtige Del sind officinell; auch in der Volks- und Thierheilkunde als Schweiß und Harn treibendes Mittel sehr gebräuchlich. Das Holz wird nur noch selten gebraucht, häufiger noch das aus demselben gewonnene flüchtige Del. Früher wurde auch das dem Strauche anhängende Harz gesammelt.

Pinus sylvestris; die jungen Sprossen (*Turiones* seu *Gemmae Pini*) werden im ersten Frühjahr gesammelt und innerlich, wie äußer-

lich, aber nur noch selten, gebraucht. Auch sollen sie beim Bierbrauen statt des Hopfens Anwendung finden.

* *Acorus Calamus*; die Wurzel, das aus derselben gewonnene Extract und flüchtige Del sind officinell, — auch in der Volks- und Thierheilkunde.

Orchis purpurea, *Morio*, *mascula* und *laxiflora*, deren Wurzeln den Salep liefern, werden in Mecklenburg nicht zur Gewinnung desselben benutzt, obgleich manche der genannten Arten in einzelnen Gegenden unseres Landes ziemlich häufig sind. Unsere Apotheken beziehen dies Medicament von auswärts.

Convallaria majalis; die blühenden Trauben sind als Bestandtheil des Hufelandtschen Niesepulvers officinell, und werden auch vom Volke zuweilen als Herz und Nerven stärkendes Mittel angewendet.

Carex arenaria; die Wurzel (*radix Caricis arenariae* seu *Sarsaparillae Germanicae* seu *Graminis rubri*) ist officinell. Sie ist im mecklenburgischen Sand- und Haidegebiete häufig genug um für die Apotheken gesammelt werden zu können, ich weiß aber nicht, ob es irgendwo geschieht; bei Neubrandenburg und Malchin fehlt die Pflanze. — Substituirt für dieselbe werden mitunter die Wurzeln von *C. hirta* und *intermedia*, ja selbst von *Scirpus maritimus*. — In neuerer Zeit wird dies Medicament weniger benutzt.

Triticum repens, die Quecke. Der unterirdische Stoc ist als *radix Graminis* officinell und wird zu Abkochungen und zur Bereitung des Queckenextractes gebraucht. Die Pflanze wuchert am stärksten auf humosem Sandboden, und wird dort vorzugsweise für den Apothekenbedarf gesammelt.

Polypodium vulgare; der Wurzelstoc wird hin und wieder in unseren Apotheken noch vorrätzig gehalten, und in der Volksheilkunde selten noch als Engelsilzwurz, Korallenwurz, gegen Gelb- und Wassersucht gefordert.

Polystichum Filix mas; der Wurzelstoc und das daraus bereitete ätherische Extract waren bis vor Kurzem als Bandwurmmittel noch sehr gebräuchlich, scheinen jedoch jetzt durch das Koussou verdrängt zu werden.

Lycopodium clavatum. Das Kraut ist ein veraltetes harn-

treibendes Mittel; gebräuchlicher sind die Sporen als Streupulver (Heggenmehl); letztere werden aber auch von andern Lycop. Arten gebraucht. — In Mecklenburg wird dieser Stoff wohl kaum irgendwo eingesammelt, weil die Pflanze nur stellenweise so häufig ist, daß sich dies verlohnen würde. Man bezieht den Bedarf von auswärts.

Equisetum arvense und *hiemale*; die unfruchtbaren Stengel beider sind schon alte Volksmittel wider Steinbeschwerden; das letztere wird neuerdings auch von Aerzten als solches empfohlen und angewendet.

Polytrichum commune; die Pflanze wird als „Goldenes Wiederthou, Gold- oder Venushaar“ (*herba Adianthi aurei*) jetzt nur noch selten als Volksmittel gegen die verschiedensten Krankheiten gebraucht.

Lobaria pulmonaria als Volksmittel (Lungenkraut genannt,) gegen Lungen- und Brustleiden noch gebräuchlich.

Imbricaria parietina wurde wohl wegen seines bitteren, zusammenziehenden Geschmacks als Fiebermittel versucht, ist jetzt aber fast vergessen.

Polyporus fomentarius, zubereitet officinell unter dem Namen *Agaricus chirurgorum* (Blutschwamm), — wird, wenn er auch zu den einheimischen Pflanzen gehört, doch wohl kaum irgendwo für die Apotheken eingesammelt, sondern von auswärts bezogen.

Polyporus suaveolens, officinell unter dem Namen *Boletus Salicis* (Weidenchwamm), wurde früher gegen Lungenjucht gesammelt und gebraucht.

Außer diesen einheimischen officinellen Pflanzen werden auch noch manche ausländische von unseren Apothekern in ihren Gärten für den Bedarf gezogen. So cultivirt z. B. Timm *Papaver somniferum*, *Althaea rosea*, *Calendula officinalis*, *Carduus benedictus*, *Mentha crispa*, *Melissa officinalis*, *Salvia officinalis*, *Lavendula Spica*, *Thymus vulgaris*, *Origanum Majorana* und *Chenopodium ambrosioides*. — In Bauergärten wird hin und wieder auch noch *Helleborus viridis* zum Curiren des

ranken Viehes cultivirt. Früher ist wahrscheinlich die Anzahl der cultivirten Arzneipflanzen noch weit beträchtlicher gewesen, hat sich aber vermindert, weil man theils die Stoffe jetzt mit geringerer Mühe und Kosten von auswärts beziehen kann, theils aber auch, weil so viele Pflanzen, welche die Aerzte früher anwendeten, schon gänzlich (selbst als Hausmittel!) entweder durch Vereinfachung des Heilverfahrens überflüssig geworden, oder nur aus Unachtsamkeit in Vergessenheit gerathen sind. — Manche derselben aber haben sich, wenn ihnen auch die fürsorgende Hand des Menschen entzogen worden ist, als verwilderte oder eingebürgerte Pflanzen in unserer Flora eingenistet, so daß auch sie (wie die oben erwähnten Küchengewächse,) jetzt einen secundären Bestandtheil derselben bilden. Dahin rechne ich z. B. *Eranthis hiemalis*, *Helleborus officinalis*, *Berberis vulgaris*, *Viola odorata*, *Saponaria officinalis*, *Levisticum officinale*, *Anthriscus Cerefolium*, *Inula Helenium*, *Artemisia pontica*, *Chrysanthemum Parthenium*, *Silybum Marianum*, *Lactuca virosa*, *Atropa Belladonna*, *Datura Stramonium*, *Hyoscyamus niger*, *Aristolochia Clematitis*, *Parietaria officinalis*, *Acorus Calamus*. Von diesen verwilderten Pflanzen liefern nur die vier mit gesperrter Schrift gedruckten Arten den nöthigen Bedarf für die Apotheken.

3. Aber auch noch manches anderweitig nutzbare Product liefert unsere einheimische Flora. Dahin gehört das Nutzholz, sowohl hartes für die Tischler, Stellmacher, Drechsler u. s. w., als auch weiches zu allerlei Schnitzarbeiten. Ersteres geben die Eichen, Buchen, Birken, Eschen und Tannen unserer Wäldungen, die gegen-

wärtig noch einen Flächenraum von etwa 32 □M. bedecken, letzteres die Linden, Weiden und Pappeln. Die biegsamen Zweige der *Salix viminalis* werden von den Korbmachern und zu Einfriedigungen benutzt, während die alten undurchdringlichen und unübersteiglichen Haselwerke (Zäune, deren obere Hälfte aus großen Massen aufgeschichteter Dornzweige bestand,) in neuerer Zeit immer feltener werden. Brennholz liefern hauptsächlich die Eichen, Buchen, Tannen, Erlen und Birken, und an diese reiht sich noch ein anderes, zwar der lebenden Flora angehöriges, aber doch subfossiles Product, nämlich der Torf, von welchem Mecklenburg fast unerschöpfliche Schätze besitzt. Gräser und andere zum Viehfutter dienende Kräuter sind in größter Menge vorhanden, da die Wiesen (incl. der Brücher) ein Areal von mindestens 25 □M. besitzen; sodann Buchmast und Eichen für die Schweine, welchen unsere Flora auch noch in der *Stratiotes aloides* ein sehr beliebtes Nahrungsmittel darbietet. — Die Tanne liefert Theer, die Eiche Borke für die Lohgärber, die Birke Rießer für die Besenbinder, die Linde Bast für Gärtner. Das Rohr wird zum Dachdecken und zur Bekleidung der Wände benutzt, die Rinsen (*Juncus communis*) zur Anfertigung von Matten und anderem Flechtwerk, das Seegras (*Zostera*) zum Stopfen von Matratzen und Polstern, während in den nördlichen Strandgegenden der Seetang (*Fucus*), ebenso wie im südlichen Mecklenburg die Post-Arten (S. 74) zur Ackerdüngung verwendet werden. Als Färbemittel gebrauchte man namentlich in den ländlichen Haushaltungen, vor einigen Decennien auch die Gleißen und Birbeeren, beide sind aber jetzt wohl so ziemlich außer Gebrauch

gekommen, da sich auch in dieser Beziehung die Ansprüche unseres Landvolkes sehr gesteigert haben.

4. Außer den mehr oder weniger wirklich nutzbaren Pflanzen schrieb man früher, und schreibt auch noch jetzt, vielen Gewächsen einen nur eingebildeten Nutzen zu, indem man ihnen außergewöhnliche, übernatürliche Kräfte beilegte. Diese benutzte man in den Zeiten, in welchen noch krasser Aberglaube gleich einer geistigen ägyptischen Finsterniß alle Classen der Bevölkerung umhüllte, als Zaubermittel, und manche derselben (namentlich *Datura Stramonium*, — nach den Erfahrungen die Kämpfer darüber im vorigen Jahrhundert in Persien gemacht hat,) mögen wirklich bei den merkwürdigen Phantasmagorien der Hexen durch ihre narkotischen Eigenschaften eine einflußreiche Rolle gespielt haben. Welche Pflanzen damals alle als Zaubermittel hier in Gebrauch waren, darüber ruhet (Dank der Unwissenheit jener Zeiten!) leider ein Schleier, der niemals mehr gelüftet werden wird. Das Einzige, was ich aus älteren norddeutschen Quellen über diesen Gegenstand erfahren habe, ist Folgendes. Franz Wessel, welcher in der Reformationszeit Bürgermeister zu Stralsund war, erzählt von dem katholischen Feste der Marien-Krautweihe (15. Aug.), wie es zu seinen Jugendzeiten in den norddeutschen Städten gefeiert wurde: „Dann kamen gemeinsamlich aus allen Häusern eine Magd oder eine Frau, die hatten ein Bund Kraut im Arme, fast so groß als eine Garbe. Da war hineingebunden: Fenchel, Baldrian, Hanf, Drandt, Aepfel, Birnen, Wolwerlei, Mankanen (?), Liebstöckel, Vermuth, Hopfen, Haideblumen, Alandt, allerlei Getreidearten, Butterblumen, Flachs, Knoblauch, Zwiebeln,

Kohl, Senf, Sevebaum; dies alles, um damit (wenn das Kraut geweiht war,) besondere Zauberei an Vieh und Menschen zu verrichten. Das ganze Bund war mit einem Bindelbande umwickelt. Hiermit ging es nach der Kirche, und dort weihte es ein Priester wohl eine Stunde lang, und schlug mit dem Weihwedel eine Menge Wasser in das Kraut. Dann gingen sie hinaus auf den Kirchhof und trugen das Kraut umher, in welches so viel Wasser hineingeschlagen worden war, daß die Mägde wohl in zwei bis drei Tagen den Mantel nicht wieder trocken kriegen konnten.“ — Bei der Gleichheit der damaligen pommerschen und mecklenburgischen Zustände dürfen wir wohl annehmen, daß bei dem bezeichneten katholischen Feste in Mecklenburg die Krautbündel auf gleiche Weise zusammengelegt waren, wie in Stralsund.

Eine interessante Arbeit über die Pflanzen als Zaubermittel hat kürzlich Prof. Unger in Wien geliefert.¹ Aus derselben erhellt, daß fast alle in Deutschland gebrauchten vegetabilischen Zaubermittel zu den gemeinsten Pflanzenarten der deutschen Flora gehörten, wie z. B. *Stachys recta*, *Artemisia vulgaris*, *Scabiosa Succisa*, *Glechoma hederacea*, *Origanum vulgare*, *Ononis spinosa*, *Juniperus communis*, *Spartium scoparium* u. s. w. Man gab diesen wohl deshalb den Vorzug vor den stattlicheren Rindern fremder Länder, weil sie trotz ihrer unscheinbaren Gestalt dem Volke, welches sie von Jugend auf kannte, gleichsam befreundeter und daher wichtiger waren, als die

1. Sitz.-Ber. der mathem. naturwiss. Classe der K. K. Akademie in Wien Bd. 33 S. 303 ff. — Vergl. auch Ungers botanische Streifgüge auf dem Gebiete der Culturgeschichte a. a. O. Bd. 23 und 24.

Fremdlinge. Wie viele von den Pflanzen unserer Flora, an denen wir jetzt achtlos vorübergehen, möchten uns, falls sie sprechen könnten, lehrreiche Geschichten von der Verirrung des menschlichen Geistes, und der Rolle, welche sie dabei gespielt, berichten können!

Aber auch noch gegenwärtig ist diese Rolle keineswegs gänzlich ausgespielt. Zwar hat sich im Laufe der Zeiten der Kreis des Aberglaubens sowohl hinsichtlich der Sachen, auf die er sich erstreckt, als auch in Betreff der Personen, in deren Köpfen er herrscht, wesentlich zusammengezogen, einen ansehnlichen Rest des früheren Zauberglaubens trifft man aber noch immer in den sympathetischen Curen an, die noch so häufig von Leuten aus allen Ständen (selbst von solchen, die doch auf geistige Bildung Anspruch machen wollen!) betrieben werden. Welche Pflanzen dabei in Anwendung kommen, kann ich aber als Uneingeweihter nicht berichten. Gelegentlich will ich nur zum Schlusse noch erwähnen, daß eine unserer mecklenburgischen Flora ursprünglich nicht angehörige Zauberpflanze auch hier noch immer sorgfältig cultivirt wird, obgleich man den Zweck, weshalb dies ursprünglich geschah, längst vergessen zu haben scheint. Es ist dies *Sempervivum tectorum*, welches auf das Dach gepflanzt vor dem Einschlagen des Blitzes schützen sollte: auf den Stadldächern in unseren Städten, auf den Dächern der Tagelöhnerhäuser und besonders der Schweineställe in den Dörfern wird diese Pflanze, ohne daß man jenen Nutzen noch dabei beabsichtigt, jetzt vielfältig gezogen.

5. Richten wir nun unseren Blick noch auf diejenigen einheimischen Pflanzen, die ohne grade Nutzen zu gewähren,

doch den Bewohnern des Landes so lieb und werth sind, daß sie entweder in ihrem wilden Zustande häufig gesammelt werden, oder sogar in den Gärten als Zierpflanzen Aufnahme gefunden haben. Ersteres ist der Fall mit den Lehschen (Leberblumen), Vergißmeinnicht, Immortellen (*Helichrysum arenarium*), Möhsch und selbst den Sprickzilgen, die von ärmeren Kindern als Kränze gewunden zum Verfaufe herumgetragen werden; desgleichen bilden Sträuße von Lilienconsalgen und auch von den weißen wohlriechenden Orchis (*Platanthera*) einen Handelsartikel. In den Ziergärten trifft man z. B. Hecken von Weißdorn und Hainbuchen, ferner Ulmen, Linden, Taxis, Eschen, Seedorn, rothen Dorn (eine Spielart der *Crataegus monogyna*), Spiräen (*Sp. Ulmaria* und *Filipendula*, beide mit gefüllten Blüthen), Ephen, Immergrün (*Vinca*), Leberblumen (mit rothen, gefüllten und auch blauen, einfachen Blumen), Goldknöpfchen (*Ranunculus repens fl. pleno*), Eisenhut (*Aconitum Napellus*), Trollius, Akelei (*Aquilegia vulgaris*), Fackeln (Lychnis *Viscaria fl. pl.*), *Sedum reflexum*, Tausendschönchen (*Bellis perennis fl. pl.*), *Achillea millefolium* (mit rothen Blumen), *Campanula persicifolia* und *latifolia*, Grasnelken (*Statice Armeria var. maritima*), Primeln (*Pr. officinalis*, *elatior* und auch wohl *farinosa*), Ehrenpreis (*Veronica longifolia* und *latifolia*), *Polemonium coeruleum*, weiße Orchis, Schneeglöckchen, *Convallaria majalis* und *multiflora*, — und wahrscheinlich auch noch manche andere, die mir augenblicklich nicht beifallen.

Diese bescheidenen Pflanzen stehen aber an Artenzahl gar sehr gegen die stattlichen Ausländer zurück, welche

sich nach und nach in unseren Gärten und Parks angesiedelt haben. Zu den am weitesten durch Meßlenburg verbreiteten ausländischen Bäumen gehören: *Populus pyramidalis* (sehtener *balsamifera*), *Aesculus Hippocastanum* (sehtener *Pavia*), *Robinia Pseud. Acacia* (sehtner *hispida* und *viscosa*, so, wie *Gleditschia triacanthos*), *Pinus Abies*, *Larix*, *Picea*, *Strobus*, *Thuja occidentalis*; hin und wieder kommen auch die Plantane, der Tulpenbaum, die ächte Kastanie und die Trauerweide vor, welcher letzterer aber das hiesige Winter-Klima wenig zusagt. An Kletter- und Schlingpflanzen werden häufig gezogen: *Lonicera Caprifolium*, *Ampelopsis hederacea*, *Clematis azurea*, *Aristolochia Siphon*. Sehr allgemein gezogene Gesträuche sind: *Cornus mascula*, *Berberis vulgaris*, *Ligustrum vulgare*, *Lycium barbarum*, *Lonicera tatarica*, *Symphoricarpos racemosa*, *Diervillia canadensis*, *Philadelphus coronarius*, *Syringa vulgaris* und *chinensis* (sehtner *persica*), *Cytisus Laburnum*, *Colutea arborescens*, *Viburnum Opulus*, *Calycanthus floridus*, *Ptelea trifoliata*, *Ribes sanguineum* und *aureum*, *Spiraea salicifolia*, *hypericifolia* und *ulmifolia*, *Rosa centifolia*, *cinnamomea*, *turbinata*, *pomifera*, *pimpinellifolia*, *lutea*, *Crataegus pyracantha*, *Amygdalus nana*, *Staphylea pinnata*, *Buxus sempervirens*, *Kerria japonica*, *Deutzia scabra*, *Weigelia rosea*, *Cydonia japonica* (welche aber im Winter geschützt werden muß), und noch manche andere, deren Aufzählung uns zu weit führen würde. Mehrere dieser Pflanzen, zu denen besonders das südliche Europa, Asien und Amerika Beiträge geliefert haben, sind erst in neuerer Zeit allgemeiner in unseren Gärten cultivirt worden, wie z. B. die drei

zuletzt genannten, sämmtlich aus Japan stammenden Ge-
sträucher; auch *Kerria japonica*, *Ribes sanguineum*, *Sy-
ringa chinensis*, *Ampelopsis hederacea* und *Symphori-
carpos racemosa* sind erst seit etwa 30 Jahren bekannter
geworden, *Aristolochia Siphon* wird hier bei Neubranden-
burg seit etwa 60 Jahren (zuerst durch meinen Groß-
vater,) gezogen.^{1.}

Von dem endlich, was an ausländischen krautarti-
gen Zierpflanzen in den Gärten Mecklenburgs alles culti-
virt wird, ein auch nur annähernd genügendes Bild zu
geben, ist mir ganz unmöglich, weil es dazu umfangreicher
auf diesen Gegenstand gerichteter Studien bedürfte, die ich
noch nicht habe anstellen können. Eine Aufzählung der-
selben möchte sonst nicht ohne Interesse sein, da diese
Pflanzen, wie auch die vorhin erwähnten Zier-Bäume und
Sträucher, ein Contingent stellen, welches durch Verwilde-
rung oder vollständige Einbürgerung sich nach und nach
in die einheimische Flora eindrängt. Dies ist z. B. der Fall mit
Populus pyramidalis, *Berberis vulgaris*, *Ligustrum vul-
gare*, *Hesperis matronalis*, *Silene Armeria*, *Elsholtzia
cristata*, *Calendula officinalis*, *Galinsogea parviflora*,
Rudbeckia laciniata, *Collomia grandiflora*, *Ornithoga-
lum nutans* u. m. a. Ähnliche Fälle mögen auch schon
früher vorgekommen sein, und es wäre nicht unmöglich,
daß sogar manche der Pflanzen, deren Vorkommen der Art
ist, daß sie jetzt als eingeborene erscheinen, nur ältere ein-

1. Das schönste Exemplar, welches ich bis jetzt gesehen, befindet
sich in der benachbarten Uckermark auf dem gräflichen Arnim'schen Gute
Boizenburg; es stand dort in der amerikanischen Plantage, wand sich
bis in den Gipfel einer Tanne hinauf und sein Stamm hatte reichlich
die Dicke eines starken Armes. Ich sah diese Pflanze im J. 1837.

gebürgerte Zierpflanzen sind, wie z. B. *Aconitum Napellus*, *Polemonium coeruleum* und *Galanthus nivalis*.

6. Stellen wir endlich unseren Nutzpflanzen noch diejenigen einheimischen Gewächse gegenüber, welche dem Menschen direct schädlich sind, — nämlich die Giftpflanzen, — so ist deren Rolle hier glücklicher Weise ganz unbedeutend. Daß durch unachtsame Verwechselung phanerogamischer Giftpflanzen mit ähnlichen nutzbaren Gewächsen Krankheiten oder gar Todesfälle herbeigeführt worden seien, davon ist mir aus Mecklenburg kein einziges Beispiel bekannt. Die Anzahl der benutzten einheimischen Pflanzen ist zu klein, und die einzelnen Arten sind zu kenntlich, als daß hier Irrthümer vorkommen sollten. Nur durch absichtlichen Gebrauch giftiger Pflanzen als Hausmittel, und durch Kinder, die aus Neugierde unter den Pflanzen herumkosten, ob sie nicht etwas Eßbares herausfinden können, wird hin und wieder Unheil angerichtet, aber auch dies geschieht sehr selten. Herr Geh. Medicinalrath Dr. G. Brückner in Ludwigslust wußte mir aus seinem großen Physikatatskreise, welcher die Städte und Aemter Dömitz, Eldena, Grabow und Neustadt, so wie die Kirchensprengel Picher und Reussow umfaßt, während einer mehr als 40jährigen Praxis nur drei Fälle anzuführen. Der erste betraf eine Vergiftung von drei Knaben zu Ludwigslust, die von der Wurzel der *Cicuta virosa* (Schierling) gegessen hatten. Bei dem Knaben, der am meisten genossen, traten schon nach Verlauf einer halben Stunde vollkommen epileptische Anfälle ein, die so schnell auf einander folgten, daß der Moment der Erschlaffung nicht lang genug war, nur einen Theelöffel voll

schwarzen Kaffee zwischen die Zähne hindurch zu bringen. Erst nach mehreren Stunden gelang es, ihm so viel einzulösen, daß er zum Erbrechen kam. Nun wurden die Pausen etwas größer, das Erbrechen wiederholte sich, und die Anfälle nahmen nach und nach die Gestalt des Weitzanzes an, wobei die Pausen wieder verschwanden. Endlich wurden die Bewegungen gelinder, ein bedeutender Schweiß und Schlaf trat ein, und am andern Morgen war bis auf ein leises, allgemeines Zittern und einige gastrische Erscheinungen Alles wieder gut. Die Zufälle bei den anderen beiden Knaben waren ganz dieselben, nur minder heftig, Erbrechen und Schweiß folgten schneller. Sie sagten, die Wurzel (von welcher sie noch Proben in der Tasche hatten,) habe süßlich geschmeckt und es sei ihnen sogleich darnach schlecht zu Muth geworden. — In dem zweiten Falle hatte eine Frau Samen des Wilsenkrautes (*Hyoscyamus niger*) auf einen glühenden Plettholzgen gestreuet, und die Dämpfe durch einen Trichter in einen hohlen Zahn geleitet. Sie bekam gleich darauf Krämpfe in Arm und Bein der einen Seite, die aber bald wieder vergingen, und nur eine Zeit lang noch Schwäche in der Seite zurückließen. — Der letzte Fall bestand in einer Vergiftung durch Rauchen von Stechapfel-Blättern (*Datura Stramonium*), worüber aber die näheren Details fehlen. Daß die Samen unter dem Namen Stechkörner als Volksmittel gegen Seitenstechen (Pleurésie) angewendet werden,¹ ist schon erwähnt worden. „Mehrere

1. Von einem noch tollerem Volksmittel, welches in der Gegend von Neubrandenburg einmal gegen eben diese Krankheit angewendet war, erzählte mir J. Schulz, der Verfasser der Flora Starg., aus

Leute (schreibt G. Brückner,) haben mir gestanden, dies gethan zu haben. Sie hatten die ganzen Körner übergeschluckt, ich erinnere mich aber keines Falles böser Folgen." Einen solchen beobachtete aber sowohl Hr. Dr. Betke zu Rumpshagen, wo eine Frau nach sehr reichlichem Genuß der frischgepflückten Stechkörner schwer erkrankte, als auch Herr Dr. H. Scheven in seinem Malchiner Physikatstreife. Auch zu Goldberg sollen vor mehreren Jahren sich Kinder durch diesen Samen vergiftet haben. — Den traurigsten Ausgang aber hatte eine Vergiftung, über welche mir im J. 1849 E. Huth, damals Rector in Krakow, berichtete. Im April des Jahres 1849 wurde Dr. Lorenz in Krakow (weiland Mitglied unseres Vereins † 1851) nach dem Dorfe Babelin im Ante Goldberg gerufen, wo sich drei Kinder vergiftet hatten. Zwei derselben (von 6 und 4 Jahren) waren bei seiner Ankunft schon todt, ein größeres Mädchen lag mit geschwellenem Gesichte in Krämpfen. Diese Kinder hatten am vorausgehenden Abende von einer im Garten beim Graben herausgeworfenen Wurzel gegessen, welche nun auch noch angebissen vorgefunden wurde und sich als die Wurzel von *Cynoglossum officinale* ergeben haben soll. Dieser Fall wäre um so wichtiger, weil die giftigen Eigenschaften dieser Pflanze, wenn auch wohl schon vermuthet, doch bis jetzt noch so wenig erwiesen gewesen sind, daß Hr. Dr. Weidner in seiner Dissertation über die mecklenburgischen phanerogamischen Gift-

seiner eigenen Praxis. Nach dem Grundsatz daß Stechen durch Stechen vertrieben werden mußte (*similia similibus!*), war dem Kranken zerstoßenes Glas eingegeben worden! Natürlich war er unter furchtbaren Schmerzen gestorben. Einen ähnlichen Fall erlebte Hr. Dr. Betke.

pflanzen (1856) ihr gar nicht einmal eine Stelle unter denselben eingeräumt hat. Die von ihm als giftige Pflanzen unserer Flora bezeichneten Arten sind nämlich folgende:

Thalictrum flavum, alle Arten der Gattungen *Anemone* und *Ranunculus*, *Aquilegia vulgaris*, *Delphinium Consolida*, *Aconitum Napellus*, *Actaea spicata*, *Chelidonium majus*, *Viola odorata*, *canina*, *tricolor*, *Drosera* (alle 3 Arten), *Impatiens Noli tangere*, *Evonymus europaeus*, beide Arten von *Rhamnus*, *Sarothamnus scoparius*, *Bryonia alba*, *Sedum acre*, *Hydrocotyle vulgaris*, *Cicuta virosa*, *Apium graveolens*, *Berula angustifolia*, *Sium latifolium*, *Oenanthe fistulosa* und *Phellandrium*, *Aethusa Cynapium*, *Anthriscus sylvestris*, *Chaerophyllum temulum*, *Conium maculatum*, *Hedera Helix*, beide Arten von *Lonicera*, *Eupatorium cannabinum*, *Senecio vulgaris*, *Lactuca virosa* und *Scariola*, *Ledum palustre*, *Cynanchum Vincetoxicum*, *Solanum* (alle Arten), *Atropa Belladonna*, *Hyoseyamus niger*, *Datura Stramonium*, *Gratiola officinalis*, *Digitalis grandiflora*, *Pedicularis* (alle Arten), *Anagallis arvensis*, (*Daphne Mezereum*), *Aristolochia Clematitis*, *Euphorbia* und *Mercurialis* (alle Arten), *Myrica Gale*, *Alisma* (alle Arten), *Arum maculatum*, *Calla palustris*, (*Leucojum vernum* und *aestivum*), *Paris quadrifolia*, *Convallaria* (alle Arten), *Lolium temulentum*.

Auch noch eine andere, von Dr. W. übergangene Pflanze hätte wohl wenigstens ein Warnungszeichen verdient, nämlich *Asperula odorata*, der Möhsch oder Waldmeister. Obgleich nämlich der Extract dieser Pflanze, der ja bekanntlich dem Maitränk seinen Wohlgeschmack verleiht, ganz unschädlich ist, so soll doch der Duft des Krautes, wo es in etwas größerer Menge in Schlafzimmern aufbewahrt wird, die übelsten Zufälle, ja selbst den Tod herbeiführen können. Hierauf ist in Mecklenburg um so mehr aufmerksam zu machen, da es hier vielfältig Gebrauch ist Möhsch-Kränze oder Sträuße wochenlang in den Zimmern aufzubewahren.

Unverantwortlicher Weise sind diesen einheimischen schädlichen Pflanzen noch zwei sehr gefährliche ausländische, hinzugefügt worden, deren eine schon durch Berührung ihrer Blätter entzündliche Geschwülste hervorruft, nämlich der als Zierstrauch angepflanzte Sumach (*Rhus Toxicodendron*), den man an mehreren Stellen des Ludwigs-Luster Schloßgartens antrifft, und der dort schon mehrfach Kindern, die sich durch seine glänzend grünen Blätter anlocken ließen, Nachtheil gebracht hat. Im dortigen Prinzengarten ist dies Gesträuch wieder ausgerottet, seit ein junges Mädchen, die sich beim Versteckspielen darin verborgen hatte, davon eine allgemeine Gesichtsröthe bekam, die besonders die Augen afficirte und diesen eine Jahre lang anhaltende krankhafte Empfindlichkeit zu Wege brachte. — Die andere, nicht selten in Gärten gezogene Pflanze ist die Tollkirsche (*Atropa Belladonna*), deren Beeren schon mehrfach Unheil in Mecklenburg angerichtet haben.

Aus der Abtheilung der Kryptogamen bietet nur allein die Classe der Pilze giftige Arten dar. Aber während im mittleren und südlichen Deutschland, wo Pilze mit zu den wichtigeren Nahrungsmitteln der ärmeren Volksklassen gehören, durch Verwechselung unschädlicher mit schädlichen Arten, Vergiftungen durch dieselben gar nicht selten vorkommen, ist mir aus Mecklenburg, wo nur Morcheln und Champignons als Delicatsse gegessen werden, nur ein einziger Fall (durch G. Brückner) bekannt, in welchem eine Dame, die vielleicht in anderen Gegenden Deutschlands den Steinpilz (*Boletus edulis*) kennen und essen gelernt hatte, diesen auch hier in Mecklenburg genießen wollte, statt dessen aber eine andere, giftige Art (welche

es gewesen, ist nicht bekannt,) verspeisete, worauf sie ein allgemeines Zittern bekam; schwarzer Kaffee und Citronensaft brachten aber bald ein heilsames Erbrechen zu Wege. — Für sehr giftig gelten die schönen, rothen Fliegenpilze. In Betreff derselben schreibt mir G. Brückner: „Als im Beginne dieses Jahrhunderts der Erbprinzessin Helene Paulowna erste Entbindung erwartet wurde, lag hier in Ludwigslust ein russischer Feldjäger schon mehrere Wochen auf der Lauer, um dem Kaiser Paul die erste Nachricht zu bringen. Eines Tages brachte der Russe seiner Wirthin ein Tuch voller Fliegenpilze, ließ sie nach seiner Vorschrift bereiten, und — trotz aller Protestationen aß er mit gutem Appetit davon. Die Wirkung war eine compleite Cholera, während deren der Kanonendonner die Geburt unseres nachmaligen Großherzogs Paul verkündete. Todtfrank wurde der Russe auf einen Wagen auf Stroh gebettet und kam gesund in Petersburg an. *Relata refero.*“^{1.}

Kurz, als das Endresultat meiner vielen Nachfragen bei unseren Aerzten stellt es sich heraus, daß Vergiftungs-

1. Weiter gegen Osten wird ein noch viel sonderbarer Gebrauch von diesem Pilze gemacht. Denn von den Koreaënen erzählt Langsdorf: „*Coriaecorum gens, in ora Asiae septentrioni opposita, potum sibi excogitavit ex succo inebriante Agarici muscarii. Qui succus (aeque ut Asparagorum,) vel per humanum corpus transfusus, temulentiam nihilominus facit. Quare gens misera et inops, quo rarius mentis sit suae, propriam urinam bibit identidem: continuoque mingens rursusque hauriens eundem succum, pauculis Agaricis producere in diem quintum temulentiam potest.*“ — Sollte der Fliegenpilz in einem kälteren Klima vielleicht weniger giftig werden, wie man ähnliche Wahrnehmungen hinsichtlich der Umänderung von Pflanzenstäben durch klimatische Einwirkung schon mehrfach gemacht hat?

fälle durch einheimische Pflanzen hier zu Lande so selten sind, daß der durch sie herbeigeführte Schaden wohl kaum den zehnten Theil von dem erreicht, den der Blitz hier am Menschenleben durchschnittlich anrichtet!

VII. Die Geschichte unserer Flora.

Ich beginne diesen Abschnitt mit einer chronologisch geordneten kurzen Uebersicht der gesammten mir bekannten auf die mecklenburgische Flora bezüglichen Literatur, welche, wie ich glaube, auf Vollständigkeit Anspruch machen darf. Ausführlicher sind die Titel der einzelnen Schriften und Abhandlungen nachher bei der alphabetisch geordneten Zusammenstellung der Autoren angegeben worden. Die nicht selbstständigen, sondern in Zeit- oder Gesellschaftsschriften u. s. w. erschienenen Abhandlungen sind durch einen * bezeichnet.

1777 Schulz L. enumeratio etc.

* 1780—94 verschiedene mycolog. Abhandlungen von Tode.

1788 Timm J. Prodrumus etc.

1790—91 Tode H. Fungi Meclenb. etc.

1791 Becker H. Beschreibung der Bäume und Sträucher u. s. w.

* Timm J. erster Nachtrag zum Prodr.

* 1792 Tode über Phallus caninus.

* 1793 Tode H. Antwortschreiben an Fförfte.

* 1795 Timm J. zweiter Nachtrag.

Link. H. dissert. botan.

* 1797 Detharding botan. Bemerkungen.

* Timm, Auszug u. s. w.

1803 Brückner A. F. Prodrumus Florae Neobrandb.

1803—6 Crome Sammlung u. s. w.

1804—8 Blandow D. Sammlung meßb. Laubmoose.

1805 Becker H. Beschreibung u. s. w. 2. Aufl.

1806 Schultz C. Prodrumus Fl. Starg.

- * v. Rumph phyl. Beschreibung des Amtes Mirow.
- * Kleinere bot. Mittheil. von Ditmar, Thebe, Siemssen,
Link, v. Rumph, Blandow und Crome in den Verhandl.
d. meßb. naturf. Gesell. (in d. Müßg. Beitr.)
- * 1808 besgl. von Detharding, Link, Thebe, Blandow, Ditmar
und Siemssen.
Bredow tabell. Uebersicht u. f. w.
- * 1809 Kleinere bot. Mit. (Fortsetzung) von Ditmar.
* Link observationes etc. I.
* Detharding Beitr. 3. meßb. Flora.
Detharding Verzeichniß einer Sammlung u. f. w.
Blandow Uebersicht der meßb. Moose.
- * 1810 Kleinere bot. Mit. (Fortsetzung) von Detharding, Ditmar
und Link.
Link Mscr. der meßb. Flora.
- * 1811 Kleinere bot. Mit. (Schluß) von Detharding, Ditmar,
Link und Siemssen.
Bredow ökonom. technische Flora u. f. w.
- * 1813 Link observationes etc. II.
- * 1817 Ditmar, Sturms Flora Abth. III. erstes Bändchen (meßb.
Pilze.)
Brückner A. Nachtrag zu Schultz Prodrornus (inedit!).
- 1819 Schultz suppl. 1.
- * 1823 Schultz de Barbula et Syntrichia.
- * 1824 Schultz in d. Sylloge Ratisbon.
* Brückner G. in Ofens Isis.
- 1828 Detharding Conspectus etc.
Flörke de Cladoniis.
- * Schultz in der Sylloge Ratisbon.
- 1825 Link de antiquitatibus bot. Rostoch.
- * 1836 Meyer Pflanzen um Schwerin.
- 1837 Prahl Flora Gustrov.
Schultz sup. 2 Mscr.
- * 1839 Griewank C. seltnerer Pflanzen Meßbgs.
- 1840 Köper Uebersicht der Gräser Meßbgs.

- 1841 Langmann Flora u. s. w.
 * Brückner G. Pflanzengeographie.
- 1843 Röper zur Flora Meckbgs. I. Farne.
- 1844 Röper z. Fl. Meckbgs. II. Gräser.
 Brintmann Sammlung meckb. Gräser.
 Fiedler Synopsis Hypnearum.
 Fiedler Synopsis der Laubmoose Meckbgs.
 Fiedler Sammlung von meckb. Laubmoosen.
- * 1846 Röper Nachträge und Berichtigungen u. s. w.
- * 1847 Griewank C. seltene Pflanzen des Klützer Orts (Archiv).
 Drewes J. Nachtrag zu Prahl's Index.
- * 1848 Boll E. Seestrand- und Salinenflora (Archiv).
 1848 ff. Fiedler Sammlung getrockneter Pilze.
- * 1849 Boll Flora von M.-Strelitz (Archiv).
- * 1850 Betcke Monographie der meckb. Brombeersträucher (Archiv).
 * Langmann Nachtrag zur Flora (Archiv).
 * Boll Nachtrag zur Flora I. (Archiv).
 * Röper Beitr. z. meckb. Flora.
 Wülfnei Sammlung getrockneter Lebermoose.
- * 1851 Griewank C. über *Lepturus incurvatus* (Archiv).
 * Boll Nachtrag II. (Archiv).
 * Betcke Bemerkungen über einige meckb. Pflanzen (Archiv).
- * 1852 Willebrand über die Flora der Burgwälle (Archiv).
 * Brockmüller Beitr. z. Kenntniß der Haideflora (Archiv).
- * 1853 Schreiber Flora von Grabow und Ludwigslust (Archiv).
 * Brockmüller Nachtrag (Archiv).
 * Wülfnei Pflanzen auf den Salzwiesen von Sülten (Archiv).
- * 1854 Wülfnei meckb. Lebermoose (Archiv).
 * Griewank C. Nachtrag z. d. Pfl. des Klützer Orts (Archiv).
 * Griewank C. über *Senecio nemorensis* (Archiv).
 Wülfnei Flora der Umgegend von Schwerin.
- * 1855 Fiedler Uebersicht der meckb. Pilze I. (Archiv).
 * Brockmüller deux Verbascum etc.
- 1856 Langmann Flora von Nord- und Mitteldeutschland.
 Griewank G. Kritische Studien u. s. w.

Weidner meßb. Giftpflanzen.

* 1857 Boll merkwürdige Bäume in M. (Archiv).

* 1858 Fiedler Uebersicht u. f. w. II. (Archiv).

Von allen diesen Schriften habe ich nur einige in fremden Gesellschaftsschriften verstreute kleinere Abhandlungen von Tode und Link's Schrift aus dem J. 1835 nicht gesehen und folglich auch nicht benutzen können, auf die daher bei einer etwaigen Berichtigung meiner nachfolgenden Angaben besonders Rücksicht zu nehmen wäre.

Aus diesen literarischen Quellen habe ich nun zunächst den speciellen Antheil, welcher jedem unserer Botaniker hinsichtlich der Bereicherung unserer Landesflora durch die Entdeckung neuer Arten gebührt, zu ermitteln versucht, und das Resultat kurz unter den in alphabetischer Reihe geordneten Namen der Botaniker zusammengestellt, wobei zugleich einige Notizen über ihre persönlichen Verhältnisse und eine Aufzählung ihrer auf unsere Flora bezüglichen Schriften gegeben sind. — Sodann habe ich das Entdeckungsjahr jeder einzelnen Species festzustellen gesucht, und als solches dasjenige angenommen, in welchem sie zuerst die Aufmerksamkeit der mecklenburgischen Botaniker erregt hat, gleich viel, ob man sie sogleich richtig als neue Species erkannt, oder nur als Varietät betrachtet hat. In der nachfolgenden Uebersicht der Flora habe ich hinter dem Namen jeder Art in Klammern das Entdeckungsjahr, so wie den abgekürzten Namen des Entdeckers hinzugefügt; aus der Jahreszahl wird man die von mir benutzte literarische Quelle leicht herausfinden können. Ich glaubte, daß dies nicht ohne Interesse sein würde, weil man dadurch einen sehr klaren Ueberblick über die allmähliche Entfaltung der Kunde von unserer Flora gewinnt.

Gelegentliche Erwähnung einzelner mecklenburgischer Pflanzen bei älteren der vor-linnéischen Periode angehörigen Botanikern, wie z. B. der *Ruppia rostellata* bei Bugbaum, der *Myrica Gale* bei Bachmeister (1623), des *Atriplex litorale* var. *marinum* bei Rudbeck, *Teucrium Scordium* bei Simon Pauli u. s. w., haben in dieser geschichtlichen Darlegung unberücksichtigt bleiben müssen. Eine wirklich im inneren Zusammenhange fortlaufende Geschichte der botanischen Bestrebungen in unserm Vaterlande nimmt erst mit dem Jahre 1777 ihren Anfang,¹ und von dieser Jahreszahl bin ich daher auch ausgegangen.

Um nun aber bei den nachfolgenden Erörterungen ein für alle Mal die unerquicklichen Prioritätsstreitigkeiten erfolgreich abzuschneiden, bin ich dem bekannten Gesetze, welches in derartigen Fällen über das Eigenthumsrecht entscheidet, strenge gefolgt, nämlich dem, daß ich die Entdeckung demjenigen zugeschrieben habe, von welchem, oder unter dessen Namen dieselbe zuerst durch Druckschriften veröffentlicht worden ist. Nur zu Gunsten der beiden unter den J. 1810 und 1837 erwähnten Handschriften von Link und F. Schultz habe ich eine Ausnahme

1. Die älteste Flora der Mark Brandenburg (von Escholtz) wurde schon im J. 1663 veröffentlicht, und eine Flora Berolinensis (von Rudolf) erschien schon 1746. Auch in dem benachbarten Vorpommern ist man uns darin zuvorgekommen, denn Wisse's Flora Gryphica erschien 1764, ein Nachtrag dazu von Köpfin und Weigels Flora Pomerano-Rugica 1769, nebst einem Nachtrage 1773. — Wisse stammte aus Schweden und war ein Schüler Linné's; er starb 1791 als Prediger zu Altenkirchen auf Wittow. — Die erste holländische Specialflora (von Weber) stammt aber erst aus dem J. 1780.

machen zu müssen geglaubt, indem ich sie ebenso, wie die Druckschriften, als normirend betrachtet habe, weil jene beiden Arbeiten von vielen unserer Botaniker schon längst gekannt und auch benutzt worden sind. Außerdem habe ich auch noch in einigen wenigen Fällen das Entdeckungsjahr um etwas zurückdatirt, auf Mittheilungen gestützt, welche mir die Entdecker selbst darüber gemacht haben; diese Fälle habe ich durch ein hinter die Jahreszahl gesetztes Ausrufungszeichen kenntlich gemacht, und ebenso auch die ganz neuen Entdeckungen, deren hier zum ersten Male Erwähnung geschieht. — Durch jenen Modus, die gedruckten Quellen als maßgebend zu betrachten, hoffe ich das *suum cuique* soviel als möglich gewahrt zu haben. Sollten dabei aber irgendwie die Rechte eines Entdeckers gekränkt sein, so kann ich mich wenigstens von jeder Absichtlichkeit dabei freisprechen. Der Knoten konnte nur auf die von mir befolgte Weise gelöst werden, denn da manche Pflanzen vor ihrer Veröffentlichung durch den Druck schon Jahre lang vielen einheimischen Botanikern (wie Herbarien und handschriftliche Notizen ausweisen,) als Bürger der Flora bekannt waren, — wohin hätte es wohl führen sollen, wenn ich noch über die gedruckten Quellen hätte zurückgehen wollen?

Was nun die einzelnen Mitarbeiter an dem Aufbau unserer Landesflora und deren Antheil an der Arbeit betrifft, so sind ihrer folgende:

Ackermann F. L. F., früher Seminarlehrer und bis 1851 Seminardirector in Ludwigslust, jetzt Prediger zu Brudersdorf unweit Dargun, bereicherte unsere Flora durch Entdeckung der schönen *Anemone vernalis* (und *Viola uliginosa*).

* Arndt C. I. geb. in Neubrandenburg, Privatlehrer in Quoten, entdeckte die erratiche *Centaurea Calcitrapa*.

Becker H. F. Forstinspector zu Mövershagen (+), gab heraus: Beschreibung der Bäume und Sträucher, welche in Mecklenburg wild wachsen (Rostock 1791. 8.; 2. vermehrte Aufl. 1805). — Verzeichniß der Pflanzen, welche sich auf dem h. Damme bei Doberan finden, in seiner „topographischen Beschreibung des h. Dammes“ (Schwerin 1792). — Er entdeckte an neuen mecklenb. Pflanzen: *Ulex europaeus*, *Hippophaë rhamnoides* und *Salix cinerea*.

* Betcke Dr. E. F., geb. in Neustadt, widmete sich anfänglich der Pharmacie und conditionirte eine Zeit lang in Ludwigslust, studirte dann Medicin. Als practischer Arzt ließ er sich zuerst in Malchin nieder, wo er die Umgegend (öfters gemeinschaftlich mit F. Timm und Detharding) botanisch durchforschte, und siedelte sich dann im J. 1830 nach Penzlin über. Er schrieb: *Animadversiones bot. in Valerianellas* (Diss. inaug. Rost. 1826. 4to). — Monographische Beschreibung der Brombeersträucher Mecklenburgs (Archiv IV. S. 73 ff. 1850). — Bemerkungen und Berichtigungen über einige mecklenburgische Pflanzen (Archiv V. S. 209 ff. 1851). — An neuen Pflanzen entdeckte er: *Rubus vulgaris*, *Radula* und *horridus*, (so wie die Subspecies *villicaulis*, *suberectus*, *affinis*, *discolor* und *thyrsiflorus*), *Agrimonia odorata*, *Valerianella Auricula*, *Hieracium Rothianum* und *praealtum*, *Stachys annua*; auch die Bastarbe *Salix viminalis*-*Caprea*, *Cirsium hybridum* und *oleraceo-acaule* hat er aufgefunden. — Nach ihm belegte De Candolle eine neue zu den Valerianeen gehörige Pflanzengattung mit dem Namen *Betckea*. — Bei der vorliegenden Arbeit unterstützte B. mich auf das freundlichste durch Mittheilung von Pflanzen, Büchern und handschriftlichen Notizen, die von Detharding und Link aufgezeichnet waren, so wie durch Angabe vieler neuer Standorte seltener Pflanzen unserer Flora, namentlich aus der Umgegend von Penzlin.

1. Die Namen derjenigen Botaniker, welche noch gegenwärtig Mitglieder unseres Vereins sind, habe ich durch einen Stern, die gestorbenen oder ausgetretenen durch einen eingeklammerten Stern bezeichnet.

* Beuthe, geb. in Neustrelitz, früher Pharmaceut und als solcher in Braunschweig conditionirend, jetzt Bauschreiber in Neustrelitz, lieferte Beiträge zu Schultz Prodrömus sup. 2 (1837) und zu meinem Nachtrage zur Flora Mecklenburgs (Archiv IV. S. 151 ff. 1850). Die von ihm entdeckten neuen Pflanzen sind: *Arabis arenosa*, *Utricularia intermedia*, (*Polygonum mite*), *Setaria verticillata*, *Arundo varia*, *Chara fragilis*.

Blandow D. C. conditionirte als Pharmaceut in Neubrandenburg, Malchin und Waren und starb am letzteren Orte, wo er auch das Amt eines Notarius bekleidete, im J. 1810. Er war ein tüchtiger Kenner der Laubmoose und gab eine Sammlung mecklenburgischer Laubmoose in 5 Lieferungen (1804 bis 1808) und eine Uebersicht der mecklenburgischen Moose im J. 1809 heraus. Einige andere botanische Mittheilungen von ihm finden sich in den Müll. Beitr. zu den Strel. Anz. 1806, 46 und 1808, 50. Auch an Sturms deutscher Flora hat er mitgearbeitet. Ein von ihm gefertigtes Moosbuch mit eingeklebten Exemplaren befindet sich in meinem Besitze. — Willdenow legte einer neuen Laubmoosgattung den Namen Blandowia bei.

Seine neuen Beiträge zur Landesflora sind: *Geranium sanguineum*, *Corrigiola litoralis*, *Seseli annuum*, *Gentiana Pneumonanthe*, *Orobanche coerulea*, *Eriophorum alpinum*, und an Laubmoosen: *Sphagnum squarrosum*, *Physcomitrium fasciculare*, *Barbula fallax*, *Trichostomum rigidulum*, *pallidum*, *Hymenostomum microstomum*, *Dicranum cerviculatum*, *longifolium*, *Schraderi*, *Mnium stygium*, *serratum*, *rostratum*, *affine*, *Bryum lacustre*, *inclinatum*, *latifolium*, *Warneum*, *elongatum*, *pallens*, *atropurpureum*, *Amblyodon dealbatus*, *Bartramia marchica*, *Orthotrichum obtusifolium*, *pumilum*, *diaphanum*, *Leskea paludosa*, *polycarpa*, *Polytrichum strictum*, *Hypnum exiguum*, *Blandowii*, *Starkii*, *incurvatum*, *populeum*, *megapolitanum*, *cordifolium*, *stramineum*, *Stockesii*, *commutatum*, *palustre*, *Fissidens osmundoides*.

Bleichschmidt, über dessen Lebensverhältnisse mir weiter nichts bekannt ist, als daß er vor etwa dreißig Jahren in Neustrelitz als Pharmaceut conditionirte, lieferte Schultz zu seinem 2. Nachtrage *Corallorrhiza innata* als neuen Beitrag zur mecklenb. Flora.

* Boll E. schrieb im Archiv Folgendes über die Landesflora: Die Seefrands- und Salinenflora der deutschen Ostseeländer (1848 II. S. 67 ff.). Flora von M. Strelitz nebst Beiträgen zur gesammten meßb. Flora (1849. III. S. 5 ff.). Nachtrag zur Flora Mecklenburgs (1850. IV. S. 151 ff.). Zweiter Nachtrag (1851. V. S. 163 ff.). — Neue Beiträge zur Flora lieferte er nur: (*Polygala comosa*, *Elsholtzia Patrini*), *Potamogeton mucronatus* und einige wenige zwar schon lange bekannte, aber noch nicht einregistrirte Pilze.

* Brinkmann D. F. L. Handelsgärtner in Rostock, gab 1844? eine Sammlung meßb. Gräser (erstes Hundert, — ob nicht mehr erschienen?) heraus.

Brockmann J. A. F. jetzt Prebiger zu Profesen, entdeckte als Hauslehrer zu Ludwigslust in bortiger Gegend *Iris sibirica*.

* Brockmüller H. früher Lehrer in Grabow, jetzt in Wölfschendorf bei Nehna, schrieb: Beitrag zur Kenntniß der Haideflora des südwestlichen Mecklenburg (1852. Archiv VI. S. 100 ff.); Nachtrag dazu (1853. Archiv VII. S. 255 ff.). Deux *Verbascum hybrides* de la flore mecklembourgeoise (in den Archives de la Flore de France et d'Allemagne 1855). Er entdeckte den Bastard *Anemone ranunculoidi-nemorosa*.

Brückner A. F. L. Dr. med. und Hofrath, wurde geb. am 29. Nov. 1744 zu Ruhblant in M. Strelitz und starb am 21. April 1823 als practischer Arzt zu Neubrandenburg. Als eiseriger Botaniker hatte er auf seinen vielfachen Berufsreisen Gelegenheit die Flora unseres Landes gründlich zu durchforschen, beschränkte sich aber keineswegs auf dies Gebiet, sondern brachte durch die Verbindungen, in denen er mit vielen ausländischen Botanikern stand, ein für jene Zeit ansehnliches Herbarium von etwa 8000 Arten zusammen. Dasselbe befindet sich, — da Brückner mein Großvater mütterlicher Seits war, — in meinem Besiz, und enthält unter anderen viele Alpenpflanzen (von Hoppe und Schleicher gesammelt), Pflanzen aus Italien (dort bei einjährigem Aufenthalt durch G. Brückner und E. v. Dergzen gesammelt), aus Süd-Frankreich (von Salzmann), Spanien (von Hecht), Ungarn, so wie aus den botanischen Gärten zu Berlin, Göttingen, Greifswald, Halle, Würzburg u. s. w. — Als botanischer

Schriftsteller ist er zwar selbst nicht aufgetreten, wie aber seine die heimische Flora betreffenden Forschungen dennoch nicht verloren gingen, werden wir sogleich zu erfahren Gelegenheit haben.

Brückner A. F. Dr. med. geb. den 22. Nov. 1781 zu Neubrandenburg und gest. ebendasselbst am 25. Mai 1818, der älteste Sohn des vorhergehenden, veröffentlichte seine und des Vaters botanische Entdeckungen in dem *Prodromus Florae Neobrandenburgensis*, Jenae 1803. Später schrieb er noch ein *Florae Stargardiensis Supplementum* (Gryphiae 1817), von welchem aber nur der erste Bogen, die Nachträge bis zur Decandria umfassend, gedruckt, jedoch nicht im Buchhandel erschienen ist. — Diese letzte Arbeit ist in so fern von Interesse, als darin die ersten Spuren pflanzengeographischer Bestrebungen in Mecklenburg auftauchen, indem er in der Vorrede M. Strelitz ganz richtig in zwei botanische Gebiete eintheilt und die charakteristischen Pflanzen derselben angiebt. Von ihm wurde also der Faden zuerst angeknüpft, den erst 24 Jahre später der jüngere Bruder so erfolgreich weiter spann.

Die neuen Beiträge zur Landesflora, welche in den beiden angeführten Schriften enthalten sind, und von denen die meisten dem Vater zufallen, sind: *Ranunculus polyanthemus*, *Cardamine Impatiens*, *hirsuta*, *Viola hirta*, *Spergula pentandra*, *Hypericum tetrapterum*, *Trifolium medium*, *Oxalis corniculata*, *Laserpitium pruthenicum*, *Gentiana Amarella*, *Verbascum Lychnitis*, *Veronica longifolia*, *Mentha sylvestris*, *Stachys germanica*, *Atriplex roseum*, *Betula pubescens*, *humilis*, *Sparganium ramosum*, *Panicum sanguinale*, *Setaria viridis*, *Brachypodium sylvaticum*, *Lolium arvense*, *Lycopodium inundatum*, *Polystichum Oreopteris*, *Hypnum rusci-folium*.

* Brückner G. A. Dr. med. und Geh. Medicinalrath, geb. am 18. Dec. 1789 zu Neubrandenburg, zweiter Sohn des A. F. L. Br., seit 1814 praktischer Arzt in Ludwigslust. Von seinen Schriften beziehen sich nur zwei auf unsere Flora: Ueber den Stand der Botanik in Mecklenburg (in *Oken's Isis* 1824 Beil. 3). — Abriß der Pflanzengeographie Mecklenburgs (1841 als Anhang zu Langmann's Flora von Mecklenburg). — An neuen Pflanzen entdeckte er: *Lepidium*

sativum, *Scutellaria hastifolia*, *Centaurea phrygia*, *Trematodon ambiguus*, *Hydrodictyum utriculatum*, *Furzellaria lumbricalis*, *Rhodomela subfusca*, *Fucus serratus*, *Boletus edulis* und *Hydnum coralloides*. Welche dankenswerthe Hülfe er mir in Betreff der vorliegenden Arbeit gewährt hat, erhehlt aus den vorausgehenden Abschnitten (vergl. S. 42. 54. 60. 66. 97. 135 ff.).

* Brückner H. Dr. med. in Schwerin, geboren zu Ludwigslust, ältester Sohn des letztgenannten, entdeckte *Zeora vitellina*, *Biatra ferruginea*, *sphaeroides*, *Agaricus odoratus*, *stercorarius*, *Cantharellus cinereus*, *Hydnum Erinaceus*, *Corticium aureum*, *Helvella crispa*, *Peziza Marsupium*.

Crome G. E. W. lebte bis Michaelis 1806 als Pharmaceut in Schwerin, ging dann nach Göttingen und starb (wann?) als Professor in Mägelin. Er gab eine „Sammlung deutscher Laubmoose“ heraus, von welcher die erste Lieferung zu Schwerin 1803 und die letzte (2. Nachlieferung) 1806 erschien; alle darin enthaltenen Arten sind in der Umgegend von Schwerin gesammelt. Einige andere botanische Mittheilungen von ihm finden sich in den Mühl. Beitr. zu den Strel. Anz. 1806, 46. 1808, 50. Es existirte früher auch eine handschriftliche Flora Suerinensis von ihm auf der Großherzoglichen Bibliothek zu Ludwigslust, die aber jetzt verschollen ist. Im J. 1831 hatte Detharding sie von dort entliehen, und schrieb darüber an Betcke: „es sind hübsche Sachen darin, Wredow hat das M. S. trefflich genutzt, es enthält aber noch viele Goldkörner und bemerkt viele Standorte.“ — Seine neuen Entdeckungen sind: *Viola mirabilis*, *Villarsia nymphaeoides*, *Cicendia filiformis*, *Heleocharis ovata*, *Scirpus fluitans*, *Sphagnum cuspidatum*, *Funaria hibernica*, *Bryum turbinatum*, *Hypnum piliferum*, *salebrosum*, *sylvaticum*, *brevirostre*.

* Danneel D. geb. in Teterow, studierte die Jurisprudenz, wendete sich dann der Landwirthschaft zu, und ist jetzt Senator in Teterow. Ihm fällt die Entdeckung von *Anacamptis pyramidalis* (und *Nonnea pulla*) zu.

Detharding G. G. Dr. med. geb. zu Rostock den 22. Juni 1765 und gest. ebendort im J. 1838. Er veröffentlichte: Botanische Bemerkungen als Beitrag zur meklenb. Flora (in der Monatschrift

von und für Meßbg. 1797 S. 288 ff.). Beiträge zur meßb. Flora, — in den Rostock. gemeinnützigen Aufsätzen 1809 (auch abgedruckt in den Nützl. Beitr. zu den Strel. Anzeigen 1809 St. 50. 51; vergl. auch noch ebenda 1808, 50 und 1811, 7). Verzeichniß einer Sammlung von getrockneten meßbg. Gewächsen (Rostock 1809). *Conspectus plantarum Magniducatum Megapol. phanerogamarum* (Rost. 1828). Zu dieser letzteren Arbeit lieferten ihm viele Botaniker Beiträge; da er aber bei den einzelnen neuen Species die ersten Entdecker nicht immer namhaft macht, so werde ich diese Arten als von ihm selbst gefunden aufführen müssen, wodurch sein Antheil an den neuen Entdeckungen größer ausfällt, als er es in Wirklichkeit gewesen ist. Von ihm werden nämlich als meßburgische Pflanzen zuerst genannt: (*Ranunculus nemorosus*), *Erysimum hieracifolium*, *Cochlearia danica*, (*Camelina dentata*, *Diploaxis tenuifolia*), *Viola canina*, *Sagina maritima*, *apetala*, *Malva rotundifolia*, *Althaea officinalis*, *Fragaria elatior*, *Sanguisorba officinalis*, *Caucalis daucoides*, *Valerianella dentata*, *Inula salicina*, *Senecio erucaefolius*, *Thrinicia hirta*, *Hypochaeris glabra*, *Tragopogon major*, *Cuscuta Epilinum*, *Myosotis sylvatica*, *versicolor*, *Veronica Buxbaumii*, *Rhinanthus minor*, *Primula elatior*, (*Statice maritima*), *Rumex sanguineus*, *Euphorbia exigua*, *Najas major*, *Gagea lutea*, *Juncus balticus*, *filiformis*, (*alpinus*), *Scirpus rufus*, *Carex chordorrhiza*, *teretiuscula*, *paradoxa*, *brizoides*, *Panicum filiforme*, *Bromus erectus*, (*Triticum strictum*), *Ahnfeltia plicata*, *Hypoglossum alatum*, *Laminaria saccharina*, *Chara aspera*, *horridula*. — Als D. im J. 1829 zum Mitglied der botanischen Gesellschaft in Regensburg ernannt war, beabsichtigte er in deren Schriften einen Nachtrag zu dem *Conspectus* zu veröffentlichen. Dies scheint aber unterblieben zu sein, wenigstens habe ich keine Spur desselben auffinden können. Manche botanische Notiz aber habe ich noch aus mehreren Briefen Dethardings geschöpft, welche theils an Betcke, theils an G. Brückner gerichtet waren, und die mir von diesen beiden freundlichst zur Benützung mitgetheilt worden sind. Auch mit Mertens in Bremen und mit L. Reichenbach in Dresden stand D. in regem botanischen Verkehr; er sammelte für die von letzterem herausgegebene *Flora exsiccata*, und in Reichen-

bach's Iconographie sind mehrere von D. gelieferte mecklenburgische Pflanzen abgebildet. — Nach ihm trägt die Pflanzengattung *Dethardingia* N. ab Esenb. = *Reinwardtia* Spr. (zu den *Convolvulaceen* gehörig) den Namen. Ueber sein mecklenburgisches Herbarium, welches sich im Besitze des Moskauer Museums befindet, vergl. das *Freimüth. Abendblatt* Nr. 58.

Ditmar L. P. F. Dr. jur. Justizrath und Syndicus in Moskau, wirkte an der dritten Abtheilung von J. Sturm's Flora von Deutschland mit. Er hat das erste Bändchen (oder Heft 1 bis 4, Nürnberg 1817) derselben bearbeitet, welches auf 64 trefflichen Kupfertafeln eben so viele mecklenburgische Pilz-Arten, und darunter sehr viele neue Species, enthält; auch die Tafeln zu Linz's *Observationes etc.* 1809 hat er gezeichnet. Außerdem gab er noch Mittheilungen über Pilze in den *Nützl. Beitr. zu den Strel. Anzeigen* J. 1805 St. 8. 20. 31. 46. J. 1808 St. 50. J. 1809 St. 8 J. 1810 St. 8, und über mecklenb. Algen ebendasselbst J. 1805 St. 20 und J. 1803 St. 50. — Seine für die Landesflora neuen Entdeckungen sind *Polygonum lapathifolium*, *Diatoma tenue*, *Tabellaria flocculosa*, *Calothrix distorta*, *Draparnaldia glomerata*, *Conferva floccosa*, *Spirogyra elongata*, *condensata*, *nitida*, *Zygnema cruciatum*, *Vaucheria bursata*, *hamata*, *geminata*, so wie 97 Pilzarten. — Sprengel benannte die zur Fam. der *Onagreen* gehörige Gattung *Ditmaria* nach ihm, die aber später mit der Gattung *Erisma* Rudge wieder zusammengezogen ist.

* Drewes J. Lehrer an der Realschule in Güstrow, schrieb einen Nachtrag zu *Prahls Index etc.* 1847 als Schulprogramm. Er erwähnt zuerst die wahrscheinlich nur eingeschleppte *Linaria arvensis*.

Ehrenberg C. G. Professor in Berlin, untersuchte Schlamm aus dem Wismarschen Hafen, und machte daraus in den Monatsberichten der Berliner Akademie 1840 und 41 folgende neue Diatomeen bekannt: *Surirella hamella*, *Testudo*; *Synedra Gallionii*; *Ceratonöis Fasciola*, *Closterium*; *Navicula gibba*, *Scalprum*, *Hippocampus*, *inversa*; *Cocconema Boeckii*; *Syncycelia Salpa*; *Campylodiscus Remora*, *Echnöis*; *Cocconöis undulata*, *Navicula*; *Dietyocha Fibula*. — Da ich Ehrenbergs

Arbeit nur aus den Citaten bei Rützing und Rabenhorst kenne, so kann ich für die Vollständigkeit der vorstehenden Angaben nicht bürgen.

* Fiedler B. C. Fr. Dr. med. früher Assistenzarzt auf dem Sachsenberge, jetzt Amtsarzt in Dömitz. Sein Lieblingsstudium sind die Laubmoose und Pilze, über welche er Folgendes veröffentlicht hat: Synopsis Hypnearum Megapol., Rost. 1844. — Synopsis der Laubmoose Mecklenburgs, Rostock 1844. — Drei Lieferungen getrockneter meßb. Laubmoose 1844 ff. — Beiträge zur meßbg. Pilzflora 1848 ff. (4 Liefer. getrockneter Pilze). — Uebersicht der Pilze Mecklenburgs in Archiv IX. S. 12 ff. und XII. S. 48 ff. (noch unvollendet). Fiedler lieferte auch viele neue Beiträge zu unserer Pilzflora in Klotzschii Herbarium vivum mycologicum, curante L. Rabenhorst ed. 1. (20 Centur.) und ed. 2 (1855 ff. bis jetzt 8 Cent.), so wie auch zu den Fungis europ. 1 Cent.). Die darin vorkommenden mecklenburgischen Arten hat er theils selbst schon in der vorhin citirten Abhandlung unseres Archivs namhaft gemacht, die übrigen aber mir handschriftlich mitgetheilt, wodurch unsere Pilzflora abermals eine namhafte, dankenswerthe Bereicherung erfahren hat. Als Entdeckungsjahr aller dieser Fiedlerschen Arten habe ich dasjenige angesetzt, in welchem sie in und für Mecklenburg zuerst publicirt worden sind. — Seine sehr zahlreichen neuen Entdeckungen gehören alle den Kryptogamen an. Es sind: *Phascum curvicollum*; *Barbula gracilis*, *latifolia*; *Dicranum crispum*; *Bryum cernuum*; *Orthotrichum Ludwigii*, *fallax*, *tenellum*, *fastigiatum*, *speciosum*, *coarctatum*, *crispulum*, *stramineum*, *Lyellii*; *Cinclidotus fontinaloides*; *Hypnum glareosum*, *confertum*, *Schleicheri*; *Fissidens incurvus*; *Saprolegnia ferax*; *Palmella cruenta*; *Nitella gracilis*, *mucronata*, *syncarpa*, *tenuissima*; *Chara scoparia*, nebst 360! Pilzarten. — Ihm zu Ehren trägt die Laubmoosgattung *Fiedleria* den Namen, so wie auch *Sporocadus Fiedleri* Rab. und *Sporotrichum Fiedleri* Rab.

Fleischer, über den mir weiter nichts bekannt, entdeckte, wie Rabenhorst angiebt, den Pilz *Agaricus chrysenterus* in Mecklenburg.

Flörke H. G. Dr. geb. den 24. Dec. 1764 zu Alten Kalben und gest. als Professor der Botanik in Rostock am 6. Nov. 1835. Ueber seine Lebensverhältnisse habe ich in Archiv X. S. 90 ff. aus-

fährlicher berichtet. Von seinen Arbeiten bezieht sich nur die *Commentatio de Cladoniis* (Rost. 1828) auf unsere Flora. Föörkes neue Entdeckungen sind: (*Lepidium latifolium*, *Geum intermedium*,) *Primula farinosa*, *Ulmus effusa*, *Poa sudetica*, *Phascum Floerkeanum*, *Peltigera malacea*, *Cladonia papillaria*, *caespiticia*, *decorticata*, *incrassata*, *cervicornis*, *degenerans*, *pyxidata*, *ochrochlora*, *pityrea*, *Floerkeana*, *deformis*, *uncinata*, *squamosa*, *glauc*a, *pungens*, *Arbuscula*, *stellata*. — Nach ihm trägt auch die Gattung *Floerkea* Muehlbg. (zu den *Hydrocharideen* gehörig) den Namen. Seine große Flechtensammlung besitzt die Rostocker Universität.

v. Flotow J. ausgezeichnete Flechtenologe, gest. 1858 als Major a. D. zu Hirschberg in Schlessen, sammelte (wahrscheinlich auf einer Badereise nach Doberan,) folgende für unsere Flora neue Algen: *Anabaina flos aquae*, *Physactis durissima*, *Rivularia pygmaea*. Sie sind publicirt in Rützing Deutschlands Algen, Nordhausen 1845.

(*) Gerdes J. F. früher Rector in Ludwigslust, jetzt in Schwerin, entdeckte *Muscari botryoides*.

Giesebrecht Ad. früher Seminardirector in Mirow und gest. 1856 in Königsberg, entdeckte zuerst die *Polygala amara* und *Ajuga pyramidalis* bei Mirow.

* Griewank C. geb. zu Conow unweit Ludwigslust, war an letzterem Orte 1820–24 Collaborator und 1824–29 Inspector am Landschullehrer-Seminar, wurde im J. 1829 Prediger zu Daffow und 1856 Präpositus des Rülziger Cirkels. Er schrieb: Zur Pflanzenkunde Mecklenburgs (in Freimüth. Abtbl. 1839. Beil. zu Nr. 1084); Verzeichniß der im Rülziger Ort vorkommenden seltneren Pflanzen Mecklenburgs (1847, Archiv I. S. 18 ff. vergl. auch die Botan. Zeitg. 1847, S. 449–455); über *Lepturus incurvatus* Trin. auf dem Prival (1851, Archiv V. S. 159 ff.); Nachtrag zu den Pflanzen des Rülziger Orts (1854, Archiv VIII. S. 178 ff.); über *Senecio nemorensis* und *saracenicus* (1854, ebendas. S. 185). — An neuen Pflanzen entdeckte er: *Barbarea* (*arcuata*), *stricta*, *praecox*; *Cochlearia Linnaei* (*offic.* und *anglica*); *Malva moschata*, *Hypericum hirsutum*, *Rubus rudis*, *Potentilla sterilis*, *Cnidium venosum*, *Senecio nemorensis*, *Cuscuta monogyna*, (*Veronica opaca*, *Euphrasia verna*),

Mentha nepetoides), *Leonurus Marrubiastrum*, *Salix acutifolia*, *Ruppia maritima*, (*Zannichellia pedicellata*), *Orchis laxiflora*, *Carex strigosa*, *Hornschuchiana*, *Gaudinia fragilis*, *Lepturus incurvatus*, *Himanthalia lorea*. — Meine vorliegende Arbeit hat er auf das dankenswertheste dadurch unterstützt, daß er mir für den phanerogamischen Theil der nachfolgenden Floren-Übersicht aus dem reichen Schatze seiner Beobachtungen zahlreiche interessante Bemerkungen mitgetheilt hat.

Griewank G. Dr. med. Sohn des Vorigenannten, Assistenzarzt auf dem Sachsenberge, schrieb: Kritische Studien zur Flora Mecklenburgs, Rostock 1856, als Inaugural-Dissertation.

* Häcker R. Provisor in Lübeck und Verfasser der Flora von Lübeck, entdeckte in Meckbg. *Hypnum undulatum* und *silesiacum* (s. Rabenhorst deutsch. Kryptog.-Flora).

Hahn C. Dr. phil. früher Subrector in Güstrow, gest. vor etwa fünf und zwanzig Jahren als Rector in Friedland, entdeckte im südwestlichen M. *Hypericum pulchrum*, *Eryngium campestre* und *Euphorbia Esula*; (s. Mühl. Beitr. zu den Strel. Anzeigen 1809 St. 8).

(*) Huth C. früher Privatlehrer in Ludwigslust, dann Rector in Rastow und endlich Prediger in Günein, wo er am 28. Aug. 1859 an der Cholera starb, entdeckte *Lunularia vulgaris*, *Ectocarpus ochraceus*, *Nemalion multifidum*, *Phyllophora membranifolia*, *Brodiaei*, *Polysiphonia allochroa*, *Phycodrys sinuosa*, *Stilephora rhizoides*, *Laminaria digitata*.

Rahle, Apotheker in Hagenow, entdeckte *Conferva sericea* als neuen Beitrag zur Flora.

v. Kamptz G. E. geb. am 19. Mai 1763 zu Al. Plassen und gest. am 13. Aug. 1823 als Oberhauptmann in Mirow, über welchen ich in Archiv VIII. S. 148 schon etwas ausführlicher berichtet habe, bereicherte die Landesflora durch Entdeckung von *Astragalus arenarius*, *Linnaea borealis*, (*Anagallis coerulea*), *Blechnum Spicant* und *Depazea Linnaeae*. Vergl. Mühl. Beitr. zu den Strel. Anz. 1806 St. 37 und 46. — Nach ihm (?) benannte C. G. Nees v. Esenbeck eine Myrtaceengattung *Kamptzia*, die aber hernach in der

Gattung *Syncarpia* Ten. wieder aufgegangen ist (C. G. Nees ab Esenbeck de *Kamptzia*, novo *Myrtacearum* genere, Bonn ap. Weber 1841).

* Knochenhauer W. in den J. 1833 und 34 Subrector in Neubrandenburg, dann einige Jahre Lehrer in Neustrelitz, und jetzt Director der Realschule in Meiningen, war der erste Finder von *Potentilla supina*.

* Koch F. Salinenbeamter in Sülz entdeckte zuerst die *Viola epipsila*.

* Koch F. (Bruder des vorigen), Baumeister, früher in Lübbtheen und Dömitz, jetzt in Dargun, fand zuerst den *Agaricus tigrinus*.

Landt, früher in Mirow, war der Entdecker der *Utricularia neglecta* (und des *Erodium moschatum*).

* Langmann J. Lehrer an der Realschule in Neustrelitz, schrieb: *Flora der beiden Großherzogthümer Mecklenburg, Neustrelitz* 1841. Nachtrag dazu im Archiv 1850, IV. S. 145 ff. — *Flora von Nord- und Mitteldeutschland mit besonderer Berücksichtigung der beiden Großherzogthümer Meckbg., Neustrelitz* 1856. Er nennt zuerst (*Cerastium brachypetalum*, *Galeopsis pubescens*, *Hieracium vulgatum*, *Koeleria glauca*), *Melilotus officinalis* und *Potamogeton densus*.

* Lehmeier, Hofgärtner in Schwerin, ist der Entdecker des *Agaricus cepaestipes*.

Linck H. F. Dr. in den J. 1792 bis 1811 Professor in Rostock, gest. am 1. Jan. 1851 als Prof. in Berlin, über dessen Leben ich schon in Archiv V. S. 217 ff. ausführlichere Notizen gegeben habe. Unter seinen zahlreichen Schriften enthalten folgende auf unsere Flora Bezügliches: *Dissert. bot. et primitiae Florae Rostochiensis*, Suerin 1795. 4., worin auch eine Anzahl von Kryptogamen aufgeführt ist, deren Entwähsehung mir aber nicht überall hat gelingen wollen. — Ferner: *Observationes in Ordines plantarum naturales*, dissert. I und II in dem Magazin der Gesell. naturf. Freunde in Berlin 1809 und 1813, Pilze enthaltend, von denen die in der noch zu Rostock geschriebenen disser. I. erwähnten fast sämmtlich zu den mecklenburgischen gehören. Unbekannt ist mir leider seine Gratulationschrift zum

50jährigen Doctorjubiläum des Prof. J. W. Josephi zu Rostock geblieben, welche den Titel führt de antiquitatibus botanicis Rostochiensibus (Berlin 1835. 1 Bog. 4.). — Kleinere Mittheilungen von ihm sind abgedruckt in den Müll. Beitr. u. s. w. 1806, 20. 31. 46. 1808, 50. 1810, 8. 1811, 7. — Außerdem existirt von ihm noch handschriftlich eine „Uebersicht der meßlb. Flora,“ von welcher sich ein von Detharding an Dr. Betke mitgetheiltes Auszug in unserer Vereinsbibliothek befindet. Es werden darin nur die Dicotyledonen (721 Arten) aufgezählt, da die weitere Arbeit wahrscheinlich durch Links Weggang von Rostock unterbrochen wurde; verfaßt ist sie nach dem Aug. 1810, da die Beobachtungen, welche Link in jenem Monate auf einer Excursion nach Räteburg machte, darin schon benutzt sind. Sie enthält einige interessante kritische Bemerkungen, und ist nach dem natürlichen Systeme geordnet, — der erste derartige Versuch in Mecklenburg. Die Pflanzen, durch welche Link unsere Landesflora bereicherte, sind: *Ranunculus hederaceus*, *divaricatus*, *fluitans*, *rep-tans*, (*Cardamine sylvatica*), *Sinapis alba*, *Elatine Hydropiper* und *Alsinastrium*, *Genista anglica*, *Trifolium striatum*, *filiforme*, *Vicia cassubica*, *Callitriche autumnalis*, *Sedum boloniense*, *Galium saxatile*, *Gnaphalium luteo-album*, *Sonchus palustris*, *Crepis virens*, *Campanula Rapunculus*, *Pyrola chloranta*, *Erythraea linariaefolia*, *ramosissima*, *Myosotis intermedia*, *Lamium maculatum*, *Obione pedunculata*, *Taxus baccata*, *Allium oleraceum*, *Juncus maritimus*, *Carex riparia*, *Glyceria maritima*, *Triticum caninum*. — *Cylindrospermum spirale*, *Oscillaria viridis*, *princeps*, *Sphaeroplea annulina*, *Oedogonium vesicatum*, *tumidulum*, *Conferva fracta*, *laetevirens*, *Spirogyra quinina*, *decimina*, *Zygnema ericetorum*, *Vaucheria Dillwynii*, *Ceramium rubrum*, *Polysiphonia violacea*, *Sphaerococcus confervoides*, so wie an Pilzen 92 Arten. — Nach ihm trägt die zur Familie der Nostochinae gehörige Gattung *Linkia* Lyngb. den Namen.

Meyer C. F. früher Rector in Ludwigslust, später Schurath in Schwerin, gest. 1850?, machte im J. 1836 in No. 910 und 918 des Freimüth. Abendbl. ein Verzeichniß seltener Pflanzen aus der Umgegend von Schwerin bekannt.² Er war der Entdecker von (*Viola*

laetea), *Cucubalus baccifer*, *Orobanche rubens*, *Polycnemum arvense* und *Epipogon aphyllum*.

Neuenborf H. in Rostock, über dessen Lebensverhältnisse mir nichts weiter bekannt ist, als daß er mit Detharding in enger botanischer Verbindung stand, entdeckte *Calamagrostis Halleriana* und *Carex Davalliana*.

* Nolte G. F. Dr. Professor der Botanik in Kiel, und Verfasser der *Novitiae Florae Holsaticae*, durchstreifte Mecklenburg auf mehreren Excursionen in den J. 1820–23, worüber er in der Vorrede zu seinen *Novitiis* berichtet, und entdeckte an neuen Pflanzen *Helosciadium repens*, *Carduus acanthoides* und *Lobelia Dortmanna*.

v. Dertgen C. Landrath auf Brunn unweit Neu-Brandenburg, gest. 1837, früher ein sehr eifriger Botaniker, bis dies Studium bei ihm gegen das der Lepidopterologie mehr in den Hintergrund trat, entdeckte zuerst die *Ophrys muscifera*.

Prahl J. F. geboren im Lauenburgischen, früher Lehrer in Gilsstrow und jetzt Prediger zu Hohen-Horn im Herzogthum Lauenburg, schrieb 1837 einen *Index plantarum quae circa Güstroviam sponte nascuntur Phanerogamarum* (Gilsstrow bei Ditz), worin zum ersten Male als Bürger unserer Flora auftraten: *Rubus glandulosus*, *Potentilla verna*, *Orchis incarnata*, *Leersia oryzoides*, *Festuca sylvatica*, *Elymus europaeus*; (auch *Solanum humile*, *Centaurea solstitialis*, *Alopecurus nigricans* und *Avena flavescens* werden hier zum ersten Male erwähnt).

Rabenhorst L. Dr. Prof. in Dresden, erwähnt 1845 in seiner *Kryptogamenflora Deutschlands* an neuen mecklenb. Pflanzen, deren Entdecker er jedoch nicht namhaft macht: *Bacillaria paradoxa*, *Suriella thermalis* und *Aegagropila Linnaei*.

Ramelow, Pharmaceut, entdeckte im J. 1845 (wie G. Griewant angiebt,) *Myriophyllum alterniflorum*.

Richter, Sanitätsrath in Boizenburg, ist der Entdecker des *Chrysosplenium oppositifolium* (und der *Anemone pratensis* var. *viridiflora*).

Röper J. früher Prof. in Basel, seit 1838 Prof. der Botanik in Rostock, schrieb: *Uebersicht der Gräser Mecklenburgs* 1840. 4to

(auch im mecklenb. Quart-Kalender 1841 und 42 abgedruckt). — Zur Flora Mecklenburgs I. Theil (die Farne, Rostock 1843. 8vo. II. Theil (die Gräser) 1844. — Nachträge und Berichtigungen zur mecklb. Flora, in der bot. Zeitung 1846 S. 161 ff. — Beitr. zur mecklenbg. Flora, im Tageblatt der XXVII. Versammlung deut. Naturforscher u. s. w. 1850 S. 50. — Beitr. zur Naturgeschichte der Ophioglosseae, in der botanischen Zeitung 1859 No. 1. 2. 28 — 31. 37. — Seine neuen Entdeckungen sind: *Gagea minima*, *Scirpus parvulus*, *Carex extensa*, (*Arundo littorea*), *Equisetum Telmateja*, *Botrychium matricariaefolium* und *simplex*, *Aspidium aculeatum*; (vergl. auch *Fumaria micrantha*, *Sclerochloa procumbens*, *Festuca loliacea*, *Triticum glaucum* und *Lolium italicum*). — Nach ihm trägt die zur Familie der Sapindaceen gehörige Gattung *Roepera* Juss. fil. ihren Namen.

Rose (mir unbekannt) entdeckte (wie Rabenhorst angiebt,) *Merisopoedia glauca*.

(*) Schmidt A. Plantagen-Director in Ludwigslust, entdeckte *Oenothera muricata*, *Senecio paludosus*, *Petasites tomentosus*, (*Helianthus tuberosus*), *Jurinea cyanoides*, *Digitalis ambigua*, *Mentha Pulegium*, *Allium acutangulum* und *Bromus inermis*. — Er veröffentlichte: „Bemerkungen auf einer Reise nach St. Petersburg besonders in Hinsicht der Landwirthschaft und Gartenkunde“, — in den Neuen Annalen der mecklb. Landwirth. Gesell. St. 39–43. 1814.

v Schreber, weiland Prof. in Bützow, entdeckte *Helosciadium repens*.

(*) Schreiber H. Apotheker in Grabow, gest. 1853, schrieb: Flora der Umgegend von Grabow und Ludwigslust, im Archiv VII. S. 200 ff. J. 1853; darin wird *Polemonium coeruleum* zuerst als einheimische Pflanze erwähnt.

Schultz C. F. Dr. med. und Hofrath, geb. 1765 zu Stargard, widmete sich anfänglich der Pharmacie, studirte darauf Medicin, lebte dann und starb als practischer Arzt in Neu-Brandenburg am 27. Juni 1837. — Er war nicht bloß ein sehr gelehrter Arzt, sondern auch ein tüchtiger Botaniker, der besonders das Studium der Laub- und Lebermoose eifrig betrieb. In seinen letzten Lebensjahren beschäftigte er

sich auch mit astronomischen Forschungen. Nachdem er 10 Jahre lang auf seinen ärztlichen Reisen M. Strelitz nach vielen Richtungen hin botanisch erforscht hatte, gab er im J. 1806 seinen *Prodromus Florae Stargardiensis* heraus, in welchem 779 Phanerogamen und 721 Kryptogamen beschrieben werden, wodurch die gesammte mecklenburgische Flora, die damals schon 1241 Arten zählte, abermals einen neuen Zuwachs von etwa 300 Species erhielt, von denen 221 allein auf die Klasse der Pilze kamen. Diesem *Prodromus* folgte im J. 1819 noch ein *Supplementum primum*, — das *Sup. secundum*, dessen Ausarbeitung für den schon schwer erkrankten Verfasser der Prof. Dr. A. Grisebach in Göttingen übernahm, wurde nicht mehr gedruckt, weil Schulz bald nach Vollendung des Manuscripts (von welchem ich eine Abschrift besitze,) aus diesem Leben abberufen wurde. — Andere, nicht speciell auf Mecklenburg bezügliche botanische Schriften von ihm sind: de *Barbula et Syntrichia* (1823 in den *Actis acad. Caes. Leopold* vol. XI. pars 1); eine Abhandlung über *Barbula* in der *Sylloge Ratisbon.* 1824 vol. I. p. 34 ff. und bryologische Beobachtungen ebenda selbst 1828 Bd. II. S. 119 ff. 177 ff.

Schulz stand mit vielen berühmten Botanikern in Verbindung und Tauschverkehr; auch bezog er jährlich Sämereien aus dem botanischen Garten in Berlin, von denen er die im Freien ausdauernden selbst im Garten cultivirte, diejenigen aber, welche mehr Wärme beanspruchten, seinem Freunde, dem Prediger Hennings in Eichhorst übergab, der sich mit der Zucht von Treibhauspflanzen beschäftigte. Auf diese Weise brachte er ein sehr ansehnliches Herbarium von etwa 20,000 Arten zusammen, von denen aber sein mecklenburgisches Herbarium, die Belege zu seinem *Prodromus* enthaltend, streng getrennt blieb. Diese beiden Herbarien kamen durch seine testamentarische Verfügung an die Rostocker Universität, seine werthvolle Bibliothek wurde in öffentlicher Auction um Spottpreise verschleudert. — Seine Verdienste um die Botanik wurden dadurch geehrt, daß er von mehreren gelehrten Gesellschaften zum Mitgliede erwählt wurde, und daß C. Sprengel die Umbelliferengattung *Schultzia* nach ihm benannte; auch die *Jungermannia Schultzii* trägt seinen Namen. — Mich selbst knüpfte ein näheres Interesse an den Dahingegangenen, indem er,

nebst G. Brückner und W. Knochenhauer, zuerst in mir die Liebe zur Botanik weckte und meine ersten Studien darin auch gelegentlich leitete.

Die Pflanzenarten, durch welche Schulz unsere Flora vermehrte, und unter denen manche von ihm überhaupt zuerst determinirte Species sich befinden, sind folgende: *Nasturtium palustre*, *Arabis hirsuta*, (*Viola persicifolia*), *Drosera intermedia*, *Alsine tenuifolia*, *Stellaria glauca*, *Rubus thyrsoides*, *fruticosus*, *Ceratophyllum submersum*, *Valerianella carinata*, *Scabiosa suaveolens*, (*Lappa tomentosa*), *Hieracium pratense*, *Campanula bononiensis*, *latifolia*, *Cervicaria*, *Myosotis (caespitosa)*, *stricta*, *sparsiflora*, *Verbascum Phlomoidees*, (*Moenchii*, *collinum*, *Schottianum*, *Veronica polita*), *Orobanche ramosa*, (*Polygonum minus*, *Salix cuspidata*), *Potamogeton obtusifolius*, *filiformis*, *Ornithogalum nutans*, *Schoenus ferrugineus*, *Eriophorum gracile*, *Carex stellulata*, *canescens*, *stricta*, *pilulifera*, *ampullacea*, *paludosa*, *filiformis*, *Poa bulbosa*.

Equisetum pratense, *Asplenium Breynii*, septentrionale.—*Sphagnum subsecundum*, *Physcomitrium sphaericum*; *Phascum patens*, *bryoides*, *crispum*; *Pottia minutula*; *Barbula Hornschuchiana*, *brevicaulis*; *Trichostomum homomallum*; *Gymnostomum rutilans*; *Didymodon longirostris*, *capillaceus*; *Ceratodon cylindricus*; *Dicranum strumiferum*, *Schreberi*, *rufescens*, *subulatum*, *majus*; *Bryum strictum*, *intermedium*, *bimum*, *Duvalii*, *erythrocarpon*; *Meesia Albertini*, *tristicha*; *Bartramia ithyphylla*; *Grimmia trichophylla*; *Racomitrium ericoides*; *Orthotrichum cupulatum*, *affine*; *Eucalypta streptocarpa*; *Polytrichum angustatum*, *gracile*, *formosum*; *Fontinalis squamosa*; *Neckera pinnata*; *Leskea subtilis*; *Hypnum albicans*, *plumosum*, *trifarium*, *myosuroides*, *alopecurum*, *chrysophyllum*, *fluviale*, *uncinatum*, *lycopodioides*.

Riccia natans, *ciliata*, *Rebouillia hemisphaerica*; *Lejeunia serpyllifolia*; *Mastigobryum trilobatum*; *Chiloscyphus polyanthos*, *pallescens*; *Lophoclea heterophylla*; *Sphagnocoetis communis*; *Jungermannia setacea*, *connivens*, *divaricata*, *barbata*, *excisa*, *inflata*, *Schultzii*, *exsecta*; *Scapania nemorosa*, *uliginosa*, *undulata*; *Alicularia scalaris*; *Sarcoscyphus Ehrharti*.

Microcoleus autumnalis; *Chara latifolia*.

Verrucaria epidermidis, *carpinea*, *punctiformis*; *Pertusaria Wulfenii*; *Opegrapha herpetica*, *atra*, *varia*; *Urceolaria cinerea*, *scruposa*; *Placodium lentigerum*, *saxicola*, *elegans*, *murorum*; *Zeora brunnea*, *glaucoma*, *icmadophila*, *cerina*; *Lecanora atra*, *sophodes*, *varia*, *albella*, *Hageni*; *Imbricaria tiliacea*, *physodes*, *Acetabulum*; *Parmelia obscura*, *caesia*; *Sticta scrobiculata*; *Peltigera polydactyla*; *Calycium chlorellum*; *hyperellum*; *Lecidea citrinella*, *albo-atra*, *dolosa*, *parasema*; *Biatora uliginosa*, *microphylla*, *anomala*, *rubella*, *rosella*, *byssoides*; *Cladonia delicata*, *cariosa*, *botrytes*, *alcicornis*, *gracilis*, *fimbriata*, *macilenta*, *furcata*; *Cetraria saepincola*; *Evernia furfuracea*; *Ramalina pollinaria*. — Die Classe der Pilze vermehrte er durch 221 neue Arten.

Schulz L. E. F. Dr. med. wurde etwa um das J. 1754 zu Friedland geboren, studierte Medicin zu Frankfurt an d. Oder, ließ sich dann als practischer Arzt in seiner Vaterstadt nieder, wo er, wahrscheinlich noch vor Ablauf des vorigen Jahrhunderts, — die näheren Data über seine Lebensverhältnisse fehlen mir, — gestorben ist. Als Inaugural-Dissertation schrieb er im J. 1777 eine kleine Abhandlung „de singularibus quibusdam morborum curationibus,“ worin er als solche merkwürdige Curmethoden bespricht: 1. die Heilung mancher Krankheiten durch Musik, 2. durch Musik und Tanz, 3. durch Electricität und Magnetismus, und 4. endlich, durch Ohrfeigen und Stockprügel, — die allerdings in manchen Fällen gar nicht übel angebracht sein mögen! — Diese Dissertation würde schwerlich der Vergessenheit entgangen sein, wenn sie nicht auf den letzten acht Seiten noch einen Anhang enthielte, welcher die Ueberschrift führt: „Enumeratio systematica stirpium per ducatum Megapolitano-Strelitzensem observatarum,“ denn durch diesen so bescheiden auftretenden Anhang ist Schulz der Begründer der wissenschaftlichen Botanik in Mecklenburg geworden. Hier begegnen wir nämlich nicht allein zum ersten Male den Linne'schen Pflanzennamen und dessen Systeme in Mecklenburg, sondern es ist dies überhaupt auch der erste Versuch eine Uebersicht der vaterländischen Flora herzustellen. Das Jahr 1777 ist also das Geburtsjahr unserer mecklenburgischen Flora! Leider giebt

Schulz keine Standorte an, sondern nur die Namen von 483 Pflanzenarten, nach dem Sexualsystem geordnet; 435 Species gehören den Phanerogamen an, 48 den Kryptogamen. Sie sind mit wenigen Ausnahmen durch spätere Forschungen als Bürger unserer Strelitzschen Flora bestätigt worden, so daß aus dieser Arbeit sogleich eine brauchbare Grundlage von 444 Pflanzenarten für unsere Flora hervorging.

Es sind dies nämlich folgende Species: *Anemone Hepatica*, *nemorosa*, *ranunculoides*; *Myosurus minimus*; *Ranunculus aquatilis*, *Flammula*, *Lingua*, *auricomus*, *repens*, *bulbosus*, *arvensis*, *sceleratus*, *Ficaria*; *Caltha palustris*; *Trollius europaeus*; *Delphinium Consolida*; *Nymphaea alba*; *Nuphar luteum*; *Papaver Argemone*, *Rhoeas*, *dubium*; *Chelidonium majus*; *Fumaria officinalis*; *Nasturtium officinale*, *amphibium*; *Barbarea vulgaris*; *Turritis glabra*; *Cardamine pratensis*; *Sisymbrium officinale*, *Sophia*; *Alliaria officinalis*; *Sinapis arvensis*; *Alyssum incanum*; *Draba verna*; *Cochlearia Armoracia*; *Camelina sativa*; *Thlaspi arvense*; *Teesdalea nudicaulis*; *Capsella bursa pastoris*; *Raphanus Raphanistrum*; *Helianthemum vulgare*; *Viola palustris*, *odorata*, *sylvestris*, *tricolor*; *Reseda luteola*; *Drosera rotundifolia*, *anglica*; *Parnassia palustris*; *Polygala vulgaris*; *Dianthus deltoides*; *Saponaria officinalis*; *Silene inflata*, *nutans*; *Lychnis flos cuculi*; *Agrostemma Githago*; *Sagina procumbens*, *nodosa*; *Spergula arvensis*; *Spergularia rubra*; *Holosteum umbellatum*; *Stellaria nemorum*, *media*, *Holostea*, *graminea*; *Malachium aquaticum*; *Cerastium glomeratum*, *arvense*; *Linum catharticum*; *Malva sylvestris*, *neglecta*; *Tilia platyphyllos*; *Hypericum perforatum*, *humifusum*, *quadrangulum*; *Acer pseudo-platanus*; *Geranium pusillum*, *molle*, *Robertianum*; *Erodium cicutarium*; *Oxalis acetosella*; *Evonymus europaeus*; *Rhamnus cathartica*, *Frangula*; *Sarothamnus scoparius*; *Genista tinctoria*; *Ononis spinosa*; *Anthyllis Vulneraria*; *Medicago lupulina*; *Melilotus macrorrhiza*; *Trifolium pratense*, *arvense*, *repens*, *agrarium*; *Lotus corniculatus*; *Astragalus glycyphyllos*; *Ornithopus perpusillus*; *Vicia dumetorum*, *Cracca*; *Lathyrus pratensis*, *montanus*; *Prunus spinosa*, *Padus*; *Spiraea Ulmaria*, *Filipendula* *Geum urbanum*, *rivale*; *Rubus Idaeus*, *cae-*

sus; *Fragaria vesca*; *Agrimonia Eupatoria*; *Rosa canina*, tomentosa; *Comarum palustre*; *Potentilla anserina*, argentea, reptans, *Tormentilla*; *Crataegus Oxyacantha*; *Pyrus communis*, *Malus*; *Sorbus Aucuparia*; *Epilobium hirsutum*, montanum, palustre; *Circaea lutetiana*; *Myriophyllum spicatum*; *Hippuris vulgaris*; *Callitriche verna*; *Lythrum Salicaria*; *Bryonia alba*; *Herniaria glabra*; *Scleranthus annuus*; *Sedum acre*, reflexum; *Ribes nigrum*; *Saxifraga Hirculus*, tridactylites, granulata; *Chrysosplenium alternifolium*; *Hydrocotyle vulgare*; *Sanicula europaea*; *Cicuta virosa*; *Aegopodium Podagraria*; *Carum Carvi*; *Pimpinella Saxifraga*; *Sium latifolium*; *Oenanthe fistulosa*, *Phellandrium*; *Aethusa Cynapium*; *Angelica sylvestris*; *Thysselinum palustre*; *Heracleum Sphondylium*; *Daucus Carota*; *Anthriscus sylvestris*; *Conium maculatum*; *Hedera Helix*; *Viscum album*; *Sambucus nigra*; *Viburnum Opulus*; *Lonicera Periclymenum*, *Xylosteum*; *Asperula odorata*; *Galium Aparine*, uliginosum, palustre, verum; *Valeriana officinalis*, dioica; *Valerianella olitoria*; *Knautia arvensis*; *Succisa pratensis*; *Eupatorium cannabinum*; *Tussilago Farfara*; *Petasites officinalis*; *Bellis perennis*; *Erigeron acer*; *Solidago Virga aurea*; *Inula Helenium*; *Pulicaria vulgaris*; *Bidens tripartita*; *Filago germanica*, arvensis; *Gnaphalium sylvaticum*, uliginosum, dioicum; *Artemisia Absinthium*, campestris, vulgaris; *Tanacetum vulgare*; *Achillea Millefolium*; *Anthemis arvensis*; *Matricaria Chamomilla*; *Chrysanthemum Parthenium*, segetum; *Senecio palustris*, vulgaris; *Cirsium lanceolatum*, palustre, acaule, oleraceum, arvense; *Carduus crispus*; *Lappa vulgaris*, *Carlina vulgaris*, *Serratula tinctoria*, *Centaurea Cyanus*, *Scabiosa*; *Lampsana communis*; *Cichorium Intybus*; *Leontodon autumnalis*, hastilis; *Tragopogon pratensis*; *Hypochoeris radicata*; *Taraxacum officinale*; *Lactuca muralis*; *Sonchus oleraceus*, arvensis; *Hieracium Pilosella*, murorum; *Jasione montana*; *Campanula rotundifolia*, patula, rapunculoides, *Trachelium*, glomerata; *Vaccinium Myrtillus*, uliginosum, *Oxycoccus*; *Andromeda polifolia*; *Calluna vulgaris*; *Ledum palustre*; *Pyrola rotundifolia*; *Fraxinus excelsior*; *Cynanchum Vincetoxicum*; *Menyanthes trifoliata*; *Gentiana cam-*

pestrus; *Erythraea Centaurium*; *Convolvulus sepium*, *arvensis*;
Cuscuta europaea; *Asperugo procumbens*; *Cynoglossum officinale*;
Anchusa officinalis, *arvensis*; *Symphytum officinale*; *Echium vul-*
gare; *Pulmonaria officinalis*; *Lithospermum officinale*, *arvense*; *My-*
osotis palustris; *Solanum nigrum*, *Dulcamara*; *Hyoscyamus niger*,
Datura Stramonium; *Verbascum Thapsus*, *nigrum*; *Scrophularia no-*
dosa; *Linaria vulgaris*; *Veronica Beccabunga*, *Chamaedrys*, *officina-*
lis, *serpyllifolia*, *arvensis*, *verna*, *triphyllos*, *agrestis*, *hederaefolia*; *Me-*
lampyrum arvense, *nemorosum*, *pratense*; *Pedicularis sylvatica*, *palu-*
stris; *Rhinanthus major*; *Euphrasia officinalis*; *Odontites rubra*;
Lathraea Squamaria; *Mentha aquatica*, *arvensis*; *Lycopus euro-*
paeus; *Origanum vulgare*; *Thymus Serpyllum*; *Calamintha Aci-*
nos; *Clinopodium vulgare*; *Nepeta Cataria*; *Glechoma hederacea*;
Lamium amplexicaule, *purpureum*, *album*; *Galeobdolon luteum*;
Galeopsis Ladanum, *Tetrahit*; *Stachys sylvatica*; *Betonica officinalis*;
Marrubium vulgare; *Ballota nigra*; *Leonurus Cardiaca*; *Scutellaria*
galericulata; *Prunella vulgaris*; *Ajuga reptans*, *genevensis*; *Teu-*
crium Scordium; *Verbena officinalis*; *Pinguicula vulgaris*; *Utricula-*
ria vulgaris, *minor*; *Lysimachia vulgaris*, *Nummularia*; *Anagallis*
arvensis; *Primula officinalis*; *Hottonia palustris*; *Statice Armeria*;
Chenopodium album; *Blitum bonus Henricus*, *rubrum*; *Atriplex*
angustifolium, *latifolium*; *Rumex conglomeratus*, *crispus*, *aquati-*
cus, *Acetosa*, *Acetosella*; *Polygonum amphibium*, *Persicaria*, *avi-*
culare, *Convolvulus*; *Euphorbia helioscopia*, *palustris*, *Peplus*;
Mercurialis perennis; *Urtica urens*, *dioica*; *Parietaria officinalis*;
Humulus Lupulus; *Ulmus campestris*; *Fagus sylvatica*; *Quercus*
Robur; *Corylus Avellana*; *Carpinus Betulus*; *Salix pentandra*,
fragilis, *repens*; *Populus tremula*; *Betula alba*; *Alnus glu-*
tinosa; *Juniperus communis*; *Pinus sylvestris*; *Stratiotes*
aloides; *Hydrocharis Morsus ranae*; *Alisma Plantago*; *Sagittaria*
sagittaeifolia; *Butomus umbellatus*; *Triglochin palustre*; *Potamo-*
geton gramineus, *crispus*, *pusillus*; *Lemna trisulca*, *minor*; *Typha*
latifolia; *Sparganium simplex*; *Acorus Calamus*; *Orchis militaris*,
Morio, *maculata*, *latifolia*; *Epipactis Helleborine*, *palustris*; *Ne-*
ottia Nidus avis; *Iris Pseud-Acorus*; *Paris quadrifolia*; *Convalla-*

ria multiflora, majalis; Smilacina bifolia; Gagea pratensis; Juncus communis; articulatus, bufonius; Luzula pilosa, campestris; Heleocharis palustris; Scirpus caespitosus, sylvaticus; Eriophorum vaginatum, latifolium; Carex arenaria, vulpina, vulgaris, acuta, panicea; Panicum Crus galli; Phalaris arundinacea; Anthoxanthum odoratum; Alopecurus pratensis, geniculatus; Phleum pratense; Agrostis vulgaris, Spica venti; Milium effusum; Phragmites communis; Aira flexuosa; Holcus lanatus; Avena pratensis; Briza media; Glyceria fluitans, aquatica; Molinia coerulea, Dactylis glomerata; Cynosurus cristatus; Festuca ovina, elatior; Bromus secalinus, arvensis, tectorum; Triticum repens; Hordeum murinum; Lolium perenne, temulentum.

Equisetum arvense, sylvaticum, hiemale; Lycopodium clavatum; Botrychium Lunaria; Polypodium vulgare; Polystichum F. mas; Cystopteris fragilis; Asplenium F. femina, Ruta muraria; Pteris aquilina. — Sphagnum cymbifolium; Funaria hygrometrica; Barbula muralis, ruralis; Polytrichum commune; Leskea complanata, sericea; Dicranum scoparium; Bryum pyriforme; Hypnum tamariscinum, splendens. — Marchantia polymorpha, Radula complanata. — Morchella esculenta, Helvella lacunosa und Peziza leporina.

Außerdem führt Schulz noch 16 Flechten, 2 Algen und 3 Pilze auf, die sich nicht mehr gut enträthseln lassen. — Ausgeschlossen habe ich von dieser Aufzählung: Ligustrum vulgare, Sempervivum tectorum, Brassica campestris und nigra, Lactuca virosa und Populus alba, da ihnen das Bürgerrecht nicht gebührt. Ganz zu streichen sind: Primula elatior, Lysimachia nemorum, Laserpitium latifolium, Erica Tetralix, Rosa spinosa, Potentilla arvensis (?), Thalictrum flavum, Melampyrum sylvaticum und Lepidium ruderales, da sie in M. Strelitz nicht wachsen; was Rubus fruticosus sei, ist nicht mehr zu ermitteln, Sedum sexangulare gehört zu acre, und sein Ranunculus reptans zu Flammula.

* Siemerling B. Dr. Apotheker zu Neubrandenburg, entdeckte den Polyporus nigricans.

Siemssen N. C. Dr. phil. geb. zu Altstrelitz den 2. Mai

1768, gest. als Privatdocent zu Rostock am 17. Juni 1833, hat sich um mehrere Zweige der vaterländischen Naturkunde bleibende Verdienste erworben, worüber ich schon in Archiv X S. 110 ff. berichtet habe. In der Botanik aber sind seine Leistungen am wenigsten erheblich, indem sich dieselben nur auf einige Mittheilungen in den Müll. Beiträgen u. s. w. (1806, 46. 1808, 50. 1811, 7) beschränken, so wie auf die Entdeckung folgender, früher in M. noch nicht beachteter Pflanzen: *Rubus saxatilis*, *Ribes alpinum*, *Artemisia maritima*, *Cuscuta Epithymum*, *Uredo Circaeae*, *Aecidium Sweetiae*, *Puccinia Acerum*, *Collarium nigrospermum*, *Sporotrichum vitellinum*.

* Struß C. Lehrer in Dargun, entdeckte *Gümbelia crinita*.

Thede J. C. geb. den 29. März 1764 zu Grabow, seit 1803 Lehrer und seit 1827 Schulrath in Parchim, gest. den 15. April 1831 (s. den Nekrolog im Freim. Abbl. Nr. 669), gab botanische Mittheilungen in den Müll. Beitr. u. s. w. 1806, 8 und 20; 1808, 50, und bereicherte die Flora durch *Thlaspi campestre*, *Geranium pratense*, *Potentilla procumbens*, (*Alchemilla montana*, *Scandix Pecten*), *Senecio campestris*, *Antirrhinum Orontium*, *Linaria Elatine*, *Veronica montana*, *Galeopsis ochroleuca*, *Thesium montanum*, *Potamogeton praelongus*, *Cephalantera rubra*, *Liparis Loeselii*, *Gagea spathacea*, *Rhynchospora fusca*, *Polypodium Phegopteris*, *Zeora rubra*, *Lecidea abietina*, *Cetraria pinastri*, *Mitruha cucullata*, *Peziza Pteridis* (?), *Polystigma Pteridis*, *Sphaeria tessellata*, *Licea variabilis*.

Timm J. Ch. geb. am 7. Dec. 1734 in dem hinterpommerschen Städtchen Wangerin, widmete sich der Pharmacie, lernte in Anclam, conditionirte hernach dort, so wie auch in Bergen und Rostock, und ward Martini 1760 Apotheker in Malchin, wo er hernach auch das Bürgermeisteramt bekleidete und im J. 1805 starb. Vorzüglich durch J. Hedwig angeregt und bei seinen Forschungen unterstützt, durchstreifte er auf zahlreichen Excursionen die schöne und fruchtbare Umgegend seines Wohnortes, und besuchte auch mehrere Male die Ostseeküste, um die Seestrands- und Meeresflora kennen zu lernen. Als ein sehr nützlicher Gehülfe bewies sich ihm auf diesen Streifereien der Tagelöhner Hafer, welcher, wie Timm in der Vorrede zu seinem

Prodromus erzählt, weder des Lesens noch des Schreibens kundig, dennoch eine solche practische Kenntniß der Pflanzen sich erwarb, daß er neue Arten, die ihm aufstießen, sogleich erkannte, und Timm ihm sogar die Auffindung mancher der kleinsten Kryptogamen verbanfte. Was Timm auf diese Weise sammelte, machte er im J. 1788 durch seinen *Prodromus Florae Megapolitanae* bekannt. Trotz dieses allgemeineren Titels umfaßt derselbe jedoch nur den vorhin schon bezeichneten Theil des Schweriner Landes, nämlich das Gebiet des Malchiner und Cunnerower Sees, und ein Stückchen der Seeküste. Er hatte sich bei der Ausarbeitung dieses Buches zum Geseze gemacht, darin nur solche Pflanzen aufzunehmen, die er selbst in zuverlässig meßenburgischen Exemplaren gesehen hatte, und deren Anzahl ziemlich groß war, denn er zählt in dem *Prodromus* 696 Phanerogamen und 404 Kryptogamen auf. In den J. 1791 und 95 gab er zu demselben noch zwei Nachträge, welche in Siemssens *Magazin* Bd. I, 202 ff. und II, 222 ff. abgedruckt sind. Ein Auszug eines botan. Briefes von ihm an Detharding steht in der *Monatsschrift von und für Meßbg.* 1797 S. 32. Die Laubmoosgattung *Timmia* Hedw. trägt nach ihm den Namen. Sein Herbarium befindet sich im Besiße seines Enkels F. Timm.

Von allen unseren Botanikern hat Timm die meisten Arten, nämlich 644, aufgefunden. Seine neuen Entdeckungen sind nämlich folgende: *Thalictrum minus, flavum*; *Anemone pratensis*; *Ranunculus acris, lanuginosus, Philonotis*; *Aquilegia vulgaris*; *Actaea spicata*; *Nuphar pumilum*; *Corydalis cava, intermedia*; *Nasturtium sylvestre*; *Cardamine amara*; *Dentaria bulbifera*; *Arabis Thaliana*; *Erysimum cheiranthoides*; *Lepidium rudemale*; *Senebiera Coronopus*; *Neslea paniculata*; *Cakile maritima*; *Crambe maritima*; *Gypsophila muralis*; *Dianthus prolifer*, *Armeria*, *Carthusianorum, superbus*; *Silene Otites*; *Lychnis Viscaria*; *Melandrium album, rubrum*; *Honkenya peploides*; *Moehringia trinervia*; *Arenaria serpyllifolia*; *Stellaria uliginosa, crassifolia*; *Cerastium semidecandrum, triviale*; *Radiola linoides*; *Malva Alcea*; *Tilia ulmifolia*; *Hypericum montanum*; *Acer campestre, platanoides*; *Geranium palustre, dissectum, columbinum*; *Impatiens Noli tangere*; *Oxalis stricta*; *Genista pilosa, germanica*;

Ononis repens; *Medicago falcata*, *minima*; *Melilotus alba*; *Trifolium alpestre*, *fragiferum*, *montanum*, *hybridum*, *procumbens*; *Astragalus Cicer*; *Vicia tenuifolia*, *sepium*, *angustifolia*, *lathyroides*, *pisiformis*, *sylvatica*; *Ervum hirsutum*, *tetraspermum*; *Pisum maritimum*; *Lathyrus sylvestris*, *palustris*; *Orobus vernus*, *niger*; *Prunus insititia*, *avium*; *Fragaria collina*; *Potentilla opaca*; *Rosa rubiginosa*; *Alchemilla vulgaris*, *arvensis*; *Poterium Sanguisorba*; *Sorbus torminalis*; *Epilobium angustifolium*, *parviflorum*, *roseum*, *tetragonum*; *Oenothera biennis*; *Circaea alpina*; *Myriophyllum verticillatum*; *Ceratophyllum demersum*; *Peplis Portula*; *Montia fontana*; *Illecebrum verticillatum*; *Scleranthus perennis*; *Sedum Telephium*; *Ribes Grossularia*, *rubrum*; *Eryngium maritimum*; *Apium graveolens*; *Falcaria Rivini*; *Pimpinella magna*; *Berula angustifolia*; *Oenanthe Lachenalii*; *Seseli Libanotis*; *Selinum Carvifolia*; *Archangelica officinalis*; *Peucedanum Oreoselinum*; *Pastinaca sativa*; *Torylis Anthriscus*; *Anthriscus vulgaris*; *Chaerophyllum temulum*, *bulbosum*; *Adoxa Moschatellina*; *Cornus sanguinea*; (*Sambucus Ebulus*); *Sherardia arvensis*; *Asperula arvensis*, *cynanchica*; *Galium boreale*, *Mollugo*, *sylvaticum*; *Dipsacus sylvestris*, *pilosus*; *Scabiosa Columbaria*; *Aster Tripolium*, *Erigeron canadensis*, *Inula britannica*; *Pulicaria dysenterica*; *Bidens cernua*; *Filago minima*; *Helichrysum arenarium*; *Achillea Ptarmica*; *Anthemis tinctoria*, *Cotula*; *Chrysanthemum Leucanthemum*, *inodorum*; *Arnica montana*; *Senecio viscosus*, *sylvaticus*, *Jacobaea*; *Carduus nutans*; *Onopordum Acanthium*; *Centaurea Jacea*, *maculosa*; *Arnoseris minima*; *Picris hieracioides*; *Scorzonera humilis*; *Achyrophorus maculatus*; *Chondrilla juncea*; *Lactuca Scariola*; *Crepis biennis*, *tectorum*, *paludosa*; *Hieracium Auricula*, *cymosum*, *boreale*, *umbellatum*; *Xanthium Strumarium*; *Phyteuma spicatum*; *Campanula persicifolia*; *Vaccinium Vitis Idaea*; *Erica Tetralix*; *Pyrola minor*, *secunda*, *uniflora*, *umbellata*; *Monotropa Hypophyllis*; *Ilex Aquifolium*; *Vinca minor*; *Sweetia perennis*; *Gentiana cruciata*; *Echinospermum Lappula*; *Myosotis hispida*; *Scrophularia aquatica*; *Gratiola officinalis*; *Linaria minor*; *Veronica Anagallis*, *scutellata*, *Teucrium*, *spicata*; *Limosella aquatica*; *Me-*

lampyrum cristatum; *Pedicularis Sceptrum*; *Orobanche arenaria*;
Salvia pratensis; *Stachys palustris*, *arvensis*, *recta*; *Prunella gran-*
diflora; *Trientalis europaea*; *Lysimachia thyrsiflora*, *nemorum*;
Centunculus minimus; *Samolus Valerandi*; *Glaux maritima*;
Statice Limonium; *Litorella lacustris*; *Plantago major*, *media*,
lanceolata, *maritima*, *Coronopus*; *Chenopodina maritima*; *Salsola*
Kali; *Salicornia herbacea*; *Chenopodium hybridum*, *urbicum*,
murale, *glaucum*, *polyspermum*, *Vulvaria*; *Atriplex litorale*; *Ru-*
mex maritimus, *obtusifolius*, *Hydrolapathum*; *Polygonum Bistorta*,
Hydropiper, *dumetorum*; *Aristolochia Clematidis*; *Empetrum*
nigrum; *Euphorbia Cyparissias*; *Mercurialis annua*; *Quercus ses-*
siliflora; *Salix alba*, *triandra*, *viminalis*, *purpurea*, *Caprea*, *aurita*;
Populus nigra; *Myrica Gale*; *Alisma parnassifolium*, *natans*, *ra-*
nunculoides; *Scheuchzeria palustris*; *Triglochin maritimum*; *Po-*
tamogeton natans, *rufescens*, *lucens*, *perfoliatus*, *compressus*, *pecti-*
natus; *Ruppia maritima*; *Zannichellia palustris*; *Zostera marina*;
Lemna polyrrhiza, *gibba*; *Typha angustifolia*; *Sparganium mini-*
mum; *Arum maculatum*; *Calla palustris*; *Orchis mascula*; *Gymna-*
denia conopsea; *Platanthera bifolia*; *Herminium Monorchis*; *Ce-*
phalanthra pallens, *Xiphophyllum*; *Listera ovata*; *Goodyera*
repens; *Spiranthes autumnalis*; *Malaxis paludosa*; *Asparagus offi-*
cinalis; *Convallaria Polygonatum*; *Anthericum Liliago*, *ramosum*;
Gagea arvensis; *Allium vineale*, *Scorodoprasum*; *Juncus glaucus*,
capitatus, *obtusiflorus*, *supinus*, *squarrosus*, *compressus*, *Tenageia*;
Cyperus flavescens, *fuscus*; *Schoenus nigricans*; *Cladium Mariscus*;
Rhynchospora alba; *Heleocharis acicularis*; *Scirpus pauciflorus*,
setaceus, *lacustris*, *maritimus*, *compressus*; *Eriophorum polysta-*
chyum; *Carex dioica*, *pulcaris*, *disticha*, *muricata*, *paniculata*,
remota, *leporina*, *elongata*, *limosa*, *montana*, *praecox*, *digitata*,
glauc, *pallescent*, *flava*, *distans*, *sylvatica*, *Pseudo-Cyperus*, *arenaria*,
hirta; *Setaria glauca*; *Hierochloa odorata*; *Alopecurus agrestis*;
Phleum arenarium, *Boehmeri*; *Agrostis alba*, *canina*; *Calamagrostis*
lanceolata, *neglecta*, *Epigeios*, *sylvatica*; *Ammophila arenaria*, (*bal-*
tica); *Koeleria cristata*; *Aira caespitosa*; *Corynephorus canescens*;
Holcus mollis; *Arrhenatherum elatius*; *Avena strigosa*, *fatua*, *pubes-*

cens, caryophyllea, praecox; *Triodia procumbens*; *Melica uniflora*, nutans; *Poa annua*, nemoralis, trivialis, pratensis, compressa; *Glyceria spectabilis*, distans; *Festuca rubra*, gigantea, arundinacea; *Brachypodium pinnatum*; *Bromus mollis*, asper, sterilis; *Triticum junceum*; *Elymus arenarius*; *Hordeum secalinum*; *Nardus stricta*.

Equisetum palustre, limosum; *Pilularia globulifera*; *Lycopodium Selago*, annotinum, complanatum; *Botrychium rutaefolium*; *Ophioglossum vulgatum*; *Osmunda regalis*; *Polypodium Dryopteris*; *Polystichum Thelypteris*, spinulosum, cristatum; *Asplenium Trichomanes*.

Sphagnum acutifolium; *Splachnum ampullaceum*; *Physcomitrium pyriforme*; *Phascum serratum*, muticum, cuspidatum, nitidum, subulatum; *Pottia cavifolia*, truncata; *Anacalypta lanceolata*; *Barbula unguiculata*, convoluta, subulata; *Trichostomum tortile*; *Weisia controversa*, cirrhata, curvirostra; *Ceratodon purpureus*; *Dicranum pellucidum*, flexuosum, varium, heteromallum, flagellare, undulatum, spurium, glaucum; *Mnium punctatum*, undulatum, hornum, cuspidatum, stellare; *Bryum nutans*, crudum, annotinum, carneum, pseudotriquetrum, roseum, capillare, caespiticiu, argenteum; *Timmia megapolitana*; *Aulacomnion palustre*, androgynum; *Paludella squarrosa*; *Meesia uliginosa*, longiseta; *Bartramia pomiformis*, fontana; *Schistidium ciliatum*; *Grimmia apocarpa*, pulvinata; *Racomitrium lanuginosum*, heterostichum, canescens; *Orthotrichum anomalum*, crispum, leiocarpum; *Encalypta vulgaris*; *Diphyscium foliosum*; *Buxbaumia aphylla*; *Tetraphis pellucida*; *Polytrichum undulatum*, tenellum, nanum, aloides, urnigerum, juniperium, piliferum; *Fontinalis antipyretica*; *Leucodon sciuroides*; *Leptohymenium filiforme*; *Anomodon viticulosus*, curtispendus; *Neckera crispa*; *Leskea trichomanoides*, polyantha; attenuata; *Climacium dendroides*; *Hypnum serpens*, velutinum, nitens, lutescens, rutabulum, cuspidatum, Schreberi, purum, myurum, abietinum, denticulatum, riparium, murale, praelongum, strigosum, longirostrum, triquetrum, loreum, stellatum, squarrosum, cupressiforme, filicinum, *Crista castrensis*, molluscu, fluitans,

aduncum, scorpioides; Fissidens bryoides, taxifolius, adiantoides.

Riccia fluitans, crystallina, glauca; Anthoceros laevis, punctatus; Fegatella conica; Metzgeria furcata; Aneura pinguis, multifida, palmata; Blasia pusilla; Pellia epiphylla; Fossombronina pusilla; Frullania dilatata, Tamarisci; Madotheca platyphylla; Ptilidium ciliare; Trichocolea Tomentella; Lepidozia reptans; Calypogeia Trichomanis; Lophocolea bidentata; Liochlaena lanceolata; Jungermannia trichophylla, bicuspidata, ventricosa; Plagiochila asplenoides.

Tetraspora bullosa; Nostoc commune, pruniforme; Conferva rivularis, canalicularis, glomerata, rupestris; Aegagropila Froelichiana; Botrydium granulatum; Vaucheria caespitosa; Enteromorpha intestinalis, compressa; Ulva latissima; Phycoseris Linza; Callithamnion repens; Ceramium diaphanum; Furcellaria fastigiata; Chondrus crispus; Delesseria sanguinea; Chorda Filum; Fucus vesiculosus, canaliculatus? serratus; Halidrys siliquosa; Nitella flexilis; Chara foetida, hispida.

Verrucaria nitida; Pertusaria communis; Graphis scripta; Lecanora subfusca; Collema atro-coeruleum, crispum; Imbricaria saxatilis, olivacea, caperata, conspersa, parietina; Parmelia stellaris, pulverulenta; Lobaria pulmonaria; Peltigera venosa, horizontalis, canina, aphtosa; Calycium adpersum, lenticulare; Coniochybe furfuracea; Lecidea sanguinaria, geographica; Baeomyces roseus; Cladonia coniocraea, coccifera, digitata, rangiferina; Stereocaulon tomentosum; Cetraria glauca, juniperina; Hagenia ciliaris; Evernia prunastri; Ramalina fraxinea, calicaris, farinacea; Cornicularia aculeata; Bryopogon jubatus; Usnea barbata, florida; nebst 79 Pilzarten.

* Timm Fr. Apotheker in Malschin, Enkel des vorhergenannten, entdeckte *Rubus Sprengelii* (und *Collomia grandiflora*.) — Zu der vorliegenden Arbeit theilte er mir das S. 118 ff. abgedruckte Verzeichniß der officinellen Pflanzen mit.

Lode G. J. geb. den 31. Mai 1733 zu Zoltenpieker in den Vierlanden, gest. am 30. Dec. 1797 als Consistorialrath zu Schwerin, beschäftigte sich als Botaniker vorzugsweise mit dem Studium der

einheimischen Pilze, worüber er in den J. 1790 und 91, als er noch Prediger zu Pritzger war, ein Werk veröffentlichte, welches den Titel führte: *Fungi Mecklenburgenses selecti*. Anfangs hatte Tode sich ein weiteres Ziel gesetzt, nämlich die Ausarbeitung einer mecklenburgischen Flora, wozu ihn um das J. 1775 besonders der Botaniker Murray in Göttingen angeregt hatte. Diese Arbeit aber blieb liegen, als vor ihrer Vollendung im J. 1788 Timms Prodrömus erschien. Schon seit dem J. 1778 hatte aber Tode mit besonderer Vorliebe sich den Pilzen zugewendet, anfangs nur deshalb, weil ihr Studium bis dahin am meisten vernachlässigt worden war, bald aber weil die mannigfaltigen und schönen Formen dieser Pflanzen ihn so fesselten, daß er nicht wieder von ihnen loskommen konnte. Die Frucht dieser Beschäftigung war das oben angeführte Werk, durch welches unsere Pilzflora, aus welcher bis dahin nur 82 Species bekannt geworden waren, um 108 Arten vermehrt wurde, unter denen sehr viele überhaupt von Tode zuerst beschriebene und benannte Species sich befinden. Es war dies eine für jene Zeit sehr tüchtige Arbeit, die freilich den Anforderungen, welche jetzt die Mykologie stellt, nicht mehr entsprechen kann. Schon im J. 1811 erkannte Link (*Observ. in ord. plant.* S. 35) daß sich in Tode's Werk viele Irrthümer eingeschlichen hätten, weil dessen Mikroskop nicht stark genug gewesen sei, und er auch das Messer zum Seciren der Pilze nicht richtig zu handhaben gewußt habe.

Ferner veröffentlichte Tode noch: Bemerkungen über *Phallus caninus* Schäf. in der Monatschrift von und für Mecklg. 1792 S. 380; Antwortschreiben an Hrn. Cand. Flörke in Kotelow a. a. O. 1793 S. 10 ff., (wieder abgedruckt in unserem Archiv IX S. 30 ff.). Auch in den Schriften der Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin (11 Bde. 1780—94) finden sich von ihm noch folgende Aufsätze: vom Gichtschwamme (III Nr. 18); vom neuen Schwamme (III Nr. 19); Beschreibung zweier mikroskopischer Schwämme (IV, 11); Versuch einer genauen Eintheilung der Keulenschwämme (ib. 12); Beschreibung des Knopfschwammes (*AcrospERMUM*), eines neuen Schwammgeschlechtes (ib. 18); Bemerkung, die Samenbede (*velum*) der Schlüsselchwämme betreffend (ib. 19); Versuch einer neuen methodischen Eintheilung der Blatterschwämme (V. Nr. 2); Beschreibung des Hut-

werfers, *Pilobolus* (ib. 3); Beschreibung des Venuschwammes, *Hysterium* (ib. 4); Zusatz zu dem Aufsatz über Blätterschwämme (ib. 27); Fortgesetzte Bemerkungen bei den Schwämmen (VI, 16). Endlich sind auch noch mykolog. Mittheilungen von ihm in den Abhandlungen der naturforschenden Gesell. zu Halle abgedruckt, welche ich leider nicht gesehen habe. Tode's mykologische Leistungen wurden dadurch geehrt, daß eine im südlichen Afrika wachsende Farngattung durch Swartz den Namen *Todea* erhielt; auch *Typhula Todei* Fries, *Ascophora Todeana* Corda und *Chordostylum Todei* Corda wurden nach ihm benannt.

Aber auch noch auf einem andern, von der Botanik sehr entfernt liegendem Gebiete hat Tode sich in Mecklenburg einen Namen gemacht. Als nämlich gegen Ende des vorigen Jahrhunderts ein natürlicher Rückschlag gegen die pietistische Richtung erfolgte, die im Schweriner Lande unter dem Herzog Friedrich geherrscht hatte, und mit dem Regierungsantritt des Herzog Friedrich Franz I. die rationalistische Aufklärungsperiode eintrat, war es Tode, der in dem merkwürdigen und bigigen Streit, welcher sich über das Milbheimsche Noth- und Hülfsbüchlein entspann, von der Regierung den Auftrag erhielt, eine purificirte Ausgabe dieses von der pietistischen Partei hart angefochtenen Buches zu besorgen. Hernach arbeitete er auch mit an dem bekannten im J. 1794 von Studemund und Passow herausgegebenen Ludwigs-Lustler Gesangbuche, worin sich auch sieben „aufgeklärte“ Lieder von ihm befanden.¹ Ueberhaupt trat in den letzten Lebensjahren Todes die Botanik bei ihm immer mehr hinter die Theologie zurück. Ob dies in dem Grade geschehen sei, daß Tode zuletzt seine früheren botanischen Beschäftigungen geradezu für sündhaft gehalten habe, und deshalb das Manuscript, so wie die fertigen Kupferplatten zu der Fortsetzung seiner 1790 begonnenen *Fungi Mecklenburgenses* in einen Reich versenkte, in welchem nach seinem Tode auch sein Herbarium auf Tode's ausdrücklichen Befehl den Untergang fand (vergl. Archiv X, 66), — oder ob, wie eine andere Sage lautet, letzteres lediglich aus Eitelkeit geschah, damit man nach seinem Ableben nicht im Stande

1. Vergl. meine Geschichte Mecklenburgs Bd. 2 S. 438 ff.

sei ihm aus dem Herbarium etwa Fehler in seinen veröffentlichten Arbeiten nachzuweisen, — dies zu entscheiden, muß ich dahingestellt sein lassen, da nur die Thatfache feststeht, die Gründe aber, aus welchen diese hervorging, verschieden erzählt werden. Zur Ehre Tode's möchte ich mich an die erstere Relation halten, da sie ein weniger nachtheiliges Licht auf seinen Character wirft, wie die letztere.

Trentepohl J. F. In welchen Beziehungen dieser ostenburgische Botaniker zu Mecklenburg gestanden hat, ist mir nicht bekannt; ich erwähne ihn nur, weil Rabenhorst in seiner Kryptogamenflora Deutschlands auf Trentepohls Autorität Mecklenburg als das Vaterland des *Physarum alatum* nennt.

Treviranus L. C. war von 1811—16 Professor der Botanik in Rostock, jetzt in Bonn. Er entdeckte in Mecklenburg: *Alyssum calycinum*, (*Lathyrus tuberosus*), *Plantago arenaria*, *Avena tenuis*, *Festuca Myurus* var. *sciuroides* und *Scapania compacta*. Nach ihm trägt die zu den Personaten gehörige Gattung *Trevirana* Willd. den Namen.

Vollbrecht A. C. F. Prediger zu Belitz in der Präpositur Deterow, widmete sich früher der Pharmacie, und entdeckte, zu Neubrandenburg conditionirend, dort im Stargarder Bruche den *Galanthus nivalis*.

(*) Vortisch L. Prediger in Satow bei Kröpelin, entdeckte *Allium ursinum*, (und *Eranthis hiemalis*).

* Weidner F. Dr. med. in Sülz, geb. in Neustrelitz, schrieb als Inaugural-Dissertation: „Die in Mecklenburg wildwachsenden phanerog. Giftpflanzen. Rostock 1856.“ Er entdeckte *Cardamine parviflora* und theilte mir ein Verzeichniß der selteneren bei Sülz wachsenden Pflanzen mit.

Weigel C. C. Verf. der *Flora Pomerano-Rugica* 1769, entdeckte (nach Detharding) in Mecklenburg *Arctostaphylos Uva ursi*.

* Willebrand H. W. H. Prediger in Aladow bei Eribitz, entdeckte *Bupleurum tenuissimum*, *Salix holosericea* (und gemeinschaftlich mit C. Griewant *Barbarea stricta*, *Hypericum hirsutum*, *Rubus rudis*). Ein Aufsatz von ihm über die Flora der alten mecklenburgischen Burgwälle steht in Archiv VI., 132.

Wredow J. C. F. geb. am 10. Nov. 1773 zu Gilsfrow, und
gest. als Prediger zu Parum am 11. Aug. 1823 (s. Archiv X S.
117), schrieb: Tabellarische Uebersicht der in M. wildbwachsenden phaner.
Pflanzengeschlechter, Lüneburg 1808 — Oekonomisch-technische Flora
von Mecklg. Bd. 1 und 2. Lüneburg 1811. 12 (nicht vollendet).
Kleinere Mittheilungen von ihm finden sich in den Mitgl. Beitr.
1808 St. 50. Er entdeckte: *Anemone Pulsatilla*, *Rubus dumetorum*,
Thesium ebracteatum. Eslen benannte nach ihm die zu den Irideen
gehörige Gattung *Wredowia*, die hernach von anderen wieder mit
Aristea vereinigt worden ist. — Sein Herbarium befindet sich im
Besitz des Landschul Lehrer-Seminars zu Ludwigslust.

(*) Wüstnei C. G. G. geb. am 18. Februar 1810 in Malchin,
gest. am 12. Oct. 1858 als Lehrer an der Bürgerschule in Schwerin
(vergl. über ihn Archiv XIII. 2 ff.), schrieb: Verzeichniß der um
Schwerin wildbwachsenden phanerogamischen Pflanzen, Schwerin 1854,
8vo (Schulprogramm). Die Lebermoose Mecklenburgs, in Archiv VIII
S. 49 ff. 1854; auch gab er 1850 eine Sammlung getrockneter
mecklb. Lebermoose heraus, und betheiligte sich an Rabenh. Bryologia
Europaea (Dresden 1858). An neuen Arten entdeckte er: *Corydalis*
solida, *Melilotus dentata*, *Barbula laevipila*, *Preissia commutata*,
Lophoclea minor, *Jungermannia crenulata*, *obtusifolia*, *albicans*,
Zeora hypnorum, *Micarea Wüstneii*, *Imbricaria diffusa*, *aspera*,
Lecidea enteroleuca, *punctata*, *Biatora granulosa*, *Stereocaulon*
condensatum, nebst 33 Pilzarten. — Die deutsche Pilzgattung *Wüstneia*
Rabenh. trägt seinen Namen deren einzige Species, *W. sordida*, von
Wüstnei an trockenen Eschenzweigen bei Schwerin entdeckt wurde.

* Zabel H. früher Assistent am botanischen Museum in Greifswald,
jetzt Forstgehilfe zu Buddenhagen unweit Wolgast, Verfasser der in
Archiv XIII. abgedruckten Flora von Neuvorpommern und Rügen,
entdeckte in d. J. 1856 und 57 auf seinen Excursionen in dem ganzen
östlichen Gränzgebiete Mecklenburgs (wie er mir gütigst mitgetheilt hat):
Carex caespitosa, *Buxbaumii*, *Festuca borealis*, *Polysiphonia*
nigrescens, *Mesogloia vermicularis*, *Desmarestia viridis*, *Chara*
ceratophylla, *crinita*, *baltica*.

Zachariä (+), über den mir weiter nichts bekannt, ist der einzige Finder der *Ononis arvensis* in M. gewesen.

* Zander H. D. F. Dr. phil., Prediger zu Barlow bei Plau, entdeckte *Aconitum Napellus*.

* * *

Zur Vervollständigung der vorstehenden geschichtlichen Notizen will ich noch erwähnen, daß Mecklenburg auch einmal (von c. 1760 bis 1843) einen botanischen Garten gehabt hat, welcher zur Zeit unseres Universitäts-Schisma's in Bülhew geboren wurde und in Rostock starb. Wer sich für die Geschichte desselben interessirt, findet einige Mittheilungen darüber in: Eschenbachs Annalen der Rostockischen Academie 1794 Bd. V. St. 19 S. 151; Link dissert. botanicae, Suerin 1795 Praefat. p. IV; Neue Monatschrift von und für Mecklenburg 1798 S. 18; Wehnerts Meßb. Journal 1806 Bd. II S. 227; Freimuth. Abendblatt 1844 Nr. 1325 im Correspondenzartikel aus Rostock. — Als Curiosum will ich nur erwähnen, daß zur Anschaffung von Pflanzen und Sämereien anfänglich jährlich eine Summe von 12 Thln.! ausgesetzt war, und daß die im J. 1789 im Garten vorhandenen Pflanzen sich in einem solchen Zustande befanden, daß man, als derselbe nach Rostock verlegt wurde, gar nichts davon mitnahm. — Die erste botanische Excursion auf academische Anregung fand zu Rostock im J. 1655 statt; zu derselben lud der Prof. Simon Pauli öffentlich ein.

Um auch gelegentlich hier gleich alle die Pflanzengattungen zusammen zu fassen, die unseren Landsleuten zu Ehren benannt worden sind, will ich noch erwähnen, daß im J. 1848 drei neue in Venezuela entdeckte Gattungen durch Dr. H. Karsten (aus Stralsund) Grischowia, Schwerinia und Stannia getauft worden sind, und zwar nach Dr. Grischow in Stavenhagen, dem Großherzoge Friedrich Franz II. von M. Schwerin, und dem Prof. Dr. Stannius in Rostock. Schon gegen Ende des vorigen Jahrhunderts erhielt eine schöne zur Familie der Scitamineen gehörige Gattung des Cap-Landes den Namen Strelitzia, zu Ehren der damaligen Königin Charlotte von England, geborenen Prinzessin von M. Strelitz.

VIII. Statistik der Flora.

Auch eine Betrachtung der Bestandtheile unserer Flora von einem lediglich statistischen Standpunkte würde nicht ohne Interesse sein, und daher habe ich die beiden nachfolgenden Tabellen *A.* und *B.* zusammengestellt, von denen die erstere einen genauen Nachweis des Anthells giebt, den die einzelnen Botaniker an den in den verschiedenen Pflanzenklassen gemachten Entdeckungen genommen haben, die zweite aber eine chronologische Uebersicht dessen liefert, was in den einzelnen der 9 Decennien, während welcher man sich mit der Erforschung der heimischen Flora beschäftigt hat, an neuen Pflanzen aufgefunden worden ist.

A.

	Phan.	Fil.	M.fr.	Hep.	Alg.	Lich.	Fung.	S. S.
Aufermann	1	1
Becker	3	3
Betcke	8	8
Beuthe	4	.	.	.	1	.	.	5
Blandow	6	.	40	46
Bleichschmidt	1	1
Boll	1	4	5
Brockmann	1	1
Brückner A. F. T. und A. F.	22	2	1	.	1	.	.	26
Brückner G.	3	.	1	.	3	.	2	9
Brückner A. jun.	3	7	10
Crome	5	.	7	12
Danneel	1	1
Detharding	35	.	.	.	5	.	.	40
Ditmar	1	.	.	.	12	.	97	110
	92	2	49	0	22	3	110	278

	Phan.	Fil.	M. fr.	Hep.	Alg.	Lich.	Fung.	S. S.
Tr.	92	2	49	.	22	3	110	278
Ehrenberg	16	.	.	16
Fiedler	.	.	19	.	7	.	360	386
Fleischer	1	1
Flörke	3	.	1	.	.	18	.	22
v. Flotow	2	.	.	3
Gerdes	1	1
Giesebrecht	2	2
Griewant C.	18	.	.	.	1	.	.	19
Häcker	.	.	2	2
Hahn	3	3
Huth	.	.	.	1	7	.	.	8
Kahle	1	.	.	1
v. Kampf	2	1	1	4
Knochenhauer	1	1
Koch	1	1
Koch F.	1	1
Landt	1	1
Langmann	2	2
Lehmeyer	1	1
Lint	30	.	.	.	15	.	92	137
Meyer	4	4
Neuenborn	2	2
Nolte	3	3
v. Dertgen	1	1
Prahl	6	6
Rabenhorst	3	.	.	3
Ramelow	1	1
Richter	1	1
Rüper	3	4	7
Rose	1	.	.	1
	177	7	71	1	76	21	566	919

	Phan.	Fil.	M. fr.	Hep.	Alg.	Lich.	Fung.	S. S.
Tr.	177	7	71	1	76	21	566	919
Schmidt	8	8
v. Schreber	1	1
Schreiber	1	1
Schulz F.	31	3	46	22	2	52	221	377
Schulz L.	417	11	11	2	.	.	3	444
Siemerling	1	1
Siemssen	4	5	9
Strud	.	.	1	1
Thebe	14	1	.	.	.	3	5	23
Timm J.	349	14	109	26	27	40	79	644
Timm F.	1	1
Tode	108	108
Trentepohl	1	1
Treviranus	4	.	.	1	.	.	.	5
Vollbrecht	1	1
Vortisch	1	1
Weidner	1	1
Weigel	1	1
Willebrand	2	2
Wrebom	3	3
Wülfnei	2	.	1	5	.	8	33	49
Zabel	3	.	.	.	6	.	.	9
Zander	1	1
S.	1022	36	239	57	111	124	1022	2611

B.

Decennium.	Phan.	Fil.	M. fr.	Hep.	Alg.	Lich.	Fung.	S. S.
I. (1771-80)	417	11	11	2	0	0	3	444
II. (1781-90)	271	13	107	25	22	37	124	599
III. (1791-1800)	93	1	3	1	7	3	94	202
IV. (1801-10)	105	4	73	7	30	55	341	615
V. (1811-20)	13	3	15	13	3	0	48	95
VI. (1821-30)	61	0	7	0	0	18	0	86
VII. (1831-40)	20	0	0	3	15	0	2	40
VIII. (1841-50)	28	3	21	0	14	0	73	139
IX. (1851-60)	14	1	2	6	20	11	337	391
	1022	36	239	57	111	124	1022	2611

Betrachten wir nun die einzelnen Pflanzenklassen noch etwas näher, so löset sich zunächst unsere Phanerogamenflora in diejenigen Bestandtheile auf, welche die nachstehende Tabelle angiebt, wobei in der letzten, mit G. bezeichneten Columne die von meiner Zählungsmethode abweichende Artenzahl hinzugefügt ist, welche man für die einzelnen Familien erhält, wenn man die von Garcke in seiner Flora von Nord- und Mitteldeutschland (ed. 4) befolgte Methode zu Grunde legt. Da ich aber seit dem Druck des 2. Bogens der vorliegenden Arbeit noch einige Aenderungen in dem dort S. 18 und 23 mitgetheilten Verzeichnisse der Varietäten und Bastarde vorgenommen habe, bitte ich, diese hier zu berücksichtigen, weil sonst die nachfolgenden Zahlen mit jenen früheren Angaben nicht ganz übereinstimmen würden. Es sind nämlich S. 19 *Elatine triandra* und *Salix angustifolia* zu streichen, dagegen aber S. 18 *Viola lactea* und S. 19 *Polygonum mite*

und minus unter die Varietäten einzureihen, desgleichen
 C. 23 *Salix Smithiana* unter die Bastarde. — Außerdem
 ist C. 19 in der zweiten Columnne Z. 6 v. oben irrthüm-
 lich *Potentilla* statt *Veronica* gesetzt.

	einheim.	eingebürg.	Var.	Bast.	verwilt.	verirr.	zweifelh.	S. S.	Garde.
Ranunculaceae	30	2	4	1	3	1	.	41	38
Berberideae	2	.	.	2	2
Nymphaeaceae	3	3	3
Papaveraceae	.	4	.	.	.	1	1	6	6
Fumariaceae	3	1	.	.	.	1	.	5	5
Cruciferae	28	14	4	1	5	4	.	56	56
Cistineae	1	1	1
Violarieae	7	1	2	.	.	1	1	12	10
Resedaceae	.	1	.	.	.	1	.	2	2
Droseraceae	4	4	4
Polygaleae	2	.	1	3	3
Sileneae	14	2	.	.	2	3	1	22	22
Alsineae	24	.	6	.	.	.	1	31	28
Elatineae	2	2	2
Lineae	2	2	2
Malvaceae	6	.	1	.	1	.	.	8	7
Tiliaceae	2	.	.	1	.	.	.	3	2
Hypericineae	7	7	7
Acerineae	3	3	3
Geraniaceae	9	.	.	.	3	.	1	13	13
Balsamineae	1	1	1
Oxalideae	1	2	3	3
Celastrineae	1	1	1
Rhamneae	2	2	2
Papilionaceae	46	5	3	.	4	3	.	61	60
Amygdaleae	2	2	4	4
	200	34	21	3	20	15	5	298	287

	einheim.	eingebürg.	Var.	Diff.	vermilt.	verirrt.	zweifelh.	S. S.	Garde.
Tr.	200	34	21	3	20	15	5	298	287
Rosaceae	34	.	9	1	5	1	.	50	47
Sanguisorbeae	9	.	1	10	10
Onagrariae	9	2	.	1	.	.	1	13	12
Halorageae	3	3	3
Hippurideae	1	1	1
Callitricheae	2	.	2	4	4
Ceratophylleae	2	2	2
Lythrarieae	2	2	2
Cucurbitaceae	.	1	1	2	2
Portulaceae	1	.	1	.	1	.	.	3	3
Paronychieae	3	3	3
Scleranthaeae	2	2	2
Crassulaceae	4	.	1	.	2	.	.	7	6
Grossularieae	2	2	4	4
Saxifrageae	5	5	5
Umbelliferae	33	6	1	.	3	1	.	44	44
Araliaceae	1	1	1
Corneae	1	1	1
Loranthaceae	1	1	1
Caprifoliaceae	5	1	.	.	1	.	.	7	7
Stellatae	10	2	.	1	.	1	1	15	14
Valerianeae	2	4	6	6
Dipsaceae	6	6	6
Compositae	84	16	9	3	12	4	.	128	124
Ambrosiaceae	.	1	1	1
Lobeliaceae	1	1	1
Campanulaceae	10	2	.	.	.	1	.	13	13
Vaccinieae	4	4	4
Ericineae	11	11	11
	448	71	45	9	44	23	8	648	627

	einheim.	eingebürg.	Bar.	Bast.	verwilsb.	verirrt.	zweifelh.	S. S.	Garde.
Tr.	448	71	45	9	44	23	8	648	627
Monotropeae	1	1	1
Aquifoliaceae	1	1	1
Oleaceae	1	.	.	.	1	.	.	2	2
Asclepiadeae	1	1	1
Apocyneae	1	1	1
Gentianeae	11	11	11
Polemoniaceae	1	.	.	.	1	.	.	2	2
Convolvulaceae	5	1	1	7	7
Boragineae	14	3	1	.	2	1	1	22	22
Solaneae	1	3	2	.	4	.	.	10	10
Scrophularineae	32	8	5	5	3	1	1	55	49
Orobancheae	4	1	5	5
Labiatae	29	10	6	4	1	.	1	51	49
Verbenaceae	1	1	1
Lentibularieae	5	2	7	5
Primulaceae	12	1	1	14	13
Plumbagineae	2	.	1	3	3
Plantagineae	7	7	7
Amaranthaceae	2	.	.	2	2
Chenopodeae	8	10	3	.	2	3	.	26	23
Polygoneae	15	2	3	1	.	1	.	22	22
Thymeleae	1	.	.	1	1
Santalaceae	2	2	2
Eleagneae	1	1	1
Aristolochieae	.	1	1	2	2
Empetreae	1	1	1
Euphorbiaceae	4	4	8	8
Urticeae	2	4	1	.	1	.	.	8	7
Cupuliferae	5	5	5
	615	119	68	19	62	29	15	927	891

	einheim.	eingebürg.	Var.	bast.	verwilt.	verirrt.	zweifelh.	S. S.	Garde.
Tr.	615	119	68	19	62	29	15	927	891
Salicineae	14	.	9	7	.	.	.	30	24
Betulineae	4	4	4
Myriceae	1	1	1
Coniferae	3	3	3
Dicotyl. S.	637	119	77	26	62	29	15	965	923
Hydrocharideae	2	2	2
Alismaceae	5	5	5
Butomeae	1	1	1
Juncagineae	3	3	3
Potameae	17	.	4	21	21
Najadeae	2	2	2
Lemnaceae	4	4	4
Typhaceae	5	5	5
Aroideae	2	1	3	3
Orchideae	25	.	1	26	26
Irideae	2	2	2
Amaryllideae	1	.	.	.	3	.	.	4	4
Asparageae	6	6	6
Lilaceae	12	2	.	.	4	.	1	19	19
Colchicaceae	1	.	.	1	1
Juncaceae	15	.	4	19	19
Cyperaceae	68	.	5	73	73
Gramineae	74	19	5	4	3	5	1	111	108
Monocotyl. S.	244	22	19	4	11	5	2	307	304
Dicotyl. S.	637	119	77	26	62	29	15	965	923
S. S.	881	141	96	30	73	34	17	1272	1227

Von den in den beiden ersten Columnen aufgezählten 1022 einheimischen und eingebürgerten phanerogamischen Arten gehören fast 0,74 den Dicotyledonen, und 0,26

den Monocotyledonen an. — Die am stärksten vertretenen Familien sind:

Compositae	0,0978	Rosaceae	0,0332
Gramineae	0,0909	Ranunculaceae	0,0313
Cyperaceae	0,0665	Orchideae	0,0244
Papilionaceae	0,0499	Alsineae	0,0234
Cruciferae	0,0410	Chenopodeae	0,0176
Scrophularineae	0,0391	Boragineae	
Umbelliferae	0,0381	Polygoneae	0,0166
Labiatae		Potameae	

Reduciren wir die bis jetzt in Mecklenburg mit Sicherheit gefundenen Arten, Varietäten und Bastarde (mit Ausschluß der 17 zweifelhaften Arten), — im Ganzen also 1255 —, auf Garcke's Flora von Nord- und Mitteldeutschland (ed. 4), so finden wir, daß er 1212 derselben als wirkliche Species betrachtet. Von den 96 Varietäten erkennt er nämlich nur 25 als solche an, 71 aber als Arten; von den 30 Bastarden gelten ihm nur 16 als solche, 14 dagegen als Species; von den verirrten Pflanzen fehlen zwei bei ihm noch ganz und gar, nämlich *Sedum hybridum* und *Polypogon monspeliensis*. Von den cultivirten Pflanzen, welche Garcke aus dem bezeichneten Gebiete aufzählt und die ich nicht mit berücksichtigt habe, werden in Mecklenburg etwa 150 allgemeiner auf Feldern und in Gärten angebauet. Demnach umfaßte unsere Phanerogamenflora gegenwärtig nach Garcke's Zählungsmethode:

1022	
+ 71	} einheim. und eingebürg. Arten
+ 14	
73	verwülbte
34	verirrte
150	cultivirte

S. 1364 Arten,

also 0,64 der 2129 Arten, die Garcke aus Nord- und Mitteldeutschland namhaft macht. Veranschlagen wir die gesammte deutsche Phanerogamenflora auf etwa 3300 Arten, so besitzen wir davon 0,41.

Diese Abtheilung des Pflanzenreiches, welche die augenfälligsten Objecte darbietet, ist von unseren Botanikern immer mit besonderer Vorliebe durchforscht worden. Auf viele neue Entdeckungen dürfen wir daher in derselben nicht mehr hoffen. Einen Fingerzeig dafür, was wir noch etwa Neues finden könnten, geben uns die benachbarten Floren, von denen manche schon recht sorgfältig durchsucht sind, nämlich Holstein durch Nolte, Lübeck durch Häcker, das Hamburger Gebiet durch Sonder, das Berliner durch Kunth, die Ufermark durch Gerhardt,¹ Neuvorpommern und Rügen durch Zabel. Aus den Arbeiten dieser Botaniker habe ich diejenigen uns zur Zeit noch fehlenden Pflanzen zusammengestellt, in deren Verbreitungsbezirk Mecklenburg liegt, oder deren Bezirk unserem Lande wenigstens nach einer Seite hin nahe kommt, so daß wir darnach zwei Classen noch zu beachtender Pflanzen erhalten, von denen die einen durch ganz Mecklenburg, die anderen aber nur in gewissen Gränzbezirken aufgefunden werden möchten. Hätte ich alles namhaft machen wollen, was nach der Angabe verschiedener Floristen in den bezeichneten Ländern vorkommen soll, so hätte sich die Anzahl der nachstehend aufgeführten

1. Programm des Gymnasiums zu Prenzlau 1856. — Sehr unkritisch ist Schmidts Flora von Pommern und Rügen 1840, auch in der neuen, von Dr. Baumgarbt 1848 besorgten Auflage; Dietrichs Flora Marchica (1841) enthält gleichfalls manche verdächtige Angaben.

Pflanzen noch sehr vergrößern lassen; es haben sich aber in jenen Angaben eine Menge von Irrthümern eingeschlichen, weshalb ich alles irgend Verdächtige ausgeschlossen habe. Die Pflanzen, für deren Vorhandensein in den benachbarten Ländern mir genügende Autoritäten zu sprechen scheinen, sind nun folgende:

Thalictrum simplex Holstein, Hinterpommern? Königsberg und Memel.
Anemone sylvestris Ufermark.

Adonis vernalis Ufermark, Hinterpommern.

Nigella arvensis Ufermark, Mittelmark.

Fumaria muralis Gebiet der Flora von Hamburg.

F. capreolata bei Kiel, Hamburg und Greifswald eingeschleppt.

Camelina microcarpa Andr. bei Remnitz unweit Greifswald eingeschleppt (Zab. in litt.).

Alyssum montanum Oderberg.

Diploxaxis muralis bei Stralsund, Wolgast, Swinemünde eingeschleppt.

Senebiera didyma bei Wolgast, Eldena, Hamburg und Altona eingeschleppt.

Viola persicifolia Schk. Potsdam (sec. Rütke).

Polygala depressa Hamburg, Greifswald, Rügen.

Gypsophila fastigiata im Geb. d. Flora von Berlin, Oranienburg?

Dianthus arenarius Wolgast.

Silene viscosa Hiddensee.

S. chlorantha Ufermark.

Sagina subulata Holstein.

Stellaria Frieseana Herzth. Lauenburg, Lübeck.

Moenchia erecta Hamburg.

Cytisus sagittalis bei Wolfshagen (Uferm.), aber wohl nur verwildert.

Vicia villosa Hamburg, Lauenburg, Wittstoder Haide, Ufermark, bei Remnitz unweit Greifswald auf Saatäckern (eingeschleppt, — sec. Zabel in litt.).

Tetragonolobus siliquosus Holstein, Rügen, Ufermark.

Astragalus Hypoglottis Ufermark.

Coronilla varia in der Ufermark und bei Berlin eingebürgert.

- Spiraea salicifolia* bei Greifswald eingebürgert.
Rubus Chamaemorus Swinemünde.
Cydonia vulgaris auf Hiddensöe bei Kloster eingebürgert.
Epilobium obscurum Hamburg.
Isnardia palustris Lauenburg, Gebiet der Flora von Hamburg.
Trapa natans Mittelmark, bei Wörlitz unweit Dessau häufig (C. Griew.)
Lythrum hyssopifolia Altmark (unweit Wittenberge), Berlin.
Bryonia dioica Gebiet der Floren von Lübeck und Hamburg.
Galium tricornes Hamburg.
G. sylvestre desgl. auf Haideboden.
Petasites albus Holstein.
Aster Amellus Schwedt.
Linosyris vulgaris Dranienburg? Schwedt, Garz.
Stenactis annua von Hamburg längs der Südgrenze bis in die Uferm.
Inula Conyza Hamburg, Prigwall, Rügen.
Scorzonera purpurea Perleberg, Ufermark, Demmin.
Cotula coronopifolia Holstein und nordwestl. Deutschland.
Senecio vernalis in Vorpommern eingeschleppt.
Crepis praemorsa Rügen.
Hieracium virescens Hamburg, Rakeburg, Kiel.
Xanthium italicum längs der Elbe bis Hamburg.
Campanula sibirica Ufermark.
Symphytum tuberosum bei Lenzen an der Elbe häufig (Schreiber).
Linaria spuria Holstein.
Veronica peregrina bei Hamburg und Greifswald eingeschleppt.
V. praecox Berlin, Prenzlau, Stettin.
Melampyrum sylvaticum Flora von Hamburg, Mittelmark.
Orobanche elatior, *Epithymum*, *caryophyllorum* Vorpommern.
Salvia vesticillata Prenzlau, Stettin.
Teucrium Scorodonia Hamburg, Berlin, Rügen.
Chenopodium ficifolium Hamburg.
Beta maritima häufig an der Nordsee, aber auch schon bei Heiligen-
 hafen an der Ostsee in Holstein gefunden.
Atriplex calotheca Zingst, Stralsund.
A. nitens Hamburg.

- Rumex pratensis* Hamburg, Lübeck, Prenzlau.
R. domesticus Hamburg.
Asarum europaeum Flora von Hamburg.
Salix daphnoides Rügen.
S. bicolor, *nigricans* Hamburg.
Hydrilla verticillata Pommern im Dammschen See.
Potamogeton rutilus, *trichoides* Hamburg.
Najas flexilis Pommern unweit Stettin.
Zannichellia polycarpa holst. Ostseeküste.
Orchis tridentata Mittelmark, Ufermark, Stettin?
O. coriophora Britzwalde.
Platanthera viridis Holstein.
Listera cordata Rügen, Harburg.
Microstylis monophyllos Rügen, Uesedom, Wollin.
Cypripedium Calceolus Rügen, Ufermark.
Narthecium ossifragum Flora von Hamburg.
Juncus tenuis Hamburg, Holstein.
Heleocharis multicaulis Gebiet der Flora von Hamburg.
Scirpus Duvalii, *Pollichii*, *Rothii* am unteren Laufe der Elbe.
S. radicans Holstein, Lauenburg, Voitz a. d. Peene.
S. supinus Ufermark.
Carex axillaris, *maxima* Vorpommern.
C. stenophylla Holstein.
C. microstachya Lübeck.
C. supina Holstein, Oderberg.
C. laevigata Kiel.
Alopecurus nigricans Hornem. var. *exserens* Ledeb. bei Greifswald
 und auf Müschgut (Zabel in litt.!).
Chamagrostis minima in d. Hamburger Flora eingeschleppt.
Aira uliginosa Rügen, Fühneburger Heide.

Würden alle diese 94 Pflanzen dermaleinst auch als
 Bürger unserer mecklenburgischen Flora nachgewiesen, —
 was kaum zu erwarten steht, — so würde dadurch die
 Gesamtsumme unserer Phanerogamen auf 1458 Arten

anstiegen und diese würden dann 0,44 der deutschen Phanerogamenflora ausmachen.

Auch die Klasse der zierlichen Farne ist schon sehr sorgfältig durchsucht, indem von den 74 Species, welche nach Rabenhorst in Deutschland (incl. der Schweiz, Italiens und des Lombardisch-Venetianischen Königreichs) vorkommen,¹ in Mecklenburg schon etwas mehr als die Hälfte, (nämlich wenn *Lycop. Chamaecyparissus* und *Polystichum dilatatum* auch als Arten gelten,) gefunden sind. Wir besitzen demnach schon 0,506 der gesammten deutschen Farne. Daß wir auch hier nicht mehr viel Neues zu hoffen haben, zeigt eine Vergleichung der benachbarten Floren, welche nur noch zwei Species vor uns voraus haben, nämlich *Salvinia natans*, die bei Lübeck, und *Isoëtes lacustris*, welche bei Ratzeburg die westliche Landesgränze berührt. Ich zweifle nicht, daß beide auch noch in Mecklenburg selbst aufgefunden werden, wodurch die Zahl unserer Farne dann auf 0,53 der deutschen Arten ansteigen würde.

An Laubmoosen, deren Kenntniß wir besonders Blandow, Crome, Fiedler, Schulz und Timm verdanken, kennen wir in Mecklenburg nach meiner Zählung 239, nach Rabenhorst's 243 Arten. Da letzterer in seiner Kryptogamenflora überhaupt an deutschen Species 543 aufzählt, so würde unser Antheil an der deutschen Moosflora 0,44 betragen. Auch diese Classe wird hinfort nicht

1. Rabenhorst zählt in seiner Kryptogamen-Flora Bd. II. Abth. 3 (1848) nur 69 Arten; ich habe bei der Zählung noch fünf hinzugefügt, nämlich *Pilularia globulifera*, *Salvinia natans*, *Botrychium simplex* und *matricariaefolium*, *Cystopteris sudetica*.

viel neue Ausbeute mehr geben, denn die Gränzländer haben, so viel ich weiß, vor uns nur noch voraus:

Bryum cernuum bei Neubamm.

B. pallescens bei Hamburg und in Holstein.

B. Wahlenbergii auf Nüßen, bei Neubamm und Hamburg.

Fiedleria subsessilis bei Greifswald.

Orthotrichum cupulatum bei Hamburg.

Pottia Heimii bei Spandau.

Pyramidium tetragonum in Hinterpommern.

Racomitrium aciculare bei Hamburg.

Schistidium maritimum an Felsblöcken des holsteinischen Ostseestrandes.

Seligeria calcarea auf Stubbenkammer.

Durch Auffindung dieser 10 Arten würde unsere Moosflora auf 253, oder auf 0,46 der deutschen Species ansteigen.

Die Kenntniß unserer Lebermoose verdanken wir hauptsächlich F. Schulz, Timm und Wüßnei. Von den durch Rabenhorst aufgezählten 178 deutschen Arten sind in M. schon 57, also 0,32 aufgefunden. Da diese Zahl gegen die für die Laubmoose erhaltene verhältnißmäßig noch sehr zurücksteht, so dürfen wir in dieser Classe wohl noch auf manchen Zuwachs rechnen, und zwar möchten dabei hauptsächlich folgende, in den benachbarten Gebieten wachsende Species ins Auge zu fassen sein:

Jungermannia bicrenata in Holstein.

J. caespititia bei Bergedorf unv. Hamburg.

J. curvifolia in Holstein.

J. incisa in Holstein.

J. intermedia in Holstein.

Mastigobryum deflexum in Holstein.

Aneura pinnatifida in Holstein.

Scapania curta in Holstein.

Sarcosecyphus Funckii in Holstein.

Haplomitrium Hookeri bei Hamburg.

Geocalyx graveolens in Pommern.

Selbst durch Auffindung aller dieser Arten in M., wodurch die Zahl der unserigen auf 68 oder 0,38 ansteigen würde, möchte diese Classe unserer Flora wohl kaum erschöpft sein.

Noch viel schwächer aber ist es mit unserer Erforschung der drei letzten Classen des Pflanzenreiches bestellt. Denn von den 1435 deutschen Algen, welche Rabenhorst aufzählt, kennen wir in M. (besonders durch Ditmar, Ehrenberg, Fiedler, Huth, Koch,¹ Link, Timm und Zabel) nur erst 140, oder 0,09. Von diesen gehören 91 Species der Ostsee an, — eine viel zu geringe Anzahl im Vergleich zu der, welche sich nach den Forschungen Fröhlichs (Prediger in Born bei Schleswig † 1846), v. Suhrs (Hauptmann in Rendsburg † ?), Pohlmanns (Handelsgärtner in Lübeck † 1849) u. a. für die Küsten von Schleswig, Holstein, Lübeck, Femern, Rügen u. s. w. ergeben hat. Von dort sind nämlich folgende 148 uns zur Zeit noch fehlende Ostseespecies bekannt geworden (sec. Rabenhorst, Rützing und Pohlmann in litt.):

1. Während des Druckes dieses Bogens erhalte ich von Herrn Baumeister F. Koch in Dargun noch einen Beitrag von 29 neuen Diatomaceen für unsere Algenflora, welche er in einem Meereschlamm unter dem heiligen Damme bei Doberan entdeckt, und die Hr. Prof. Ehrenberg in Berlin determinirt hat. Dadurch steigt die Gesamtzahl unserer Algen von 111 (S. 181) schon auf 140 Arten, und die ganze Summe unserer Pflanzen von 2611 auf 2640. Auf S. 182 ist demnach auch in der Tabelle B. für das Decennium IX. die Zahl der darin entdeckten Algen auf 49, und die der sämtlichen Pflanzen auf 420 (statt 20 und 391) zu erhöhen.

- Eunotia Westermanni* Flensburg.
 gibberula.
Synedra gracilis.
 Sigma.
 saxonica Flensburg.
Amphipleura danica.
Navicula Oxyphyllum Flensb.
 interrupta Kolberg.
 baltica Kiel.
 lamprocarpa.
Amphora elliptica.
 hyalina.
Rhapidogloea micans.
Schizonema sericeum Flensb.
 rutilans
 Hoffmanni Flensb.
 balticum.
 Ehrenbergii.
 cuprinum.
 Navicula.
Achnanthes brevipes.
Striatella unipunctata.
Tessella interrupta.
Rhabdonema arcuatum.
Gomphonema exiguum Flensb.
 curvatum.
Podosphenia gracilis.
 Lyngbyei.
 Ehrenbergii.
Melosira nummuloides.
 moniliformis.
 lineata.
Cocconëis pygmaea.
 consociata.
- Cocconëis aggregata*.
 oceanica.
 Scutellum.
Dictyocha Speculum.
Amphitetras antediluviana.
Heteractis pruniformis Gelsing
 ger Bucht.
Cylindrospermum gelatinosum
 ibid.
Phormidium Thinoderma Kiel.
Lyngbya aeruginosa.
 ferruginea Gelsing. Bucht.
 confervicola.
Leibleinia chalybaea.
Schizosiphon scopulorum.
Actinococcus roseus.
Physactis lobata Flensb.
Rivularia atra Holstein.
 pellucida Gelt. B.
Cruoria pellita.
Batrachospermum moniliforme
 Schlesw. Holst.
Hormidium ceramicola.
Schizogonium tortum.
Conferva auricoma Schlesw.
 fibrosa Mügen.
 liniformis.
 rigida Schleswig, Mügen,
 Danzig.
Linum Trabemilube!
Melagonium.
 littorea.
 cymosa.
 vaucheriaeformis Flensb.

Conferva Froelichii.

crystallina.

Suhriana Schleg.

heterochloa Schlesw.

refracta.

centralis.

uncialis.

Comatula Flenzb.

globosa Flenzb.!

Hormiscia penicilliformis.

Ectocarpus siliculosus Travem.!

major.

fasciculatus.

flagelliformis.

rufus.

subverticillatus.

compactus.

castanens Flenzb.

brachiatus Travem.!

Vaucheria littorea.

Bryopsis plumosa Femern.

Bangia crispa Schlesw. Danzig.

Phycolapathum cuneatum Flenzb.

Enteromorpha complanata.

clathrata Flenzb.!

Dictyosiphon foeniculaceus Travemünde.!

Phyllactidium ocellatum.

Ulva Lactuca Holstein!

oxysperma Kiel.

Porphyra umbilicalis.

Diplostromium tenuissimum.

Callithamnium roseolum.

minutissimum Gelting. B.

Callithamnium pubes.

roseum.

corymbosum Flenzb.!

Chondrus incurvatus Trav.!

Dumontia filiformis ib.

Polysiphonia arenaria Kilgen.

stricta.

divaricata Kiel, Kilgen.

roseola.

aculeata Gelting. B.

tenuis Trav.!

rugulosa.

elongata.

Lyngbyei.

byssoides.

flaccida Femern.

dichocephala.

lophura.

secundata.

formosa.

rugulosa.

commutata.

Cystoclonium purpurascens

Gelt. B.

Sphaerococcus Bangii.

palmatum Friedericia!

Sphacelaria cirrhosa Flenzb.!

plumosa Trav.!

pennata.

spinulosa.

Stypocaulon scoparium.

Cladostephus Myriophyllum.

spongiosus.

Myrionema stellare.

*Myrionema curtum.**Elachista velutina* Høst.*fucorum.**ferruginea* Kiel, Femern.*flaccida.**Hildebrandtia deusta.**Leathesia baltica.**marina* Flensb.*Mesogloia nervosa* ib.*Punctaria plantaginea* ib.!*Chorda fistulosa* Femern.*Stilephora paradoxa* ib. Kiel.*Desmarestia aculeata* Sonder-
burg!*Halorrhiza vaga* Gelting. B.*Lichnia confinis* Trav.!*Phyllitis Fascia* Kiel.*Ozothallia nodosa* ib. Trav.!*Nitella nidifica.*

Auch mit dieser ansehnlichen Zahl dürfte die Algenflora der südlichen Ostseeküste kaum erschöpft sein. — Nicht minder fragmentarisch ist die unserer süßen Gewässer, aus der wir nur erst 49 Arten kennen. Wie viel wir hier noch zu erwarten haben, darüber können uns auch die Nachbarfloraen keinen auch nur einigermaßen genügenden Fingerzeig geben, da auch bei ihnen das schwierige Studium dieser Pflanzen sehr vernachlässigt geblieben ist. Zwar werden aus Holstein und Schleswig noch etwa 60 Species namhaft gemacht, die bei uns noch nicht beachtet sind, aber das reicht noch lange nicht zur Erschöpfung dieser Pflanzenclasse hin. Denn bedenken wir, daß von den c. 1000 Species deutscher Süßwasseralgen in Schlesien schon c. 500 aufgefunden sind, so dürfen auch wir gewiß mit Recht auf einige hundert Arten rechnen. Unter diesen Verhältnissen glaube ich keine zu hohe Rechnung zu machen, wenn ich die Zahl unserer Algen auf etwa 250 Meeres-species und 400 Sp. der süßen Gewässer veranschlage, — im Ganzen also auf 650 Arten, durch deren Auffindung unsere Algenflora auf 0,45 der deutschen Algenflora ansteigen würde.

Lichenen zählt die deutsche Flora nach Rabenhorst

440 Arten, die unserer nur 124, oder 0,28, welche hauptsächlich durch Flörke, F. Schulz, Timm und Wüstnei entdeckt sind. Aber auch diese Zahl genügt noch nicht, und ich glaube, daß wir es in dieser Classe auf mindestens 176 Species bringen werden.

Die meisten Entdeckungen scheinen aber noch in der Classe der Pilze zu machen zu sein. Rabenhorsts Aufzählung der deutschen Pilze vom J. 1844 umfaßte schon 4079 Arten! und vier Jahre später hatte er dazu schon einen gegen 1000 Species enthaltenden Nachtrag gesammelt, dessen Bekanntmachung er aber noch zurückhielt, weil ihm wöchentlich noch neue Entdeckungen aus allen Gegenden Deutschlands zukamen. Ist dies in den folgenden Jahren so fortgegangen, so müssen jetzt schon gegen 6000 Pilzarten in Deutschland gesammelt worden sein. Gegen diese Summe stehen denn freilich unsere 1022 meissenburgischen Species, deren Kenntniß wir besonders Ditmar, Fiedler, Vink, F. Schulz, Timm, Tode und Wüstnei verdanken, noch sehr zurück, da sie nur 0,17 derselben betragen, während wir sie doch im Hinblick auf die sorgfältiger durchsuchten Pflanzenklassen auf mindestens 0,40 jener Summe, oder auf etwa 2400 Arten, veranschlagen dürfen. Große Strecken unseres Landes sind mykologisch noch gar nicht ausgebeutet, und es steht hier also den weiteren Forschungen noch ein großes Feld offen.

Stellen wir das für alle Classen gewonnene Resultat noch einmal übersichtlich zusammen, so ergiebt sich folgendes:

	Deutsch- land.	M e f f e n b u r g.			
		jetzt	D.: M. = 1:	künftig	D.: M. = 1:
Phanerogamen	3300	1364	0,41	1458	0,44
Farne	73	38	0,50	40	0,53
Laubmoose	543	243	0,44	253	0,46
Lebermoose	178	57	0,32	68	0,38
Algen	1435	140	0,09	650	0,45
Flechten	440	124	0,28	176	0,40
Pilze	6000	1022	0,17	2400	0,40
	S.	11969	2988	5045	

Es würde demnach in M. noch die ansehnliche Zahl von 2057 Pflanzenarten zu entdecken bleiben, durch deren Auffindung unsere Flora von 0,24 auf 0,42, oder etwas mehr als zwei Fünftel der deutschen Flora ansteigen würde. Da die drei am sorgfältigsten erforschten Classen nicht allein fast diese (0,41), sondern sogar noch eine etwas größere Zahl (0,44, und 50) geliefert haben, so glaube ich daß jene Durchschnittszahl von 0,42 keineswegs zu hoch gegriffen sei, sondern vielmehr nur die Minimumsgränze dessen, was wir noch zu erwarten haben, darstelle.

IX.

Systematische Aufzählung

der mecklenburgischen Pflanzen.

Anm. Die phanerogamischen eingeborenen und eingebürgerten Pflanzen sind numerirt und mit größerer Schrift gedruckt, die letzteren aber durch einen vorgesetzten Stern kenntlich gemacht. Für die verwilderten und verwirrten Pflanzen sind kleinere Lettern gewählt. — Hinter den lateinischen Speciesnamen ist in Klammern die Jahreszahl der ersten Entdeckung der betreffenden Art in Mecklenburg (vergl. S. 144), so wie der Name des Entdeckers hinzugefügt, letzterer meist nur in einer abgekürzten Bezeichnung, deren Bedeutung man aus dem VII. Abschnitt leicht ermitteln wird, wie z. B. unter L. Sch. der Friedländer Dr. L. Schulz, und unter T. der Maschinen Timm sen. zu verstehen ist. — Ein ! hinter der Jahreszahl zeigt an, daß die Pflanze in dieser meiner Arbeit entweder zuerst als mecklenburgische genannt ist, oder daß ich das Entdeckungsjahr (auf Angabe des Entdeckers selbst gestützt,) etwas früher angesetzt habe, als dies in den bisherigen Publicationen geschehen ist. — Das ! hinter dem Fundorte bedeutet, daß ich entweder dort selbst gesammelt habe, oder Exemplare von jenem Orte in meinem Herbarium besitze.

I. Dicotyledoneae.

1. *Thalictrum minus* L. (T. 1791) bei Grabow, ^{1. Ranunculaceae.} Görslow untr. Schwerin, Bützow, Güstrow, Waren auf dem Windmühlenberge, Malchin nach Mistorf zu! Neu-Brandenburg am Starg. Berge selten! sehr häufig bei Kl. Nemerow! im Kamelowschen Holze bei Friedland.

Ann. Es kommen in Mecklenburg die beiden Formen vor, welche jetzt allgemein als *T. minus* L. und *T. flexuosum* Bernh. betrachtet werden, und zwischen denen *T. Kochii* Fr. als Verbindungsglied gerade in der Mitte steht. Schon Link unterschied in f. Mscr. 1810 zwei Abänderungen dieser Art in Mecklenburg, Schultz 1818 sogar zwei Species, *minus* und *majus*, äußerte aber später mündlich gegen mich, daß beide unzweifelhaft zusammen fielen. — Von der großen Veränderlichkeit dieser Art habe auch ich mich völlig auf einer Excursion überzeugt, welche ich um dieses Th. willen am 14. Aug. 1854 nach Kl. Nemerow unternahm, und habe alles das bestätigt gefunden, was G. Meyer in f. Fl. excurs. Hanov. S. 5 f. über *Th. minus* sagt. Bei Kl. Nemerow wächst die Pflanze in großer Menge gleich hinter dem Hofe an den Zäunen in der Allee welche zur Chaussee führt; man findet dort Gr., deren Stengel hohl und so dünnwandig ist, daß man ihn mit Leichtigkeit zerdrücken kann, und wiederum andere, bei denen er fast solide ist; ebenso variiren die Blätter in Gestalt und Größe, und die bald stark zusammengebrückten, bald rundlichen Nüsschen haben 8, 9 oder 10 Rippen; auch die Rispen ändern mehrfach in der Gestalt ab. — Außer Meyer a. a. D. vereinigt auch Wirtgen in seiner Flora der preuß. Rheinprovinz

(Bonn 1857) beide Formen wieder, desgleichen Garcke (ed. 4) und Zabel.

2. *Thalictrum flavum* L. (T. 1788) auf den Wiesen der Haideebene, besonders der Elbe! nicht selten, aber auch bei Görslow untw. Schwerin, auf den Torfwiesen am Prival, auf der Insel Buchwerder im Daffower See, bei Evershagen (zw. Doberan und Rostock), Warnemünde, am Peeßer Bach (nördl. von Rostock) und bei Malchin an der hohen Brücke. — In M. Strelitz scheint es zu fehlen. S. 138.

3. *Anemone Hepatica* L. (L. Schulz 1777). In der Haideebene sehr selten, sonst häufig! S. 37. 138.

4. *Anemone Pulsatilla* L. (Wredow 1808) vorzüglich in der großen Haideebene! aber auch im Steinfelder Holz bei Schwerin, bei Parchim, Güstrow und Rostock. — Sollte sie in M. Strelitz wirklich fehlen?

5. *Anemone pratensis* L. (T. 1788) durch ganz Mecklenburg häufig! S. 118.

β. *viridiflora* bei Boizenburg auf den Elb-Deichen! (Richter); vergl. Mertens und Koch D. Fl. III, 104.

6. *Anemone vernalis* L. (Ackermann 1841) bei Ludwigslust unweit des ersten Chauffeehauses vor dem Hamburger Thore nur einmal gefunden; etwas häufiger in dem kleinen nördlichen Haidegebiete bei Mandelsbagen und Gelbensande! Fehlt in M. Strelitz, und ist überhaupt unter den verwandten Arten die seltenste im nordöstlichen Deutschland.

7. *Anemone nemorosa* L. (L. Sch. 1777).

8. *Anemone ranunculoides* L. (L. Sch. 1777) fehlt nur an wenigen Orten, z. B. bei Ludwigslust.

7 + 8. *A. ranunculoidi-nemorosa* Kunze (Brockmüller 1853) im Reeser Holz bei Grabow, — ein Bastard.

Adonis aestivalis L. (T. 1795) ist einige Male unter der Wintersaat gefunden worden, aber ohne Zweifel eingeschleppt.

9. *Myosurus minimus* L. (L. Sch. 1777).

10. *Ranunculus hederaceus* L. (Link 1810). Im nordwestlichen Deutschland nicht selten, (schon in der Altmark, so wie im Geh. d. Floren von Hamburg und Lübeck häufig,) in M. aber nur erst bei Krakow (Guth) und beim Landfruge zw. Rostock und Ribnitz (Link) gefunden. — In M. Strelitz, Uckermark, Pommern, Preußen, Schlesien, Neumark und Mittelmark fehlt diese Pflanze. (S. 33. 39. 138).

11. *Ranunculus aquatilis* L. (L. Sch. 1777). Von dieser wandelbaren Art, über welche S. 10 und C. Griewank in Archiv 8, 181 zu vergleichen, sind bei uns unter anderen auch folgende Formen beachtet worden:

β. paucistamineus Tausch. (Sonder 1851) bei Rostock, Daffow! Grabow und wahrscheinlich noch viel weiter verbreitet, aber nicht beachtet.

γ. marinus = *tripartitus* Nolte, *confusus* Godr. (C. Griewank 1854, 1851!) am Daffower See in Brackwasser-Wiesengraben!

12. *Ranunculus fluitans* Lam. (Link 1795) bei Grabow in der Elbe, häufig im Daffower See (bis 12' lang) und wahrscheinlich auch noch in anderen meßb. Flüssen, aber nicht beachtet.

Anm. Die Daffower Gr. haben nur 5 (sehr selten 6) Blumenblätter, gehören also zu der Form, die Wirtgen im J. 1846 als eigene Species unter dem Namen *R. Bachii* aufstellte, im J. 1857

aber wieder eingezogen hat. Auch im Geb. der Flora Marchica ist nach Dietrich die Blumenkrone immer 5blättrig, bei Hamburg (nach Sonder) 6–10blättrig, während andere, z. B. Koch, ihr 9–12 Blätter zuschreiben. In diesem Punct läßt sich also der veränderliche Character der Pflanze nicht hinwegleugnen (vergl. S. 10 f.), und ich glaube, daß man nach unbefangener Prüfung demaleinst auch noch diese und vielleicht auch die folgende Art wieder einziehen, und als Varietäten des formenreichen *R. aquatilis* betrachten wird. — Als Nachtrag zu dem S. 10 ff. über die Wasserpflanzen gesagten, will ich noch erwähnen, daß auch Detharding sich schon auf dem Wege befand sie richtig zu würdigen, wie ich erst kürzlich aus einem seiner an Betcke gerichteten Briefe ersehen habe. Er schreibt im J. 1829 an denselben: „Die *Potamogeton*-Arten sind proteusartig, weil sie Wasserpflanzen sind.“

13. *Ranunculus divaricatus* Schrk. (Link 1795) durch ganz M.; er besitzt, wie mehrere *Chara*- und *Potamogeton*-Arten, die Eigenschaft Kalk abzuscheiden, und kommt z. B. hier bei Neubrandenburg, wo diese Art häufiger ist als die vorige, in der Tolense immer stark mit Kalk incrustirt vor.

Anm. Von dieser Art besitze ich in m. Herbarium eine behaarte Varietät, leider ohne Angabe des Fundorts; dieselbe steht dem *R. aquatilis* var. *hololeucus* Loyd. parallel.

14. *Ranunculus Flammula* L. (L. Sch. 1777).

β. *reptans* F. Schultz.

Anm. Schultz sagt in der Fl. Starg. p. 141: *fateri non pudet me hanc varietatem olim pro R. reptante L. habuisse, usque dum vir aestumatissimus Dr. Link, specimine R. reptantis in albis Norvegicis lecti transmissio, errorem sustulit. Hic praecipue foliis omnibus linearibus differt, cum e contrario in varietate nostra folia caulina tantum linearia sint, radicalia vero ovato-lanceolata.*

15. *Ranunculus reptans* L. (Link 1810) am Mechower See (Link), am Lankower See bei Schwerin (Wülfmei); auch bei Hamburg ist sie an der Elbe nicht

selten, so daß ihr Vorkommen im westl. M. nichts Auffälliges mehr hat. — Link sagt von seiner Pflanze, daß sie völlig mit Ex. übereinstimme, die er aus Lappland besitze (Lk. mscr.)

16. *Ranunculus Lingua* L. (L. Sch. 1777).

17. *R. auricomus* (L. Sch. 1777).

18. *R. acris* L. (T. 1788).

19. *R. lanuginosus* L. (T. 1788) z. B. bei Neubrandenburg sehr häufig! desgl. bei Goldberg u. a. D.

20. *R. polyanthemos* L. (Brück. 1803) z. B. bei Neubrandenburg! Wolkowsche Gypsmühle, am Strande bei Warnemünde u. f. w.

β. nemorosus DC. (Deth. 1828) am Rande der Neumühler Tannen bei Schwerin, und angeblich auch noch a. a. D.

21. *R. repens* L. (L. Sch. 1777).

22. *R. bulbosus* L. (L. Sch. 1777).

Anm. Nach der Beobachtung von F. Schultz (2. Nachtrag) verliert der Stengel seine knollenförmige Anschwellung mitunter vollständig.

23. *R. sardous* Crtz. (= *Philonotis* Ehr. T. 1795) z. B. bei Neubrandenburg! Sülz, Dierhagen auf d. Fischlande u. f. w.

* 24. *R. arvensis* L. (L. Sch. 1777) mit dem Getreide auf kalkhaltigem Boden eingebürgert.

25. *R. sceleratus* L. (L. Sch. 1777).

26. *R. Ficaria* L. (L. Sch. 1777).

27. *Caltha palustris* L. (L. Sch. 1777). S. 36.

28. *Trollius europaeus* L. (L. Sch. 1777) auf den Wiesen im östlichen! und mittleren M. bis nach Pärchim hin weit verbreitet, im W. des Landes fehlend.

Eranthis hiemalis L. sp. (Vortisch 1850) auf dem Pfarrberge bei Satow unrw. Kröpelin verwildert; nicht bei Boizenburg, sondern bei Lauenburg.

Helleborus viridis L. (C. Griew. 1847, 1832! auf Bauerhöfen zu Lübbsee und Benkenhof im Klützer Ort verwildert. S. 126.

Helleborus foetidus L. (Link 1810) bei Güstrow auf dem Schloßberge der Schönninsel verwildert.

29. *Aquilegia vulgaris* L. (T. 1788) selten in den Laubholzwaldungen bei Schwerin, Güstrow, Malchin, Neugrandenburg, (vergl. S. 81)! Neustrelitz! und Schönhausen; durch Zufall mitunter (z. B. bei Daffow) zwischen der Saat verwildert. S. 138.

* 30. *Delphinium Consolida* L. (L. Sch. 1777) in Gärten und auf den Feldern als Unkraut eingebürgert. S. 138.

31. *Aconitum Napellus* L. (Zander 1849) häufig bei Barkow unweit Plau in einem kleinen Erlenbruche, an welchem ein die Nemter Lübz und Plau scheidender Bach hinströmt und sich von S. her in die Elbe ergießt! hier anscheinend wild, aber bei Karlishof! unrw. Neustrelitz angepflanzt. S. 138.

32. *Actaea spicata* L. (T. 1788) an feuchten, schattigen Stellen der Laubholzwälder durch ganz M., aber nicht häufig, z. B. bei Neubrandenburg im Nemerower Holz! Wittenborn (bei Friedland) unweit des Kreidebruches! am Weisdiner Schloßberge, bei der rothen Kirche unrw. Wolbeck, in den Ruinen der Papenhägener Kirche unrw. Rothenmoor! im Kemplinschen Holze, bei Pentzlin an der Burg und im Werderschen Garten (Betcke), bei Doberan in Buchwäldern, bei Schwerin, Parchim (auf dem Sonnenberge), bei Medow unrw. Dobertin, Klütz u. s. w. S. 138.

Berberis vulgaris L. (T. 1788) hin und wieder verwildert. Berberideae.

Epimedium alpinum L. (Brockmüller 1852) im Ludwigsflüster
Schloßgarten beim Schweizerhause verwildert.

33. *Nymphaea alba* L. (L. Sch. 1777).

2. Nymphae-
aceae.

34. *Nuphar luteum* L. sp. (L. Sch. 1777).

35. *Nuphar pumilum* Sm. (T. 1795) im See bei dem Schwinkendorfer Theerosen und in den beiden kleinen Langwitzer Seen unweit Bafedow! Außer diesen schon vor 65 Jahren von Timm angegebenen Standorten, sind bis jetzt noch keine anderweitigen in Mecklenburg bekannt geworden. — Auch in Neuvorpommern und im Geb. d. Fl. von Hamburg kennt man nur wenige vereinzelte Standorte, — wenn anders überhaupt die dortige Pflanze mit der unserigen identisch ist.

Anm. Nachdem Garcke (ed. 4) in neuester Zeit die vielen müßigen Species wieder eingezogen hat, in welche *Nymphaea alba* allmählig zersplittert worden war, hatte ich anfänglich Lust auch *N. pumilum* wieder mit der vorausgehenden Art zu verbinden, indem mir das Kennzeichen, worauf man hinsichtlich der Trennung beider besonders Gewicht zu legen pflegt (Gestalt der Narbe und Anzahl der Narbenstrahlen), wandelbar und daher unbedeutend erscheint. Bei genauerer Untersuchung meiner mecklenburgischen Exemplare, deren ich sowohl aus dem J. 1795 als auch vom J. 1859 besitze, fand ich bei diesen noch ein Merkmal, durch welches sich diese Art auffällig von *N. luteum* unterscheidet, nämlich die Blätter sind auf der unteren Fläche mit angebrückten Haaren bedeckt, wovon bei *N. luteum* nie eine Spur vorkommt. Auffällig ist es, daß von den vielen Floren, welche ich über diese Art zu Rathe gezogen habe, dies jedenfalls hier beständige Merkmal nur von einer einzigen erwähnt wird, nämlich von dem Comp. Florae Germaniae cur. Bluff et Fingerhuth, ed. 2 (1837) T. I P. 2 p. 237, wo von den Blättern gesagt ist, daß sie „subtus sericea“ seien. — Dies bringt mich auf die Vermuthung, daß in Deutschland mit dem Namen *N. pumilum* vielleicht

ganz verschiedene Dinge bezeichnet werden mögen, nämlich außer unserer Art auch noch eine kleinere Abart des *N. luteum*. Sollte dies der Fall sein, so muß der unserigen der Name *pumilum* bleiben, da er sich von Timm herschreibt, der dieselbe als *Nymphaea lutea* var. *pumila* bezeichnete.

8. *Papaveraceae*.

* 36. *Papaver Argemone* L. (L. Sch. 1777).

* 37. *Papaver Rhoeas* L. (L. Sch. 1777) S. 118.

* 38. *Papaver dubium* L. (L. Sch. 1777).

P. hybridum L. (T. 1788)* verirrt bisweilen hierher, indem es mit fremdem Saatkorn eingeschleppt wird. Timm fand es im vorigen Jahrhundert bei Malchin, Struß 1856 bei Kemplin! und 1854 ward es auch bei Volbela unweit Schwerin gesammelt. Es ist aber in seinem Vorkommen ebenso unbeständig, wie *Helminthia echinoides*, *Centaurea solstitialis* und ähnliche sporadisch unter dem Getreide erscheinende Pflanzen.

Anm. *Glavcium luteum* L. sp., mit welchem uns die deutschen Floristen beschenken, (es soll an der Ostseeküste wachsen,) ist noch von keinem mecklenburgischen Botaniker gesehen worden. Möglich wäre es, daß es auch einmal hierher, wie nach der preussischen Küste, durch Schiffsverkehr verschleppt worden wäre.

* 39. *Chelidonium majus* L. (L. Sch. 1777), eine allgemein eingebürgerte Ruderalpflanze, die hin und wieder auch mit gefüllten Blumen vorkommt. Vergl. S. 39. 118. 128.

4. *Fumariaceae*.

40. *Corydalis cava* Schw. et Körte (T. 1788) in Laubholzwaldungen durch ganz M., stellenweise sehr häufig!

41. *Corydalis intermedia* Ehrh. sp. (T. 1788) wie die vorige, sehr häufig!

42. *Corydalis solida* Sm. (Wüstnei 1854), nur bei Schwerin in der Nähe des Neumühler Sees im Gebüsch in wenigen Exemplaren gefunden. — Alle anderen von älteren Floristen angegebenen Standorte sind zu streichen, da sie nur auf einem von Schulz und Detharding veranlaßten Mißverständnisse beruhen.

Ann. Welche Form hier übrigens vorliegt, ob die Stammart (die auch bei Hamburg vorkommt), oder die nach Turatska (in den Verhandlungen der K. K. botan. zool. Gesell. in Wien, Bd. 8. Sitz. Ber. S. 81) mit ihr als Abart zu verbindende *pumila* Host. (auf Hiddens-Be und Rüben gefunden), kann ich nicht entscheiden, da ich Wislnei's Exemplare nur vor 6 Jahren einmal flüchtig gesehen habe. — Hinsichtlich der *C. pumila* Host. herrschen übrigens unter den Floristen große Meinungsverschiedenheiten; nach Neilrich und Sonder wäre sie der *C. intermedia*, nach Zabel aber der *C. solida* am nächsten verwandt, — sie scheint demnach zwischen diesen beiden Arten hin und her zu schwanken. Da nun aber diese letzteren selbst mit getheilten und ungetheilten Bracteen abändern, so wäre es im Hinblick auf diesen großen Formencyclus gar nicht unmöglich, daß Turatska Recht hätte, wenn er a. a. O. meint, daß alle jene drei angeblichen Arten nur eine einzige wirkliche Species bildeten. Die normalen Formen von *solida* und *intermedia* würden dann die beiden Endpunkte der ganzen Entwicklungsreihe bilden. Ich selbst habe *C. solida* nur einmal und zwar bei Bonn gefunden, und schon damals erschien mir ihre Abweichung von *intermedia* sehr unerheblich.

* 43. *Fumaria officinalis* L. (L. Sch. 1777) überall als Unkraut mit und unter den Culturpflanzen eingebürgert. Vergl. S. 32. 118.

F. densiflora DC. (Röper 1850) wurde im J. 1847 auf der Ballaststelle bei Warnemünde durch Schiffsverkehr eingeschleppt gefunden. Auch bei Hamburg, Greifswald und Danzig hat sie sich an ähnlichen Localitäten gezeigt.

44. *Nasturtium officinale* R. Br., L. sp. (L. Sch. 1777). 5. Cruciferae.

45. *N. amphibium* L. sp. (L. Sch. 1777).

46. *N. sylvestre* L. sp. (T. 1788).

47. *N. palustre* Leys. sp. (Schultz 1806).

(45 + 46. 46 + 47) *N. anceps* DC. Unter diesem Namen kommen zwei Bastardbildungen vor, die zwischen den drei letztgenannten Arten hin und her schwanken. In den

Blüthen gleichen beide dem *N. sylvestre* am meisten, in den Blättern und dem ganzen Habitus aber nähern sie sich bald mehr dem *amphibium*, bald dem *palustre*. — De-
tharding fand diese Pflanze an mehreren Stellen bei
Rostock, später aber ist sie dort nicht wieder gesehen wor-
den. Nach Wülfnei käme sie auch bei Schwerin vor.

48. *Barbarea vulgaris* R. Br. (L. Sch. 1777),
häufig mit der folgenden Varietät, deren spezifische Selbst-
ständigkeit Griewank sen. (Archiv VIII. S. 182) und jun.
(Crit. Stud. S. 10) vertheidigen, verwechselt. Letzterer
führt folgende Standorte an: Rostock am Pfeisenteich und
bei Schoffin, Daffow a. m. D., in der Lewitz, Flotow
bei Pentzlin, Neubrandenburg im Starg. Bruch.

β. arcuata Reichb. (Griew. 1854) bei Daffow,
Schwerin, Wismar, Lehßen bei Wittenburg, Zahren bei
Pentzlin (Griew. jun.).

49. *Barbarea stricta* Andr. (Griew. Willebr. 1847,
1842!) Prieschendorf und Schwanbeck bei Daffow, zw. Crivitz
und Schwerin, zw. Doberan und Bargesshagen, Wasdow
bei Gnoien, Ruppentin bei Plau (Griew. jun.); auf den
Peenewiesen bei Dargum (Zabel), in M. Strelitz noch
nicht gefunden.

* 50. *Barbarea praecox* R. Br. (Griew. 1854) mit
Sicherheit nur erst bei Wilmsdorf unweit Daffow nach-
gewiesen; alle übrigen älteren Angaben sind zu streichen,
da sie auf Verwechslung mit den verwandten Arten beruhen.

51. *Turritis glabra* L. (L. Sch. 1777).

52. *Arabis hirsuta* L. sp. (Schultz 1806): um
Neubrandenburg am Starg. Berge! und auf dem Datz-
berge (sehr häufig 1859!), auf den Wällen der Ravens-

burg, im Memerower Holz unweit des hohen Ufers!, ferner bei M. Memerow, bei Rostock und Schwerin a. m. D. Ludwigslust im Garten der B. Gustava.

53. *Arabis arenosa* L. sp. (Beuthe 1828) in sandigen Gegenden bei Alt- und Neustrelitz, bei Boizenburg.

54. *Arabis Thaliana* L. (T. 1788.)

A. pauciflora Grimm spec. (= *A. brassicaeformis* Wallr.) wurde im J. 1829 und 31 von Detharding im Dorfe Papendorf unweit Rostock gefunden, ist aber seitdem in Mecklenburg nicht wieder gesehen worden (Griew. jun. S. 13).

55. *Cardamine Impatiens* L. (A. Brück. 1819) bei Neubrandenburg im Stargarder Bruch und Memerower Holz vor dem hohen Ufer! im Steinfelder Holz am Pinnowsee bei Schwerin; bei Boizenburg am Wege unfern der Pretiner Fähre.

56. *Cardamine parviflora* L. (Weidner 1860!) bei Sülz. Exemplare, welche ich von dieser Fundstelle erhielt, stimmen mit Reichenbachs Abbildung sehr gut überein, nur will ich nicht verhehlen, daß an den unteren Blattstielen die länglichen Blättchen nicht immer ganzrandig sind, sondern hin und wieder einen unregelmäßigen Zahn zeigen.

57. *Cardamine hirsuta* L. (A. Brück. 1819).

β. *sylvatica* Link 1809, in schattigen Wäldern, seltner als die Stammart, welche auf freien, grasigen Plätzen wächst.

58. *Cardamine pratensis* L. (L. Sch. 1777), kommt auch mit gefüllten Blumen vor, so wie auch

β. *hirsuta*, — nicht mit *C. hirsuta* L. zu verwechseln.

59. *Cardamine amara* L. (T. 1788).

60. *Dentaria bulbifera* L. (T. 1788): bei Rakeburg häufig, bei Schwerin im Steinfelder Holz (? sie fehlt in Wülfner's Verzeichniß), Malchin im Kalenschen Holz, am hohen Steinort bei Rübels, in den Strel. Laubholzwaldungen bei Friedland, Neubrandenburg! und Neustrelitz nicht selten.

Hesperis matronalis L. (T. 1788) hin und wieder als Gartensflüchtling verwildert.

* 61. *Sisymbrium officinale* L. sp. (L. Sch. 1777), eingebürgerte Ruderalpflanze.

62. *Sisymbrium Sophia* L. (L. Sch. 1777).

63. *Alliaria officinalis* Andr. L. sp. (L. Sch. 1777).

* 64. *Erysimum cheiranthoides* L. (T. 1788).

65. *Erysimum hieracifolium* L. (D. 1809) an der Elbe bei Gothmann und Bahlendorf unweit Boizenburg, wahrscheinlich durch die Elbe aus dem mittleren Deutschland stromabwärts geführt.

Aus der Gattung *Brassica* werden die Arten *oleracea* L., *Rapa* L., *Napus* L. und *nigra* L. cultivirt, und kommen hin und wieder auch verwildert vor.

* 66. *Sinapis arvensis* L. (L. Sch. 1777), als lästiges Unkraut unter der Saat eingebürgert. S. 33. 36.

* 67. *Sinapis alba* L. (Link 1795) cultivirt und verwildert unter dem Sommergetreide; in der Daffower Gegend vor 16 Jahren noch selten, jetzt ein ebenso lästiges Unkraut als die vorausgehende Art (C. Griew.).

Diploxaxis tenuifolia L. sp. von Deth. 1793 bei Warnemünde am Bauhof gefunden, durch Ballasterde dorthin verschleppt. Schon im J. 1809 war sie dort wieder verschwunden, hat sich aber neuerdings abermals dort und bei Rostock sporadisch gezeigt. Auf gleiche

Weise ist sie nach Greifswald, und *D. muralis* nach Stralsund, Wolgast, Swinemünde, Danzig und Memel verschleppt worden.

* 68. *Alyssum calycinum* L. (Trevir. 1828) durch ganz M. verbreitet und stellenweise auf Mergelboden sehr häufig! — Ich möchte diese Pflanze für einen neueren Einwanderer halten, denn sie ist in den Gegenden von M. Strelitz, die früher von so eifrigen Botanikern wie die Brückner und F. Schultz so lange Jahre durchforscht worden sind, so häufig, daß sie, wenn sie hier damals schon vorhanden gewesen wäre, kaum hätte übersehen werden können.

69. *Alyssum incanum* L. (L. Sch. 1777) auf Sand-
schollen und sandigen Hügeln durch M. verstreuet! obgleich nicht häufig; in der Neubrandenburger Gegend z. B. nur bei Warlin!

70. *Draba verna* L. (L. Sch. 1777). S. 41.

* 71. *Cochlearia Armoracia* L. (L. Sch. 1777 fälschlich als *C. officinalis*), besonders an Flußufern durch ganz M. eingebürgert. Ueber den deutschen Namen vergl. S. 37.

72. *Cochlearia danica* L. (D. 1809) am Ufer des Breitlings a. m. St.; auf Böl nordöstlich von dem Dorfe Vorwerk, bei Dreweskirchen und wahrscheinlich an der östlichen Seite der Wismarschen Bucht noch weiter verbreitet (Griew. jun.). Eine entschiedene Salzpflanze.

73. *Cochlearia anglica* L. (C. Griew. 1847, 1843! als *officinalis*) häufig auf den Salzwiesen bei Sülten zwischen Brühl und Sternberg, desgl. auf Böl (nordöstlich von Vorwerk), an der Wismarschen Bucht dicht hinter St. Jacob; bei Brook unweit Rütz?

Anm. Ich muß gestehen, daß ich, seit mir zahlreichere Exemplare von den drei erstgenannten Standorten durch C. Griewank und Wülfmei zugekommen sind, an der von G. Griewank (Krit. Studien S. 16 f.) vorgenommenen und auch von mir früher vertheidigten Vereinigung von *C. anglica* und *officinalis* (unter dem Namen *C. Linnaei* G. Griew.) wieder irre geworden bin. So viel steht jedenfalls fest: wir kennen aus Mecklenburg bis jetzt nur eine einzige Art mit sitzenden, stengelumfassenden Blättern, und zwar ist dies, wie die normal entwickelten Exemplare zeigen, sicherlich *anglica*. Was aber die früher als *officinalis* beanspruchten Exemplare betrifft, so nähern sich dieselben dieser Art allerdings etwas, behalten aber doch in der Gestalt ihrer Schötchen, namentlich der unteren, vollkommen entwickelten, immer überwiegend den Typus der *anglica*. Exemplare, deren Schötchen alle so kugelig und klein wären, wie Reichenbach in der Iconographie Nr. 4260 sie abbildet, sind mir aus M. noch nicht zu Gesicht gekommen. Ich möchte daher glauben, daß uns die wahre *C. officinalis* in M. zur Zeit noch fehlt, und daß unsere pseudo-*officinalis* von Sükten nur durch entweder zu stark salzhaltigen oder durch sterilen Standort verkümmerte Exemplare der *anglica* sind. Auch andere Halophyten, wie z. B. *Statice Limonium* und *Aster Tripolium*, erreichen im Binnenlande um die Salzquellen lange nicht die Ueppigkeit in ihrer Entwicklung, welche sie am See-Strande auf günstigen Standorten zeigen.

* 74. *Camelina sativa* L. sp. (L. Sch. 1777) auf Meckern, besonders Flachsfeldern, vielfach eingebürgert.

β. *dentata* Pers (D. 1809) als Unkraut auf Flachsfeldern.

Anm. *C. microcarpa* Andr. ist in M. noch nicht gesehen worden; auch im Gebiete der Flora von Hamburg kommt sie nicht vor, eben so wenig wie bei Lübeck, und in Neu-Vorpommern ist sie erst neuerdings bei Remitz unv. Greifswald auf Saatäckern eingeschleppt. G. Meyer hat also nicht Recht, wenn er in seiner Fl. excur. Hannov. behauptet, daß sie in Norddeutschland häufiger sei, als *sativa*.

* 75. *Thlaspi arvense* L. (L. Sch. 1777) auf Aedern allgemein eingebürgert.

* 76. *Thlaspi campestre* L. (Thede 1806) auf Aedern eingebürgert, z. B. bei Daffow, Grabow, Rostock u. s. w.; in M. Strelitz noch nicht gefunden.

77. *Teesdalea nudicaulis* L. sp. (L. Sch. 1777).

78. *Lepidium ruderales* L. (T. 1791) am Seestrande und um Salinen, aber auch als Ruderalpflanze vorkommend, z. B. bei Rostock, Wismar und Dömitz. Diese Pflanze wird zwar schon im J. 1777 von L. Schulz unter den M. Strelitzschen aufgeführt, ist aber ebenso, wie auch *Thalictrum flavum* und *Erica Tetralix*, wohl irthümlich von ihm aufgenommen, da kein anderer Botaniker diese Pflanzen hier gefunden hat.

* 79. *Lepidium sativum* L. (G. Brück. 1841), unter Rein z. B. bei Daffow, A. Krenzlín, Kenow u. a. D. eingebürgert.

Lepidium latifolium L. (Flörke 1806), verwildert; früher bei Warnemünde und auf dem Hofe zu Lübbersdorf unweit Friedland, von welchem letzteren Standorte ich ein schon im J. 1793 gefundenes Exemplar in mein Herbarium besitze.

80. *Capsella Bursa pastoris* L. sp. (L. Sch. 1777).

β. *integrifolia* Reichb.

* 81. *Senebiera Coronopus* L. sp. (T. 1788) soll aus Sibirien stammen, aber eingebürgert in und bei Daffow, bei Wölshendorf unv. Nehna, bei Güstrow (?) Malchin an der Kirche und vor den Thoren, Quadenschönfeld unv. Stargard und wahrscheinlich auch noch a. a. D.

* 82. *Neslea paniculata* L. sp. (T. 1788) auf Aedern unter der Saat eingebürgert.

Bunias orientalis L. ist durch Schiffsverkehr nach Rostock und Warnemünde verschleppt.

83. *Cakile maritima* Scop.; L. sp. (T. 1788) See-
strandspflanze.

84. *Crambe maritima* L. (T. 1791) desgl., aber
selten: am heil. Damme bei Rethwisch, auf den hohen
Dünen zwischen Warnemünde und Markgrafenheide (Grlew.
sen. 1854), und neuerdings auch auf dem Fischlande
zwischen Dierhagen und Wustrow von Hrn. Holz in Barth
gefunden. — Diese Pflanze scheint in neuerer Zeit in M.
seltener zu werden, wie dies auch an der deutschen Nord-
seeküste der Fall sein soll.

* 85. *Raphanus Raphanistrum* L. (L. Sch. 1777),
ein bekanntes lästiges Unkraut im Getreide, von der ähn-
lichen *Sinapis arvensis* schon aus der Entfernung durch
die hellgelben Blüthen zu unterscheiden. S. 36.

6. Cistineae. 86. *Helianthemum vulgare* L. sp. (L. Sch. 1777)
auf sonnigen Hügeln durch ganz M.!

7. Viola-
rieae. 87. *Viola palustris* L. (L. Sch. 1777), besonders
häufig in der Haideebene.

88. *Viola epipsila* Ledeb. (F. Koch 1857 in Archiv
XII S. 2) im Mütschower Bruche unweit Sülz! und auch
in Pommern in den Brüchern an der Recknitz und Trebel.
Auch bei Hamburg und in Neuvorpommern kommt sie vor.

V. uliginosa Schr. (Ackerm. 1841) wurde ein einziges Mal
bei Grabow auf den Wiesen hinter der Ziegelscheune gefunden und
seitdem nicht wieder, so viel auch darnach gesucht worden ist. Daher
kann sie das Bürgerrecht in unserer Flora noch nicht beanspruchen,
zumal da ihr Vorkommen in diesem Theile Norddeutschlands ein
ganz isolirtes ist.

89. *Viola hirta* L. (A. Brück. 1803) in Laubholz-

Waldungen durch M.! jedoch im Gebiete der Grabower Flora fehlend.

Anm. Sie verändert sich weder durch Verpflanzung noch durch Aussaat, und es ist mir daher völlig räthselhaft, wie einige Floristen sie mit der folgenden Art haben vereinigen können. Beide sind hier bei Neubrandenburg häufig, Zwischenformen habe ich nie bemerkt, und selbst der Anfänger in der Botanik wird sie nicht verwechseln.

* 90. *Viola odorata* L. (L. Sch. 1777), ohne Zweifel nur durch Verwilderung eingebürgert, und stellenweise sehr häufig, wie z. B. auf den Neubrandenburger Stadtwällen! bei Pleetz unweit Friedland am Mühlenbache! u. s. w.
S. 118. 138.

91. *Viola sylvestris* Lam. (L. Sch. 1777).

β. *Riviniana* Reichb. (Schultz 1837).

92. *Viola canina* L. (D. 1828) in den sandigen Gegenden und im Haidegebiete die häufigste Art dieser Gattung! S. 138.

β. *sabulosa* Reichb. von Willebrand auf einem Sandhügel zw. Jasnitz und Strehlfirchen gefunden.

γ. *ericetorum* Schr. (Griew. sen. 1855) im Tannenzuschlag zw. Nohlsdorf und Strömkendorf unweit Wismar.

δ. *lactea* Reichenb. Icon. f. 4507! (Meyer 1828) in der Umgegend von Grabow an mehreren Orten.

Anm. Ich glaube, daß Sonder, C. Griewank (Archiv 8, 179) und Garcke (ed. 4) Recht haben, wenn sie die *V. lactea* an die Formenreihe der vielgestaltigen *V. canina* L. anschließen.

93. *Viola mirabilis* L. (Crome 1828) in Laubholzwaldungen durch M. zerstreuet, hier bei Neubrandenburg z. B. im Remerower Holz sehr häufig! Weisdin, Bruders-

dorf, Doberan, Schwerin, Ludwigslust, Redefin; fehlt bei Güstrow.

94. *Viola tricolor* L. (L. Sch. 1777). S. 118. 138.

β. *arvensis*.

γ. *syrtica* Flörke (*succulenta*) am Ostseestrande.

Außer diesen 8 Arten führt F. Schultz in seinem zweiten Nachtrage zum Prodrömus noch eine am Wege von Granzin nach Mirow gefundene *V. persicifolia* Roth. an. Da ich diese später nicht wieder gefundene Pflanze nicht gesehen habe, so muß einstweilen dahin gestellt bleiben, ob dies die echte *V. persicifolia* Schk. sei. Aufschluß darüber kann nur Schulze's in Rostock befindliches Herbarium geben.

8. *Reseda-
ceae.*

* 95. *Reseda luteola* L. (L. Sch. 1777) früher als Farbpflanze cultivirt und daher auf Dorf-Kirchhöfen u. a. Localitäten hin und wieder eingebürgert.

R. lutea L. (T. 1788) an einigen Küstenpunkten vom Auslande her eingeschleppt: bei Warnemünde (dort aber im J. 1809 schon wieder vergebens gesucht), auch bei Rakow unweit Röpelin. — Bei Schwerin aber, wo Meyer sie angiebt, kommt sie gar nicht vor, sondern wurde dort mit einem Gartenflüchtling der *R. alba* verwechselt. — Auch in Neuvorpommern nur auf dem Wiek Ballastpflege unweit Greifswald.

9. *Drosera-
ceae.*

96. *Drosera rotundifolia* L. (L. Sch. 1777) häufig auf Torfwiesen und in Fennbrüchern! S. 138.

Anm. Mit letzterem Namen bezeichnet man in M. Sümpfe mit schwimmender Pflanzenbedeckung; es ist dies ein echtes altes deutsches Wort, welches sich auch noch in der englischen Sprache in dem Worte fen (Sumpf, Morast) erhalten hat.

97. *Drosera intermedia* Hayne (F. Schultz 1806) bei Grabow, Ludwigslust! Parchim, Schwerin, Dassow, Ballin unweit Stargard.

98. *Drosera anglica* Huds. (L. Sch. 1777) weiter

verbreitet, als die vorige: bei Daffow (viel seltener als die beiden vorhergehenden), Schwerin, Güstrow, auf der Basedower Wiese bei Malchin, Penzlin auf den Burgwiesen und im Moore auf dem Felde bei Sieh-dich-um, Neustrelitz, Neubrandenburg! Krumbeck u. s. w.; in der Heideebene aber, wo die vorige nicht selten ist, scheint diese Art ganz zu fehlen.

99. *Parnassia palustris* L. (L. Sch. 1777) weit verbreitet, sogar auf Strandwiesen bei Daffow und Warnemünde.

100. *Polygala vulgaris* L. (L. Sch. 1777).

10. *Polygaleae*.

β. *comosa* Schk. (Boll 1855) sehr häufig bei Neubrandenburg auf dem Gerichtsberge! und auf Hügeln am Kupfermühlengraben! wegen ihrer Ähnlichkeit mit der Stammart aber von den früheren Botanikern übersehen; neuerdings hat sie Betcke auch bei Penzlin am Räuberberge gefunden, und ohne Zweifel ist sie auch noch viel weiter durch M. verbreitet.

101. *Polygala amara* L. (Giesebr. 1837) und zwar die Var. *uliginosa* Reich. bei Mirow, aber selten; da sie auch in dem benachbarten Vorpommern wächst (z. B. bei Anclam! und Greifswald), so hat dieser vereinzelte mecklenburgische Standort nichts Auffälliges.

102. *Gypsophila muralis* L. (T. 1788) soll nach Detharding im nördlichen M. fehlen, sonst durch das ganze Land verstreuet, wenn auch nicht häufig.

11. *Sileneae*.

103. *Dianthus prolifer* L. (T. 1788) z. B. auf dem Kirchhofe zu Penzlin (Betcke), Belvedere bei Neubrandenburg! u. s. w.

104. *Dianthus Armeria* L. (T. 1788) bei Daffow

a. m. D., bei Schwerin unter Gebüsch an der Chaussee nach Neuwühl, bei Parchim, Güstrow auf der Schöwinself, Malchin im Gränzgraben nach Duchow zu und auf den Peeneanhöhen bei Pinnow, Burg-Schütz, Penzlin am hohen Seenufer, Neustrelitz am hohen Holz, Wolbeck an der Wolfshagener Gränze; Neubrandenburg auf Belvedere und im Memrower Holz hinter dem hohen Ufer! auf dem äußeren Walle des Stargarder Schloßberges!

105. *Dianthus Carthusianorum* L. (T. 1788).

106. *Dianthus deltoides* L. (L. Sch. 1777).

107. *Dianthus superbus* L. (T. 1788) auf den Elbewiesen, bei Schwerin, Wismar, Güstrow, und im östlichen M. nicht selten!

Anm. — *D. arenarius* L. wird zwar von Detharding (1809 und 1828) als von Timm bei Fürstenberg gefunden aufgeführt, ist aber weder in Timms Herbarium vorhanden, noch auch in dessen mit Papier durchschossenem Handexemplar seines Prodrömus, in welchem er alle späteren Entdeckungen eingetragen hat, erwähnt. Da nun für diese Angabe auch keine anderweitige Bestätigung vorliegt, muß diese Art einstweilen noch aus der Zahl unserer Pflanzenbürger ausgeschlossen bleiben, obgleich mir ihr Vorkommen in jener Gegend gar nicht unwahrscheinlich ist: denn Sand giebt es dort genug, und überdies liegt der Verbreitungsbezirk dieser dem nordöstlichen Deutschland angehörigen Art jenem Landestheile nahe. — Bei Stargard (Langmann) kommt *D. arenarius* ganz gewiß nicht vor. — Dagegen sind aber einige Male verirrte Exemplare von *D. barbatus* in den Wäldern bei Neubrandenburg gefunden worden.

* 108. *Saponaria officinalis* L. (L. Sch. 1777) häufig eingebürgert.

S. Vaccaria L. ward im J. 1806 von Siemssen zwischen der Saat bei Wendorf unweit Güstrow gefunden, — ob nur zufällig dorthin verirrt, oder bleibend eingebürgert? Erstere Annahme ist mir

die wahrscheinlichere, da die Pflanze auch in der Ufermark (wo sie hin und wieder auf Flachsfeldern vorkommt,) unbeständig ist.

109. *Cucubalus baccifer* L. (Meyer 1836) wurde bisher nur einmal bei Zunder-Wehningen unweit Dömitz von Meyer (was Griewank sen. bestätigt,) gefunden, da er aber auch in der anstoßenden Altmark und Prignitz zwischen Wittenberge und Seehausen, bei Tangermünde und Havelberg im Gebiete des Elbufers vorkommt, hat jener vereinzelte mecklenburgische Standort nichts Auffallendes. Weiter abwärts an der Elbe, im Geb. der Hamburger Flora scheint diese Pflanze nicht mehr zu wachsen.

110. *Silene Otites* L. sp. (T. 1788).

111. *Silene inflata* Sm. (L. Sch. 1777).

112. *Silene nutans* L. (L. Sch. 1777).

S. Armeria (Schreib. 1853) hin und wieder als Gartensflüchtling verwilbernd. Ebenso auch

S. conica L. (Griew. jun. 1856).

113. *Lychnis Viscaria* L. (T. 1788).

114. *Lychnis flos cuculi* L. (L. Sch. 1777).

115. *Melandrium album* Mill. sp. (T. 1788).

116. *Melandrium rubrum* Weig. sp. (T. 1788).

M. noctiflorum L. sp. (D. 1828) mitunter in Gärten und auf Saatfeldern eingeschleppt.

* 117. *Agrostemma Githago* L. (L. Sch. 1777) mit dem Getreide eingebürgert.

118. *Sagina procumbens* L. (L. Sch. 1777).

12. Alsi-
neae.

119. *Sagina maritima* Don. (D. 1828) am See-
strande auf Torfwiesen bei Warnemünde häufig, desgleichen
an der Wismarschen Bucht, und am Priwal, und wahr-
scheinlich überall an ähnlichen Localitäten unserer Küste.

120. *Sagina apetala* L. (D. 1828) bei Schwerin

am faulen See, auf Weideschlägen bei Daffow nicht selten, und ohne Zweifel auch noch viel weiter durch M. verbreitet, aber ihrer Kleinheit wegen übersehen.

β. depressa F. Schultz 1819 (*glabra* Babing. sec. Sonder) bei Neubrandenburg auf dem Brodaer Felde nach Belvedere zu von Schulz entdeckt, von mir jedoch dort später vergebens gesucht.

121. *Sagina nodosa* L. sp. (L. Sch. 1777).

122. *Spergula arvensis* L. (L. Sch. 1777). S. 37.

β. maxima Weihe (C. Griew. 1855) bei Daffow häufig, aber ausschließlich auf Leinfeldern.

123. *Spergula pentandra* L. (Brück. 1803), und zwar die Form, welche man jetzt unter dem Namen *Sp. Morisonii* Bor. als eigene, von der Stammform zu trennende Species betrachten will.

124. *Spergularia rubra* L. sp. (L. Sch. 1777).

β. media Wahlb. (Link 1795) auf salzhaltigen Wiesen am Strande und um Salinen.

γ. marginata Koch (D. 1828) am Seestrande seltener als var. *β*; bei Wustrow auf dem Fischlande auch am Binnenstrande (Zabel).

Anm. — Gesteht doch Fries in der *Summa veget.* p. 156 selbst von diesen und noch einigen anderen schwedischen Formen zu: „omnes nostrae hujus generis formae sistunt seriem contiguam, cum soli salsitudine magis pinguescentem,“ und dennoch trennt er sie als Arten, weil *singula species adeo constans* sei, ut omnes distinguere utile videatur, ne diversae confundantur. Diesem zu weit getriebenen „Nützlichkeitsprincip“ zu huldigen, kann ich mich nicht entschließen. Vergl. C. Griewant im Archiv VIII, 180, welcher wenigstens der *S. marginata* die Selbstständigkeit abspricht.

125. *Honckenya peploides* L. sp. (T. 1788) am Seefrande häufig.

126. *Alsine tenuifolia* L. sp. (F. Schultz 1819).

β. *viscosa* Schreb. kommt nach Schultz mit der Stammform gemischt und in diese übergehend vor, z. B. bei Neubrandenburg, desgl. auf Brachäckern bei Daffow.

127. *Moehringia trinervia* L. sp. (T. 1788).

128. *Arenaria serpyllifolia* L. (T. 1788).

129. *Holosteum umbellatum* L. (L. Sch. 1777).

130. *Stellaria nemorum* L. (L. Sch. 1777).

131. *Stellaria media* L. sp. (L. Sch. 1777). S. 37.

132. *Stellaria Holostea* L. (L. Sch. 1777).

133. *Stellaria glauca* With. (Schultz 1806).

134. *Stellaria graminea* L. (L. Sch. 1777).

135. *Stellaria uliginosa* Mur. (T. 1788).

136. *Stellaria crassifolia* Ehr. (T. 1788). — Da sie mitunter mit der vorigen verwechselt sein mag, so bedürfen ihre von unseren Floristen angegebenen Standorte einer Revision. Als sichere kann ich nennen: bei Malchin die Wiese hinter dem Jägerhause, bei Neubrandenburg die Wiese hinter der Ruhweide, die Pfarrwiese bei Eichhorst, bei Schwerin die Wiese bei dem alten Pulverthurm, bei Neumühl, bei Daffow auf der Torfwiese am Priwal ganz nahe am Seefrande unter *Phragmites communis*.

137. *Malachium aquaticum* L. sp. (L. Sch. 1777).

138. *Cerastium glomeratum* Thuil. (L. Sch. 1777).

β. *ovatum* Pers.

139. *Cerastium semidecandrum* L. (T. 1788).

β. *glandulosum* Koch (*glutinosum* Fr.)

γ. *glaberrimum* von Brühl b. Güstrow gefunden.

140. *Cerastium triviale* Lk. (T. 1791).

141. *Cerastium arvense* L. (L. Sch. 1777).

Anm. Ob das von Langmann recipirte *C. brachypetalum* Desp. in M. vorhanden sei, ist noch sehr zweifelhaft.

19. Elati-
neae. 142. *Elatine Hydropiper* L. (Link 1810) am Me-
chower See im Räteb., an der Eude bei Gothmann, am
See zu Hörst bei Tessin, im Rahmenfelder See unweit
Penzlin! nicht bei Ludwigslust!!

143. *Elatine Alsinastrum* L. (Link 1810) am
Mechower See im Räteb., früher auch in einem Söll bei
Wulfenzin (unw. Neubrandenburg) nach den ersten Tannen
zu, seit 1830 aber verschwunden, weil das Wasserloch
völlig ausgetrocknet ist und meistens als Acker benutzt
wird (Vetste).

Anm. Die Angabe über das Vorkommen der *E. triandra*
(Archiv VI. S. 111) in M. hat Willebrand wieder zurückgenommen.

14. Lineae. 144. *Linum catharticum* L. (L. Sch. 1777); auch
auf Strandwiesen bei Dassow und Warnemünde.

145. *Radiola linoides* L. sp. (T. 1788).

15. Malva-
ceae. 146. *Malva moschata* L. (C. Griew. 1854) wurde
nur einmal im J. 1838 bei Prieschendorf unweit Dassow
gefunden, seitdem nicht wieder; an a. D. vielleicht nur
übersehen, da sie auch in den Nachbarländern nicht selten
zu sein scheint.

147. *Malva Alcea* L. (T. 1788).

β. *Dethardingii* Link 1810.

Anm. — Eine auffallende Form, welche Link für eine neue
Art hielt. Er sagt in f. Mscr.: „Fr. Dr. Detharding hat dieselbe
zu H. Karin und Petshow gefunden. Sie unterscheidet sich von
Alcea durch die schmalere Blättchen und die etwas behaarten
Samenbehälter; von *moschata* durch die breiteren äußeren Kelch-

Blätter und die sternförmig angebrückten Haare. Der Stamm ist 5 bis 6 Fuß hoch, grün, nicht bläulich, wie bei *Alcea*, so wie Blätter und Kelch mit sternförmigen Haaren bedeckt. Die Wurzelblätter sind rund, bis $\frac{1}{3}$ oder $\frac{2}{3}$ fünffach gespalten, die Blättchen sind 2 bis 3''' breit, wo sie am breitesten sind gefiedert eingeschnitten, Die Blüthen sitzen in Büscheln; die äußeren Kelche bestehen aus drei 2''', und darüber, breiten Blättern. Die Blumen sind röthlich, wie an *Alcea* gestaltet. Die Samen haben auf ihrer oberen Kante einzelne kurze Haare. Sie blühet mit *Alcea*. — Außer Detharbing und Fink scheint noch Niemand diese Pflanze beachtet zu haben. Sollte sie vielleicht ein Bastard von *Alcea* und *moschata* sein?

148. *Malva sylvestris* L. (L. Sch. 1777) in M. allgemein verbreitet; die Früchte dieser und der folgenden Art sind die „Pöppelkase“ der spielenden Kinder. S. 33. 118.

M. mauritiana L. kommt hin und wieder als Flüchtling aus den Gärten vor. — *M. crispa* L. (T. 1795) früher bei Malchin verwildert, ist wieder verschwunden.

149. *Malva neglecta* Wallr. (L. Sch. 1777).

β. litoralis Deth. (1828) mit etwas größeren Blumenblättern, am sandigen Seestrande bei Warnemünde.

150. *Malva rotundifolia* L. = *borealis* Wallm. (D. 1828) bei Rostock und Warnemünde häufig, auf der Insel Bül; außer den Küstengegenden aber nur noch bei Dömitz und Broda an der Elbe gefunden.

151. *Althaea officinalis* L. (D. 1797) hat eine ähnliche Verbreitung, wie die vorhergehende, nämlich am Seestrande bei Wustrow, Markgrafentheide und Schnatermann, aber auch am Elbufer (A. Schmidt). S. 118.

152. *Tilia platyphyllos* Scop. = *grandifolia* Ehr. ^{16. Tiliaceae.} (L. Sch. 1777). Sie ist außer den in den Diagnosen

angegebenen Kennzeichen auch durch früheren Laubausschlag, frühere Blüthezeit und dichtere Belaubung von der folgenden unterschieden, wie ich durch jahrelange Beobachtung bestätigt gefunden habe. S. 118.

153. *Tilia ulmifolia* Scop. = *parvifolia* Ehr. (T. 1788). Ueber die großen meßb. Linden vergl. S. 75.

(152 + 153) *T. intermedia* DC. (D. 1828), ein häufig angepflanzter Bastard der beiden vorigen.

17. Hypericaceae. 154. *Hypericum perforatum* L. (L. Sch. 1777). S. 118.

155. *Hypericum humifusum* L. (L. Sch. 1777).

156. *Hypericum quadrangulum* L. (L. Sch. 1777).

157. *Hypericum tetrapterum* Fr. (Brück. 1803).

158. *Hypericum pulchrum* L. (Hahn 1809) zwischen Boizenburg und Wittenburg bei Tüschow in den Tannen, und im Holz am Wege von Tüschow nach Schildfeld; in einem Gehölz bei Travemünde.

159. *Hypericum montanum* L. (T. 1788).

160. *Hypericum hirsutum* L. (C. Griew. und Willbr. 1847. 1841!) in einem Gehölz zwischen Lütjenhof und Prieschendorf unv. Dassow.

18. Acerineae. 161. *Acer campestre* L. (T. 1788). Vergl. S. 29.

162. *Acer Pseudo-Platanus* L. (L. Sch. 1777).

163. *Acer platanoides* L. (T. 1788). Alle drei Arten nicht selten in den Wäldern, die beiden letzteren auch häufig angepflanzt. S. 36.

19. Geraniaceae. 164. *Geranium pratense* L. (Thede 1806) auf Wiesen bei Boddin im A. Wittenburg, bei Tschentin unweit Ludwigslust, am Bögenteich bei Rostock. — Auch im Geh. der Flora von Hamburg a. m. D.

165. *Geranium palustre* L. (T. 1788).

166. *Geranium sanguineum* L. (Blandow 1809)
bei Waren, Grabow auf den Karstädter Bergen, am hohen
Ostseenufer bei Markgrafenheide fast bis nach Graal hin-
unter; bei der Volkowschen Gypsmühle unweit Dargun
(Zabel); Neustrelitz beim Schützenhause und bei Zierke.

167. *Geranium pusillum* L. (L. Sch. 1777).

168. *Geranium dissectum* L. (T. 1788) durch ganz
M., auch in der Haideebene (C. Griew.).

169. *Geranium columbinum* L. (T. 1788) desgl.

170. *Geranium molle* L. (L. Sch. 1777).

171. *Geranium Robertianum* L. (L. Sch. 1777).
Vergl. S. 119.

Anm. Das nur durch Fink (1795) und Bredow (1809) ver-
tretene *G. sylvaticum* L. (welches nach letzterem bei Parchim vor-
kommen soll,) bedarf wohl noch einer weiteren Befestigung, da es in
neuerer Zeit nie wieder gesehen worden ist. Gartenflüchtlinge sind
G. phaeum L. im Ludwigslust und Kempliner Park, und *G. pyre-
naicum* L. auf einem großen Rasenplatz des Findengartens zu Wismar,
wo Griewank sen. es 1855 in großer Menge fand, so wie auch bei
Rostock, wo es in den Anlagen vor dem Kröpeliner Thore vorkommt
(Griew. jun.). — Auch *Erodium moschatum* L. sp. (Landt 1837)
ist bei Mirow wohl nur verwildert.

172. *Erodium cicutarium* L. sp. (L. Sch. 1777).

173. *Impatiens Noli tangere* L. (T. 1788). S. 138. 20. Balsa-
mineae.

174. *Oxalis Acetosella* L. (L. Sch. 1777). Vergl. 21. Oxali-
deae.
S. 33. 36.

* 175. *Oxalis stricta* L. (T. 1788 als *corniculata*!)
als Gartenunkraut an mehreren Orten eingebürgert, z. B.
bei Bierhof unweit Boizenburg! Grabow, Ludwigslust,
Dassow, Güstrow, bei Neustrelitz am inneren Rande des
Thiergartens (Beuthe).

* 176. *Oxalis corniculata* L. (A. Brück. 1803) wie die vorige, aber seltener: bei Neubrandenburg! Malchin, Boizenburg? — Beide Arten sollen aus Amerika stammen.

22. Celastrineae.

177. *Evonymus europaeus* L. (L. Sch. 1777).

Vergl. S. 39. 138.

23. Rhamnaceae.

178. *Rhamnus cathartica* L. (L. Sch. 1777).

S. 41. 119. 138.

179. *Rhamnus Frangula* L. (L. Sch. 1777). S. 32.

39. 119. 138.

24. Papilionaceae.

180. *Ulex europaeus* L. (Becker 1791) an trockenen, sandigen Orten bei Elmenhorst, Klütz, Schöfjin,

zwischen Hagenow und Wittenburg, bei Grabow, Parchim, Gneven und Güdebehn unweit Krivitz, Reinshagen unv. Güstrow, zw. Satow und Berendshagen, bei Gr. Ruffewitz unv. Rostock, Gorow unv. Kröpelin, Briggow unv. Stavenhagen und Neustrelitz am Glanbecker See.

181. *Sarothamnus scoparius* L. sp. (L. Sch. 1777).

Vergl. S. 33. 138.

182. *Genista pilosa* L. (T. 1795) im Haide- und Sandgebiet häufig!

183. *Genista tinctoria* L. (L. Sch. 1777) durch ganz M., sogar am Strande bei Daffow und Warnemünde. Vergl. S. 33. 119.

β. ovata Schultz (1837): foliis ovatis obovatisque, mucronatis, glabriusculis, caule decumbente, basi divaricato-ramoso, leguminibus strigoso-pubescentibus“, — nach Schultz vielleicht eine selbstständige Art, wurde bei Mrow gefunden. Mir ist sie unbekannt.

184. *Genista germanica* L. (T. 1788).

185. *Genista anglica* L. (Link 1805) in der Haidenebene häufig! aber auch bei Daffow, Mönchsweden unv. Doberan, Krigenow unv. Rostock, und in den Röwer Tannen bei Güstrow; in M. Strelitz noch nicht gefunden.

Cytisus nigricans L. (Beckmann 1853) bei Lutterstorf unweit Wismar, ist ein Flüchtling aus dem dortigen herrschaftlichen Garten (Griew. jun.).

186. *Ononis spinosa* L. (L. Sch. 1777). S. 37. 119.

β. *angustifolia*, ästiger, dichter beblättert, viel weniger behaart und mit zahlreicheren doppelten Dornen, bei Warnemünde und Dietrichshagen, aber auch auf den Elbdeichen bei Dömitz!

187. *Ononis repens* L. (T. 1788: *arvensis*). S. 119.

β. *inermis* (mitis Gmel.).

Ononis arvensis L. = *hircina* Jacq. (Zachariae 1828). Griewant jun. (Krit. Studien S. 22) tritt meinen in Archiv II. S. 63 ausgesprochenen Zweifeln an der Richtigkeit der Angaben unserer älteren Floristen über das häufigere Vorkommen dieser Art in M. bei, und beschränkt dasselbe nur auf einen einmaligen Fund derselben an der Elbe bei Boizenburg, wohin diese Pflanze vielleicht durch Zufall verschlagen sein möge. Auch Link versichert in f. Mscr. diese Art nie in M. gesehen zu haben, und ich glaube kaum, daß wir ihr das Bürgerrecht in unserer Flora ertheilen dürfen, da sie auch in den benachbarten Floren entweder ganz fehlt (wie z. B. im Gebiete von Hamburg, in Neuborpommern und Rügen), oder wenigstens nicht sicher beglaubigt ist.

188. *Anthyllis Vulneraria* L. (L. Sch. 1777).

β. *maritima* Schweig. (*pubescens*) am Seestrb.

189. *Medicago falcata* L. (T. 1788).

β. *major* (*procumbens* Bess.).

190. *Medicago lupulina* L. (L. Sch. 1777.)

β. *Wildenowiana* bei Güstrow.

191. *Medicago minima* L. (T. 1788) seltener als die beiden vorigen, bei Grabow und Schwerin fehlend.

M. sativa L. (Deth. 1809) die Luzerne, cultivirt und selten verwildert. Auch *M. maculata* Willd. wurde im Sommer 1855 bei Warnemünde an einer Stelle gefunden, wo im vorausgehenden Winter französischer Ballast ausgeladen war (Griem. jun. S. 8).

192. *Melilotus dentata* Pers. (Wüst. 1856) auf Poel am Kirchsee bei Kirchdorf ziemlich dicht am Rande des Wassers wachsend; auf Salzwiesen bei Warnemünde schon von Detharding gefunden, aber von ihm fälschlich als *M. arvensis* Wallr. bestimmt.

193. *Melilotus macrorrhiza* Pers. (L. Sch. 1777) fehlt bei Grabow und Schwerin. S. 119.

194. *Melilotus officinalis* Desr. (Langm. 1841) bei Daffow, Schwerin u. a. D. an Wegen.

* 195. *Melilotus alba* Desr. (T. 1788) soll aus Sibirien stammen, und wäre demnach nur eingebürgert.

* 196. *Trifolium pratense* L. (L. Sch. 1777) cultivirt, aber auch verwildert und vollständig eingebürgert. S. 35.

197. *Trifolium alpestre* L. (T. 1788).

198. *Trifolium arvense* L. (L. Sch. 1777) durch ganz M., in den sandigen Gegenden aber oft die Brachfelder wie mit einem grauen Schleier bedeckend. S. 37. 119.

199. *Trifolium striatum* L. (Link 1810) bei Daffow am hohen Seeufer, bei Warnemünde am Strande, bei Barthelsdorf, und in der Umgegend von Penzlin: zwischen Gr. Helle und Flotow, zw. dem Gr. Heller Holz und Buchow, zw. Mölln und der Meierei.

Ann. *T. scabrum* L. kommt in M. nicht vor.

200. *Trifolium medium* L. (Brück. 1803.)

201. *Trifolium fragiferum* L. (T. 1795) weit verbreitet, sogar auf den Strandwiesen.

202. *Trifolium montanum* L. (T. 1788) Neubrandenburg! Brudersdorf u. s. w., bei Warnemünde selbst am Strande; fehlt aber bei Schwerin.

* 203. *Trifolium repens* L. (L. Sch. 1777) — nur eingebürgert?

204. *Trifolium hybridum* L. (T. 1788).

205. *Trifolium agrarium* L. (L. Sch. 1777).

206. *Trifolium procumbens* L. (T. 1788).

β. *majus* = *T. campestre* Schreb.

207. *Trifolium filiforme* L. (Link 1795).

208. *Lotus corniculatus* L. (L. Sch. 1777) S. 13.

β. *uliginosus* Schrk. (Link 1810) nicht selten in der Nähe der Stammart, an feuchten, schattigen Orten.

γ. *tenuifolius* Reich. (Griew. sen. 1851) auf salzhaltigen Wiesen bei Dassow häufig.

Galega officinalis L. hin und wieder als Flüchtling aus den Gärten.

209. *Astragalus arenarius* L. (v. Kamptz 1806) bei Rakeidüt unv. Mirow; vielleicht im südlichen (leider noch wenig durchforschten!) Sandgebiete noch weiter verbreitet.

210. *Astragalus Cicer* L. (T. 1788) mit Ausnahme des Haide- und Sandgebietes durch ganz M. verstreuet, aber nicht häufig, z. B. bei Neubrandenburg im Brodaschen Holz! Pleek! Richtenberg! Penzlin und Remplin (Vetche), zwischen Teterow und Güstrow u. s. w.

211. *Astragalus glycyphyllos* L. (L. Sch. 1777).

212. *Ornithopus perpusillus* L. (L. Sch. 1777).

213. *Vicia dumetorum* L. (L. Sch. 1777), durch M. zerstreuet und nicht häufig; z. B. bei Schwerin, Malchin, Dargun, Penzlin, Neustrelitz, Neubrandenburg im Dornestrüpp hinter der Heidemühle beim Eingange in das Mühlenholz!

214. *Vicia Cracca* L. (L. Sch. 1777).

215. *Vicia tenuifolia* Roth. (T. 1795 als *V. Gerardi*) in Torfwiesen bei Pötnitz unv. Daffow, bei Grabow und Drefahl, bei Regow unv. Malchin, Penzlin, bei Neubrandenburg auf Belvedere am steilen Seeufer! ebendasselbst am Gerichts- und Dagberge! bei Kl. Nemerow!

Anm. *V. villosa* Roth. (bei Langmann) wurde von Drewes nicht auf mecklenburgischem Boden gefunden, sondern in der Wittstoder Haide auf preuß. Gebiete, obgleich dicht an der mecklenb. Gränze.

216. *Vicia sepium* L. (T. 1788).

217. *Vicia angustifolia* Roth. (T. 1791).

β. *sativa* L. (T. 1788) cultivirt und verwildert.

218. *Vicia lathyroides* L. (T. 1791); weit verbreitet, bei Warnemünde sogar am Strande.

219. *Vicia pisiformis* L. (T. 1795) bei Görslow unweit Schwerin am Rande des Holzes nach dem Felde zu, bei Seedorf am Malchiner See, bei Neubrandenburg am Dagberge und im Nemerower Holz.

220. *Vicia sylvatica* L. (T. 1788) mit Ausnahme des Haide- und Sandgebietes in Laubholzwaldungen durch M. (besonders durch das östliche!) zerstreuet, bei Neubrandenburg z. B. im Mühlenholze häufig, noch viel häufiger aber im Nemerower Holze, vergl. S. 81.

221. *Vicia cassubica* L. (Link 1795), wie die vorige Art.

* 222. *Ervum hirsutum* L. (T. 1788) als Unkraut eingebürgert.

* 223. *Ervum tetraspermum* L. (T. 1795) desgleichen.

E. monanthos L. (Griew. sen. 1854) kommt hin und wieder auch schon verwildert vor. (S. 114.)

224. *Pisum maritimum* L. (T. 1791) am See-
strande: zw. Warnemünde und Markgrafenheide häufig;
bei Voltenhagen?

225. *Lathyrus pratensis* L. (L. Sch. 1777).

226. *Lathyrus palustris* L. (T. 1791) an Seen
auf sumpfigen Wiesen, und an den Ufern unserer größeren
Flüsse, z. B. der Elbe! Peene, Tolenze! aber auch auf
den Burgwall-Wiesen bei Bölkow unv. Güstrow, so wie
am Seestrande bei Warnemünde.

β. tenuifolius Mey. (C. Griew. 1851!) auf
den Stepenigwiesen bei Daffow.

227. *Lathyrus sylvestris* L. (T. 1788) in Laubholz-
wäldungen durch ganz M., z. B. bei Ludwigslust! Waren!
Feldberg! Neubrandenburg! S. 81.

L. tuberosus L. (Treviranus 1828) ist mit Sicherheit früher
nur einmal bei Barthelsdorf und Bieslow unv. Rostock zwischen der
Saat gefunden worden, wahrscheinlich nur zufällig dorthin verirrt. —
Alle anderen angeblichen Fundorte sind bei unseren Floristen zu
streichen; ebenso auch der *L. sepium* Scop. bei Langmann. — In
den benachbarten Floren kommt *L. tuber.* bei Lübeck (selten) und in
der Ufermark vor.

228. *Orobis vernus* L. (T. 1788) fehlt im Haide-
und Sandgebiet.

229. *Orobis niger* L. (T. 1791) fehlt ebendasselbst.

230. *Orob. tuberosus* L. (L. Sch. 1777), häufig
 z. B. bei Neubrandenburg! Staven! Pleeg! u. s. w.

25. Amyg-
 daleae.

231. *Prunus spinosa* L. (L. Sch. 1777) ein durch
 bessere Bodencultur in den letzten Jahrzehnten in seiner
 Verbreitung sehr viel mehr beschränktes Gesträuch. S. 119.

* 232. *Prunus insititia* L. (T. 1788), wahrscheinlich
 nur eingebürgert und von den besseren Pflaumen-Arten
 jetzt immer mehr wieder verdrängt. S. 35.

* 233. *Prunus avium* L. (T. 1788). Ob nur ein-
 gebürgert? S. 41.

234. *Prunus Padus* L. (L. Sch. 1777). S. 32. 119.

26. Rosa-
 ceae.

235. *Spiraea Ulmaria* L. (L. Sch. 1777).

β. *discolor* (glauca F. Schultz).

236. *Spiraea Filipendula* L. (L. Sch. 1777) zer-
 streuet durch M. und viel seltener als die vorige, z. B.
 bei Zirjow unth. Neubrandenburg! sehr häufig auf der
 Bresenwig-Dischleher Gränze unth. Friedland (G. Brückn.),
 bei Malchin (Vetche), bei der Wolkowschen Gypsmühle
 (Zabel); am Strande bei Warnemünde, und selbst im
 Gebiete der Grabower Flora.

237. *Geum urbanum* L. (L. Sch. 1777). S. 119.

238. *Geum rivale* L. (L. Sch. 1777).

(237 + 238.) *Geum urbano-rivale* Schiede (Flörke
 1828) ein hin und wieder (z. B. bei Daffow, Mönch-
 weden unth. Doberan, Güstrow im Töpferkuhlenbruch)
 auftauchender Bastard der beiden vorigen, und in seinem
 Habitus zwischen ihnen hin und her schwankend. Der hybride
 Ursprung dieser Pflanze ist durch künstliche Befruchtung er-
 wiesen, aber dennoch ist dieser Bastard fruchtbar! (Fries.
 Nov. p. 167).

Anm. Die jetzt folgende Gattung *Rubus* ist wegen der Wandelbarkeit ihrer Formen, die am schwierigsten zu enträthselnde in unserer ganzen phanerogamischen Flora, und bei keiner anderen Gattung gehen die Ansichten, was Art und was nur Varietät sei, so weit auseinander, wie hinsichtlich dieser Gattung. Da ich mich selbst nicht speciell mit derselben beschäftigt habe, so werde ich in der Aufzählung der Arten der trefflichen monographischen Bearbeitung unserer Brombeersfräucher folgen, welche Dr. Betcke im 4. Jahreshefte des Archivs S. 73 bis 144 gegeben hat. Wenn ich dabei nicht umhin kann, eine kleine Reduction der dort aufgezählten 18 Arten vorzunehmen, welche späterhin durch Betckes briefliche Mittheilung noch um 2 neue vermehrt worden sind, so will ich mit dieser meiner Ansicht einem vielleicht besser begründeten Urtheile nicht vorgreifen. Mein Zweck, eine möglichst vollständige Uebersicht unserer Flora zu geben, wird durch mein Verfahren nicht beeinträchtigt, denn in dieser Beziehung kommt wenig darauf an, ob die in M. wachsenden Pflanzen als Arten oder als Varietäten aufgeführt werden, wenn nur keine charakteristische Form gänzlich mit Stillschweigen übergangen wird.

239. *Rubus Idaeus* L. (L. Sch. 1777). Betcke Monogr. S. 81 (S. 33. 119).

240. *Rubus fruticosus* L. (F. Schultz 1806 als *corylifolius*) B. S. 89. Weit verbreitet in M. S. 31. 35.

β. *suberectus* Anders. (Bet. 1850 p. 85).

γ. *affinis* W. N. (Bet. 1850 p. 93).

241. *Rubus thyrsoides* Wim. (F. Schultz 1806 als *fruticosus*). B. S. 96. Durch ganz Mecklenburg.

242. *Rubus vulgaris* W. N. (Bet. 1854 in litt.).

β. *sylvaticus* W. N. (B. 1854 in litt.).

γ. *discolor* W. N. (B. 1850 p. 98).

δ. *villicaulis* Köh. (B. 1850 p. 103).

Die Stammart und Var. β. sind bei Grabow gefunden worden, γ. bei der Wanghaer Papiermühle und in

der Umgegend von Daffow, d. in der Pentzliner Gegend: am Rapißer Holze hinter den Buchowschen Bergen und in den hohen Tannen hinter Rabelsdorf bei Flotow.

243. *Rubus Radula* W. N. (Betcke 1850 p. 107) sehr häufig in M.

244. *Rubus horridus* Hartm. (Bet. 1850 p. 132) in der Basedower Haide zw. Gielow und Langwitz dicht vor dem Theerofen, links in den Tannen.

245. *Rubus rudis* W. N. (C. Griew. und Willebr. 1850. 1841!) B. S. 129 nur erst in den Hambergen bei Grevismühlen gefunden (wo der Fußsteig nach Wismar den Weg von Grevismühlen nach Eversdorf durchschneidet, zur rechten Hand unter Eichen).

246. *Rubus Sprengelii* W. N. (F. Timm 1850) B. S. 135; am Wege zw. Neubasedow und Liepen, auf dem Schelfwerder und in den Neumühlfchen Tannen bei Schwerin, in der großen Bekow bei Hagenow, bei Israelsdorf unv. Daffow.

247. *Rubus dumetorum* W. N. (Wredow 1812 als *nemorosus*) B. S. 117; häufig.

β. *corylifolius* Betcke! nicht Sm. (Willebr. u. C. Griew. 1850. 1841!) B. S. 114; bei der Rütjenhöfer Windmühle in der Nähe des Daffower Binnensees.

γ. *Wahlenbergii* Arrh. (B. 1850 p. 141) in einem trockenen Graben vor den Möllensdorfer Tannen bei Pentzlin.

248. *Rubus glandulosus* Bell. (Prahl 1837) B. S. 122. zerstreuet durch M. und nicht gerade häufig.

β. *thyrsiflorus* Betcke 1850 p. 125 (an W. N.?) um Pentzlin an mehreren Stellen.

249. *Rubus caesius* L. (L. Sch. 1777). B. C.
138. (C. 32).

250. *Rubus saxatilis* L. (Siems. 1805) B. C. 143.

251. *Fragaria vesca* L. (L. Sch. 1777). C. 30.

252. *Fragaria elatior* L. (D. 1828) viel seltener als die vorige z. B. bei Brudersdorf unweit Dargun (G. Brück.), bei Neustrelitz, Neubrandenburg im Nemerower Holz! bei Gehmendorf, bei Güstrow auf dem Heideberge.

253. *Fragaria collina* Ehr. (T. 1795) scheint im ganzen westlichen M. zu fehlen, aber bei Güstrow, Kemplin, Stavenhagen, und in M. Strelitz nicht selten! C. 35.

254. *Comarum palustre* L. (L. Sch. 1777).

255. *Potentilla supina* L. (Knochenhauer 1837) bei Neubrandenburg am Rande des kleinen Ihlenpohls, und an dem Bache zw. der Bierradenmühle und dem Tolense=See! (wo sie aber wieder verschwunden zu sein scheint); bei Staven unw. Friedland, bei Grabow im Gränzdorfe Warnow.

256. *Potentilla anserina* L. (L. Sch. 1777).

β. *sericea*.

P. recta L. (Schreiber 1853) als Gartenflüchtling bei Ludwigslust.

257. *Potentilla argentea* L. (L. Sch. 1777).

258. *Potentilla reptans* L. (L. Sch. 1777).

259. *Potentilla procumbens* Sibth., L. sp. (Thede 1806) häufig, z. B. bei Daffow, Grabow, Ludwigslust, Parchim, Mirow, Ballin unw. Stargard, Neustrelitz.

260. *Potentilla Tormentilla* Sibth., L. sp. (L. Sch. 1777). C. 119.

261. *Potentilla verna* L. (Prahl 1837), — von den früheren Botanikern mit *opaca* verwechselt, weshalb auf die von ihnen angegebenen Standorte keine Rücksicht genommen werden kann. — Sie findet sich bei Güstrow an trockenen, sonnigen Orten vor den Rößer Tannen (Prahl,) am Weinberge bei Mirow (Gieschr.), bei Schwerin auf dem Exercierplatze der Artillerie (Wüst.), auf dem Priwal mit *opaca* (C. Griew.), bei Seedorf und Bafedow, Zahren und Ankershagen (Betsche), bei Neustrelitz auf dem Turnplatze (Langm.), — gehört also entschieden dem Gebiete unserer Sandflora an.

β. cinerea Chaix (Beuthe 1850) bei Neustrelitz a. m. D. z. B. im russischen Lager, an den Bergabhängen beim herrschaftlichen Bauhose in der Nähe der Schlosskoppel! ohne Zweifel auch noch viel weiter im südlichen sandigen Theile von M. Strelitz (im Verbreitungsbezirke der *Euphorbia Cyparissias*!) vorhanden, aber übersehen, da dieser Landstrich (mit Ausnahme der Umgegend von Mirow) in botanischer Hinsicht leider fast noch eine *terra incognita* für uns ist.

Anm. Früher, so lange ich nur die dichtbehaarten, graufilzigen Exemplare dieser Abart kannte, die ich in der Mark bei Müllersdorf gesammelt hatte, hielt ich dieselbe für eine selbstständige Art; allein die Neustrelitzer Ex. stehen zwischen dieser und der gewöhnlichen Form der *P. verna* so in der Mitte, daß eine spezifische Trennung unmöglich wird.

262. *Potentilla opaca* L. (T. 1788), gehört vielleicht auch noch der Formreihe der *P. verna* an.

263. *Potentilla sterilis* L. (C. Griew. 1847. 1838!) bei Daffow auf buschigen Hügeln und an Bachabhängen nicht selten! desgl. bei Wölschendorf untr. Rehna (Brockmüller).

P. alba L. (Langm. 1850) im Ludwigslust'schen Schloßgarten verwildert, und wahrscheinlich eben so im Adamsdorfer Holz unv. Neustrelitz, wo sie gleichfalls vorkommen soll.

264. *Agrimonia Eupatoria* L. (L. Sch. 1777)
S. 119.

265. *Agrimonia odorata* Mill. (Betzke 1851) im Gr. Heller Holz unv. Pentzlin (B.), bei Malchin im Pinnower Walde und in der Wolkowschen Haide bei Dargun (Zabel), bei Schwan und Daffow; sogar am Strande am Rande der Rostocker Haide. — Sollte dies wirklich etwas mehr als eine üppige Waldform der vorigen sein?

266. *Rosa canina* L. (L. Sch. 1777) zu welcher auch *L. Swartzii* Deth., *collina* und *sylvestris* F. Schultz als Formen gehören. S. 33. 41.

267. *Rosa rubiginosa* L. (T. 1795).

β. *glutinosa* F. Schultz.

268. *Rosa tomentosa* Sm. (L. Sch. 1777).

R. pimpinellifolia DC. Gartenflüchtling bei Ludwigslust.

R. lucida Ehr. (Treviranus 1828) aus Nordamerika stammend, ward vor Jahren einmal am Ostseestrande unfern Rostock gefunden, seitdem nicht wieder; auch bei Hamburg ist sie verwildert.

R. cinnamomea L. (Link 1810) und *turbinata* Ait. (Schultz 1837) gleichfalls hin und wieder verwildert.

Anm. *R. arvensis* in Schultz Fl. Starg. ist zu streichen.

269. *Alchemilla vulgaris* L. (T. 1788).

27. *Sanguisorbeae*.

β. *montana* W. wurde nach Zinn (1810) einmal von Thede gefunden; der Standort ist nicht näher bezeichnet.

270. *Alchemilla arvensis* L. sp. (T. 1788).

271. *Sanguisorba officinalis* L. (D. 1809) in den

Markower Wiesen bei Barmen zw. Robande und Dehmen, zu Ludwigslust bei der Laascher Brücke! bei Rostock, Neustrelitz auf der Schloßkoppel, bei Leppin unv. Starzgard auf einer Wiese bei der Kölpiner Brücke.

272. *Poterium Sanguisorba* L. (T. 1788).

28. Poma-
ceae.

273. *Crataegus Oxyacantha* L. (L. Sch. 1777).

β. monogyna Jacq. (Brück. 1803, nicht Timm, dessen *monogyna* nach Ausweis von Originalen Exemplaren in meinem Herbarium sich nur durch Fehlschlagen des einen Griffels von der Normalform unterscheiden). Bei Neubrandenburg fast so häufig wie *oxyac. α.*, und wahrscheinlich auch ebenso im übrigen Mecklenburg.

Anm. Durch genaues Studium beider Formen bin ich zu der Ueberzeugung gelangt, daß zu ihrer specifischen Trennung keine beständigen charakteristischen Merkmale vorhanden sind. Beide kommen mit 1 und 2 Griffeln vor; beide werden baumartig (*oxyac.* erreicht hier auf dem langen Walle eine Höhe von mehr als 20' und der Stamm unten eine Dicke von 8" im Durchmesser); beide blühen gleichzeitig; bei tief-fiederspaltigen Blättern sind die Blüthenstiele bei einigen Pflanzen zottig, bei anderen glatt, ja beides kommt bei einer und derselben Pflanze vor; sind die Blüthenstiele behaart, so pflegen es auch die jungen Blätter in stärkerem Maaße zu sein, obgleich dieselben auch bei den Pflanzen mit glatten Blüthenstielen wenigstens auf den Atern schwach behaart zu sein pflegen; die Form der Blätter ist sehr wandelbar, im Umriß vom Ei-runden bis zum Keil-rautenförmigen; mit den am meisten rundlichen und am wenigsten eingeschnittenen Blättern fand ich nur glatte Blüthenstiele verbunden, eine Form, welche den normalen *C. oxyacantha* darstellt. — Studiert man die beiden Formen nur in Herbarien, wo vielleicht nur die Extreme ihrer Gestalt aufbewahrt sind, so scheinen sie allerdings auf den ersten Blick sehr verschieden, aber diese Täuschung verschwindet, sobald man Gelegenheit hat, sie lebend in zahlreichen Ex. zu vergleichen. — Auch Griewank sen. gesteht brieflich zu, daß die Blattform

sehr veränderlich sei, und daß von der Behaarung der Blüthenstiele und Kelche kein Unterschied hergenommen werden könne, will aber dennoch einen solchen in der Blüthezeit finden, indem monogyna 14 Tage später blühe, so wie darin, daß bei monog. die Kelchzipfel, wenn die Blumenblätter noch in der Knospe zusammengeballt sind, weit über diese hinausragen, während des Aufblühens sich zurückschlagen und mit ihrer ganzen Länge an die Kelchröhre anlegen, — ferner, daß die einweibigen Griffel liegen und gekrümmter sind, und daß die Blätter im Allgemeinen viel schmaler, gegen den Blattstiel keilsförmiger und vorn mit spitzeren Zipfeln versehen sind, als bei *Oxyacantha*. — Ich habe diese von der meinigen abweichende Ansicht dieses gründlichen Kenners unserer Flora den Botanikern nicht vorenthalten wollen.

274. *Pyrus communis* L. (L. Sch. 1777).

275. *Pyrus Malus* L. (L. Sch. 1777) beide im wilden Zustande von Jahr zu Jahr seltener werdend. S. 34.

276. *Sorbus Aucuparia* L. (L. Sch. 1777). S. 38.

277. *Sorbus torminalis* L. sp. (T. 1791) kommt nur in wenigen Waldungen vor: im Steinfeld der Holz bei Schwerin, in der Rostocker Haide, im Zülchendorfer Holz, in der Bafedower Forst bei Seedorf, im Wrodowschen Holz unv. Pentzlin, an der Tolenze: im Nemerower Holz auf dem hohen Ufer! und bei Meiershof! S. 39.

Anm. Wenn G. Meyer in s. Fl. excurs. Hannov. die Meinung ausspricht, daß dieser Baum in M. nicht wild, sondern nur angepflanzt sei, so kann ich dieselbe nicht theilen; bei Neubrandenburg z. B. ist er mitten im Nemerower Holz zahlreich (aber selten blühend und Früchte tragend!), und dort schon seit einer Zeit vorhanden, zu welcher man in M. die Forsten mehr zu vertilgen, als zu cultiviren suchte. Auch sein Vorkommen in der Stubnitz auf Rügen spricht für sein Indigenat im nördlichen Deutschland.

29. Onag-
riae.

278. *Epilobium angustifolium* L. (T. 1791).

279. *Epilobium hirsutum* L. (L. Sch. 1777).

280. *Epilobium parviflorum* Schreb. (T. 1791).

281. *Epilobium montanum* L. (L. Sch. 1777).

β. *verticillatum*.

γ. *lanceolatum*.

282. *Epilobium roseum* Schreb. (T. 1791).

283. *Epilobium tetragonum* L.! *adnatum* Gries.
(T. 1791) an Uferrändern bei Daffow, im Gebiete der
Flora von Grabow a. m. D., bei Malchin vor dem
Mühlenthore an der Peene, bei Neustrelitz hinter dem
Glambecker See.

284. *Epilobium palustre* L. (L. Sch. 1777).

Anm. *E. virgatum* bei Brodmüller und Schreiber ist zu
streichen.

* 285. *Oenothera biennis* L. (T. 1791) aus Virgi-
nien stammend, früher zu Küchenzwecken cultivirt, jetzt in
der Nähe der Städte und Dörfer häufig verwildert!

* 286. *Oenothera muricata* L. (Schmidt 1828) hat
sich besonders an den Elbufern von Dresden bis Blan-
kenese eingebürgert; sie soll aus Canada stammen.

287. *Circaea lutetiana* L. (L. Sch. 1777) durch
ganz Mecklenburg!

288. *Circaea alpina* L. (L. Sch. 1788) besonders
in der Haideebene!

(287 + 288.) *C. intermedia* Ehr., ein unfruchtbarer
Bastard der beiden vorigen, und in seinen Formen zwischen
den beiden Stammarten schwankend.

Anm. *Trapa natans* L. soll früher in der Lewitz gefunden
sein, vergl. S. 69. In länger als siebenzig Jahren ist sie aber

keinem unserer Botaniker zu Gesichte gekommen und vielleicht ausgestorben, wie dies auch in Holstein mit ihr der Fall zu sein scheint. Ältere holsteinsche Floren führen sie noch auf, in den neueren fehlt sie: zuletzt scheint sie vor einigen Jahrzehnten in der Stecknitz gefunden zu sein; jetzt kommen ihre wohlerhaltenen Früchte nur noch in einer mit Geschiebesand bedeckten Papiertorf-Schicht in einer Anhöhe bei Lauenburg im halb fossilen Zustande vor (s. Leonhard und Bronn neues Jahrb. f. Mineral. u. s. w. 1854 S. 36). — Ueberhaupt scheint diese Pflanze in ganz Norddeutschland immer seltener zu werden und bei Danzig, so wie in Schweden ist sie schon gänzlich ausgestorben. Vergl. S. 190.

289. *Myriophyllum verticillatum* L. (T. 1788). 30. Haloragae.

290. *Myriophyllum spicatum* L. (L. Sch. 1777).

291. *Myriophyllum alterniflorum* DC. (Ramelow 1856) bei Gadebusch im Rosenhagener und Frauenmarker See, so wie bei Dutzow. — Die specifische Trennung dieser Art von der vorhergehenden wäre nach G. Meyer noch näher zu prüfen.

292. *Hippuris vulgaris* L. (L. Sch. 1777). 31. Hippurideae.

β. *fluitans* mit langem (nach Detharding bis 6'), fluthenden und schlaffen Stengel, und 2 bis 3" langen, über 1" breiten, gleichfalls schlaffen Blättern, mit der Spitze etwa 1' hoch aus dem Wasser hervorragend, in diesem Theile die Gestalt der Stammform annehmend, blühend und Früchte tragend. In fließendem Wasser z. B. in der Warnow zwischen der Fähre und Gehlsdorf.

γ. ? *undulata* Boll (1857). In dem Tolense-See unweit der Bogelstange fand ich bei einer Wassertiefe von 5 bis 6 Fuß häufig eine *Hippuris* zwischen *Fontinalis antipyretica* und Charen wachsend, die mir sehr auffallend war und sich vielleicht als neue Species herausstellen möchte.

Ann. Der Stengel ist lang und schlaff, nicht über den Wasserspiegel hervorragend, unfruchtbar; Blätter $1\frac{1}{2}$ bis 2 Zoll lang, 1" breit, schlaff, einnervig, durchscheinend, am Rande sehr zart wellig-gekräuselt (ein Merkmal, welches beim Pressen der Pflanze für das Herbarium leider verloren geht!); 12 Blätter in jedem Quirl. — Ich werde diese Pflanze noch ferner im Auge behalten.

δ. maritima sehr klein (4 bis 5"), mit nur 4 bis 6 Blättern in jedem Quirl; auf trockenen Salzwiesen bei Dietrichshagen.

32. Callitricheae.

293. *Callitriche verna* L. (L. Sch. 1777) eine sehr veränderliche Art, deren Formen auch schon in unseren mecklenburgischen Florenverzeichnissen als *C. stagnalis*, *platicarpa*, *vernalis* aufgetaucht sind.

294. *Callitriche autumnalis* L. (Link 1810) im Mechower See bei Ratzburg, in der Haideebene nicht selten! desgleichen bei Schwerin, bei Neustrelitz in den Gräben am Wege nach der Kalkhorst, bei Eichhorst unweit Friedland am Rande des Teiches hinter dem Hofgarten, im Peutscher See (Vetche).

32. Ceratophylleae.

295. *Ceratophyllum demersum* L. (T. 1788).

296. *C. submersum* L. (F. Schultz 1828) bei Neustrelitz in einem Graben, der zum Glanbecker See führt.

34. Lythraceae.

297. *Lythrum Salicaria* L. (L. Sch. 1777).

298. *Peplis Portula* L. (T. 1788); an vielen Orten, auch am Strande bei Warnemünde.

35. Cucurbitaceae.

* 299. *Bryonia alba* L. (L. Sch. 1777). S. 40. 119. 138.

Ann. *B. dioica* Jacq. soll nach Brockmüller (1852) in der Gegend von Gnoien gefunden, und zwar dort gar nicht selten sein.

Da dieses Vorkommen aber ganz vereinzelt im nordöstlichen Deutschland bestehen würde, bedarf es jedenfalls noch einer weiteren Bestätigung; sehr bedenklich ist mir namentlich der Umstand, daß die Botaniker in Gnoien (Guth und Urndt) diese Pflanze in dortiger Gegend noch nicht gefunden haben. Der nordwestlichste bekannte Punkt in Deutschland, wo sie vorkommt, ist Lübeck; auch bei Hamburg ziemlich häufig.

300. *Montia fontana* L. (T. 1788).

36. Portulacaceae.

β. *rivularis* Gm. (D. 1828) mit 1' langem fluthenden Stengel z. B. bei Boizenburg in einer Quelle am Elbberge unterhalb Vierhof.

Portulaca oleracea L. wurde früher häufiger als jetzt cultivirt, und ist in manchen Gärten verwildert.

301. *Corrigiola litoralis* L. (Blandow 1806) im Halde- und Sandgebiete häufig! 37. Paronychiaeae.

302. *Herniaria glabra* L. (L. Sch. 1777).

303. *Illecebrum verticillatum* L. (T. 1791) im Halde- und Sandgebiete häufig! fehlt im nördlichen M.

304. *Scleranthus annuus* L. (L. Sch. 1777). 38. Scleranthaceae.

305. *S. perennis* L. (T. 1788). S. 34.

306. *Sedum Telephium* L. (T. 1788). 39. Crassulaceae.

β. *purpurascens* Koch (Brück. 1817) seltener als die Stammart und mehr im südlichen Landestheile.

S. album L. (Link 1810) auf Steinmauern um Magdeburg, früher auch an der Schweriner Schloßmauer; Neustrelitz bei der Schloßkoppel und beim Schützenhause, ist wohl ebenso nur verwildert, wie dies ohne Zweifel mit dem von Schultze Meyer zu Schwerin (1853) an der Eisenbahnabzweigung in großer Menge gefundenen *S. hybridum* L. der Fall ist.

307. *Sedum acre* L. (L. Sch. 1777). Hierher gehört auch *S. sexangulare* der meklenb. Floristen mit Ausnahme Rink. S. 138.

308. *Sedum boloniense* Lois. (Link 1810) bei Klocksin südlich vom Malchiner See auf Hügeln in der Nähe der Peene; ohne Zweifel auch noch weiter in M. verbreitet, aber nicht beachtet.

309. *Sedum reflexum* L. (L. Sch. 1777) in den Wäldern um Neubrandenburg nicht selten! bei der Wolkow'schen Gypsmühle unzw. Dargun, u. a. D.

Sempervivum tectorum L. (L. Sch. 1777) häufig auf den Dächern der Ställe und Schweineföben angepflanzt. S. 131.

40. Grossulariaceae.

* 310. *Ribes Grossularia* L. (T. 1788).

311. *R. alpinum* L. (Siems. 1805) im Sulchendorfer Holz unzw. Rostock, Schwerin in Steinfeldes Holz und auf dem Werder, Parchim auf dem Sonnenberge, Below südlich von Röbel. S. 39.

Anm. Nach ihrem häufigen Vorkommen in den Wäldern der rügianischen Halbinsel Jasmund zu urtheilen, scheint diese Pflanze kalkhaltigen Boden zu lieben.

312. *R. nigrum* L. (L. Sch. 1777). S. 29.

* 313. *R. rubrum* L. (T. 1788).

41. Saxifragaceae.

314. *Saxifraga Hirculus* L. (L. Sch. 1777) auf Wiesen bei Schwerin, Güstrow, Sildemow, Sülz, Malchin, Dargun! Gr. Giewitz, Penzlin, Prilwitz, Neubrandenburg! u. f. w., scheint aber in der Haideebene zu fehlen.

315. *S. tridactylites* L. (L. Sch. 1777).

316. *S. granulata* L. (L. Sch. 1777).

317. *Chrysosplenium alternifolium* L. (L. Sch. 1777).

318. *Ch. oppositifolium* L. (Richter 1841) bisher nur im südwestlichen M. zwischen Gr. Bengersdorf und Bennin; an der Quelle rechts vom Steige der von Boizenburg nach Gehrum führt.

319. *Hydrocotyle vulgare* L. (L. Sch. 1777) häufig 42. Umbelliferae.
fig, sogar auf Strandwiesen bei Warnemünde. S. 138.
320. *Sanicula europaea* L. (L. Sch. 1777). S. 120.
321. *Eryngium campestre* L. (Hahn 1809) sehr häufig auf den Elbdeichen! stromabwärts bis Hamburg.
322. *E. maritimum* L. (T. 1788) häufig am Ostseestrande!
323. *Cicuta virosa* L. (L. Sch. 1777). S. 41. 135.
β. *tenuifolia*.
324. *Apium graveolens* L. (T. 1788) besonders am Seestrande und um Salzquellen. S. 114. 138.
325. *Helosciadium innundatum* L. sp. (Nolte c. 1823 sec. Betcke Archiv V.) nur in der Haideebene a. m. O., und bei Ratzburg in einem kleinen Teiche bei der Beek; — schwerlich bei Mirow.
326. *H. repens* L. sp. (v. Schreber bei Roth 1793) nicht selten auf Wiesen durch ganz M., mit Ausnahme der Haideebene.
- * 327. *Falcaria Rivini* Host; L. sp. (T. 1791) auf Aekern, besonders kalkhaltigen, eingebürgert, jedoch, außer auf Pöl, vorzugsweise im östlichen Landestheile: bei Brudersdorf unweit Dargun, Rehow unweit Malchin, Penzlin, Quastenberg bei Stargard, Broda bei Neubrandenburg, Pleetz bei Friedland! — Bei Güstrow, Schwerin und in der Haideebene scheint diese Pflanze zu fehlen.
328. *Aegopodium Podagraria* L. (L. Sch. 1777).
- * 329. *Carum Carvi* L. (L. Sch. 1777) eingebürgert?
330. *Pimpinella magna* L. (T. 1791).
331. *P. Saxifraga* L. (L. Sch. 1777). S. 120.
β. *dissectifolia* Wallr.

γ. nigra Wild. 3. B. bei Neubrandenburg im Memerower Holz, bei Dargun (Zab.) u. a. D.

332. *Berula angustifolia* L. sp. (T. 1788). S. 138.

333. *Sium latifolium* L. (L. Sch. 1777). S. 138.

334. *Bupleurum tenuissimum* L. (Willebr. 1839) bei der Pötnitzer Ziegelei unv. Daffow, am Kirchsee bei Kirchdorf auf Pöl, Dietrichshagen bei Warnemünde, Wustrow auf dem Fischlande, — eine Seestrandspflanze.

B. rotundifolium L. (T. 1788) hin und wieder in Gärten und auf Aedern verwildert.

335. *Oenanthe fistulosa* L. (L. Sch. 1777). S. 138.

336. *O. Lachenalii* Gm. (T. 1788) am Seestrande des Priwal, zwischen dem Schnatermann und Markgrafenhaiden unv. Rostock.

337. *O. Phellandrium* Lam. (L. Sch. 1777). Vergl. S. 120. 138.

* 338. *Aethusa Cynapium* L. (L. Sch. 1777) mit den Culturpflanzen als Unkraut eingebürgert? S. 138.

339. *Seseli annuum* L. (Blandow 1808) auf sandigen Wiesen an der Müritz am Kiez bei Waren; bei Wittenburg auf der Weide am Fußsteige nach Dreilützow; am Wege von Dömitz nach W. und Junker-Wehningen.

340. *Libanotis montana* Crtz. L. sp. (T. 1791) am Ostseeufer bei Warnemünde.

341. *Cnidium venosum* Koch; L. sp. (Griew. 1839. 1828!) auf Elbwiesen bei Boizenburg und Dömitz, bei Ludwigslust am Canal diesseits der Laascher Brücke, und überhaupt wohl in der Haideebene nicht selten, außerhalb derselben jedoch noch nicht gefunden.

Levisticum officinale Koch (Schreiber 1853), in Sildeuropa

heimisch, wird in Dorfgärten cultivirt und entschlüpft denselben bisweilen.

342. *Selinum Carvifolia* L. (T. 1795) bei Warnemünde, Güstrow (in den Todten- und Röwer-Tannen), im Geb. der Grabower und Malchiner (in d. Benz und auf dem neuen Rücken) Flora, bei Neubrandenburg auf den Wiesen hinter der Kuhweide.

343. *Angelica sylvestris* L. (L. Sch. 1777).

344. *Archangelica officinalis* Hoffm., L. sp. (T. 1788) in M. nicht selten, sogar am Strande bei Dassow und Warnemünde. S. 120.

345. *Peucedanum Oreoselinum* Mönch, L. sp. (T. 1788) nicht selten, auch am Strande bei Warnemünde.

Anm. *P. officinale* L. kommt in M. nicht vor, vergl. Archiv VI. 111.

346. *Thysselinum palustre* L. sp. (L. Sch. 1777).

* 347. *Pastinaca sativa* L. (T. 1788), eingebürgert?

348. *Heracleum Sphondylium* L. (L. Sch. 1777).

349. *Laserpitium prutenicum* L. (Brück. 1803) bei Dassow am Traveufer, Marktgrafenhaide, in der Wolfowischen Haide, Neubrandenburg im Nemerower Holz, fehlt im südlichen M.

350. *Daucus Carota* L. (L. Sch. 1777), ob eingebürgert?

* 351. *Caucalis daucoides* L. (D. 1828) hin und wieder unter der Saat, und mit dieser eingebürgert.

Scandix pecten Veneris L. (Thede 1806) wird bisweilen mit der Saat eingeschleppt, scheint sich aber nirgends wirklich eingebürgert zu haben, wenn nicht etwa bei Rütz, wo E. Griewank sie (nicht häufig) unter dem Sommerforn fand.

352. *Torilis Anthriscus* L. sp. (T. 1788).

353. *Anthriscus sylvestris* L. sp. (L. Sch. 1777) S. 138.

A. Cerefolium L. (Schultz 1806) aus dem südl. Europa stammend, a. m. D. verwildert.

354. *A. vulgaris* Pers. L. sp. (T. 1791).

355. *Chaerophyllum temulum* L. (T. 1788). S. 138.

* 356. *Ch. bulbosum* L. (T. 1788) an Wegen bei Daffow, auf dem Schweriner Stadtfelde in Gebüsch, bei Ludwigslust im Garten der Villa Gustava, bei Malchin an Feldzäunen eingebürgert.

357. *Conium maculatum* L. (L. Sch. 1777). S. 120. 138.

43. *Araliaceae.*

358. *Hedera Helix* L. (L. Sch. 1777) in unseren Wäldern selten blühend, häufiger in den Gärten an alten Mauern. Vergl. S. 34. 41. 76. 80. 138.

44. *Corneae.*

359. *Cornus sanguinea* L. (T. 1788). Vergl. S. 33.

45. *Loranthaceae.*

360. *Viscum album* L. (L. Sch. 1777) bei Schwerin, Ludwigslust, Kemplin, Schloß Grubenhagen, Neubrandenburg! Prißwitz! u. f. w. Vergl. S. 34. 120.

46. *Caprifoliaceae.*

* 361. *Sambucus nigra* L. (L. Sch. 1777) häufig, aber wahrscheinlich nur eingebürgert. S. 120.

Anm. *S. Ebulus* L. (T. 1788) ist wahrscheinlich eine früher cultivirte und verwilderte, jetzt aus M. schon wieder verschwundene Pflanze. Nur Timm und F. Schultz geben einige Standorte an, ersterer Gorchendorf bei Malchin, letzterer Ruhlsdorf, Rilsow und Woggersin. Sie fehlt im Gebiete der Floren von Grabow, Ludwigslust, Schwerin, Güstrow, Neubrandenburg, — ich selbst habe sie niemals in M. gefunden, und überhaupt scheint sie in neuerer Zeit keinem unserer Botaniker aufgestoßen zu sein; im J. 1844 will sie Jemand bei Finkenwerder unweit Goldberg in einem Graben gefunden haben, wofür aber der Beweis mir fehlt. Auch in den Floren von Rügen, der Uckermark (wo sie nur bei Boizenburg ver-

wildert! vorkommt), von Berlin (Renth) und Lübeck (Häcker) fehlt sie; aus dem großen Gebiete der Flora Marchica giebt A. Dietrich nur vier Fundorte an. In Neuvorpommern kam sie zu Weigels Zeiten (1769) an einer einzigen Stelle vor, jetzt (1859) hat Zabel sie nicht wieder gefunden. Bei Hamburg selten an Zäunen (!) zwischen Gesträuch (Sonder).

362. *Adoxa Moschatellina* L. (T. 1788).

363. *Viburnum Opulus* L. (L. Sch. 1777). S. 33.

364. *Lonicera Periclymenum* L. (L. Sch. 1777).

Vergl. S. 30. 39. 138.

β. *quercifolium*.

365. *L. Xylosteum* L. (L. Sch. 1777) fehlt nur in der Haideebene und ist im östlichen M. gar nicht selten. Vergl. S. 30. 138.

366. *Linnaea borealis* L. (v. Kamptz 1806) bei Starfow unweit Mirow auf der Schwärzger Landspitze; bei Kamelow unweit Friedland? Neustrelitz bei Glambeck und am Krebssee a. m. St., im Brunsdorfer Holz; zw. Malchow und Drewitz; bei Graal in der Ribnitzer Haide; bei Mandelshagen, Krakow, Daffow, und in den Tannen an der Trave.

* 367. *Sherardia arvensis* L. (T. 1788) auf Neckern 47. Stellatae. eingebürgert.

* 368. *Asperula arvensis* L. (T. 1791) ebenso, aber nur selten, z. B. bei Malchin und Mirow; sie soll Kalkboden lieben.

A. tinctoria L. (Langm. 1850) bei Neustrelitz im russischen Lager, — wohl nur dahin verirrt.

369. *A. Cynanchica* L. (T. 1791 als *Galium montanum*) an der Müritz bei Waren, Prilwitz auf dem Schloßberge, Hohenzieritz im Schloßgarten; Neustrelitz?

370. *A. odorata* L. (L. Sch. 1777) gemein in allen Laubholz-Waldungen. Vergl. S. 37. 112. 138.

371. *Galium Aparine* L. (L. Sch. 1777) durch ganz Mecklenburg verbreitet. Vergl. S. 40.

β. *spurium*.

372. *G. uliginosum* L. (L. Sch. 1777).

Anm. Link Mscr. beschreibt unter dem Namen *G. erectum* Sm. eine mit *uliginosum* und *palustre* verwandte Art, welche er unter Gr. der ersteren gemengt aus Parchim erhalten habe. Seiner Beschreibung nach kann dies nur *G. parisiense* L. gewesen sein, welches dort vielleicht zufällig auf einem Acker eingeschleppt war, aber sich wohl schwerlich eingebürgert hat. Auch bei Stettin, und wahrscheinlich auch in Holstein, ist es schon vorgekommen.

373. *G. palustre* L. (L. Sch. 1777).

374. *G. boreale* L. (T. 1791) bei Ludwigslust häufig, Schwerin bei der Fähre über die Stör, Malchin in der Gielow'schen Benz, Neubrandenburg im Brüderbruch, Friedland.

375. *G. verum* L. (L. Sch. 1777).

376. *G. Mollugo* L. (T. 1788).

(375 + 376.) *G. vero-Mollugo* Schiede, ein Bastard.

377. *G. sylvaticum* L. (T. 1788).

378. *G. saxatile* L. (Link 1810) im westlichen M. von Dassow bis in die Haideebene hinab; wahrscheinlich auch in dem kleinen nordöstlichen Haidegebiete, da es auf dem Darß und Zingst nicht selten ist.

379. *Valeriana officinalis* L. (L. Sch. 1777)
S. 120. Hierher gehört als Varietät:

β. *exaltata* Mich. (Betzke 1849).

380. *V. dioica* L. (L. Sch. 1777).

* 381. *Valerianella olitoria* Mönch. (L. Sch. 1777).

* 382. *V. carinata* Lois. (Schultz 1828 sec. Deth.) „in Stargardia“, ein speciellerer Standort wird nicht angegeben, und Schultz selbst erwähnt diese Art nirgends, selbst nicht im 2. Nachtrage zu seiner Flora. Im J. 1840 aber fand sie Betcke bei Penzlin im Werderschen Garten oben an der Mauer beim Weinstock in mehrfachen Exemplaren. Andere Fundorte sind mir nicht bekannt.

* 383. *V. dentata* Poll. (D. 1809).

* 384. *V. Auricula* DC. (Betcke 1825!) bei Neustadt am Fußsteige nach dem Hagen im Getreide.

385. *Dipsacus Fullonum* L. var. *sylvestris* Mill. ^{49. Dipsaceae.} (T. 1791) an der Elbe auf den Deichen und durch die ganze Teldau häufig! bei Sternberg, Rostock; bei Rönnow verschwunden.

Anm. Ein Miscr. sagt: *D. sylvestris* ist gewiß nur eine Abänderung von *D. Fullonum*, denn in dem botanischen Garten zu Rostock bringt der ausgefallene Same des letzteren in der zweiten Generation den *D. sylvestris* hervor.

386. *D. pilosus* L. (T. 1788) bei Daffow und Mienhagen, Schwerin, Grabow, Neustadt, Düttschow, Penzlin, Stargard.

387. *Knautia arvensis* L. sp. (L. Sch. 1777).

β. *integrifolia*.

388. *Succisa pratensis* Mönch; L. sp. (L. Sch. 1777). S. 40. 120.

389. *Scabiosa Columbaria* L. (T. 1788).

390. *S. suaveolens* Desf. (Schultz 1828), weit durch M. verbreitet! und nur im nordwestlichen Landestheile fehlend.

391. *Eupatorium cannabinum* L. (L. Sch. 1777) ^{50. Compositae.} ^{a. Corymbiflorae.} gemein; ändert bei Daffow mit weißen Blüthen ab, in

welchem Falle auch die ganze Pflanze ein helleres Grün hat. S. 138.

392. *Tussilago Farfara* L. (L. Sch. 1777) S. 120.

393. *Petasites officinalis* Mönch. L. sp. (L. Sch. 1777).

394. *P. tomentosus* Ehr. sp. (Schmidt 1828) an der Elbe: von Dessau abwärts über Dömitz! bis Blankenese.

395. *Aster Tripolium* L. (T. 1788) Seefrands- und Salinenpflanze.

A. salicifolius Schol. (= *salignus* W.) hin und wieder an Flußufern verwildert; desgl. *A. novi Belgii* L. bei Grabow am Bachmühlengraben (Schreiber 1853).

Biotia macrophylla L. sp., eine Nordamerikanerin, ist nach Schreiber (1853) im Ludwigskluster Schloßgarten verwildert.

396. *Bellis perennis* L. (L. Sch. 1777).

* 397. *Erigeron canadensis* L. (T. 1788) aus Canada stammend, hat sich in der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts völlig eingebürgert.

398. *E. acer* L. (L. Sch. 1777).

399. *Solidago Virga aurea* L. (L. Sch. 1777) S. 120.

* 400. *Inula Helenium* L. (L. Sch. 1777) früher als officinelle Pflanze cultivirt, hat sie sich zwar eingebürgert, scheint aber wieder im Aussterben begriffen. Betcke fand sie noch an der Quelle bei Pohnstorf, auf dem Kirchhofe zu Bülow am Malchiner See, bei Gevezin und Zahren.

401. *Inula salicina* L. (D. 1797) sehr zerstreut in M.: beim Schnatermann unv. Rostock, bei der Wolfowischen Gypsmühle unv. Dargun, im Ramelower Holz unv. Friedland, und häufig auf einer Wiese bei Sarchow im N. Marnitz. Sie liebt kalkreichen Boden daher auf Jasmund gemein!

402. *Inula britannica* L. (T. 1795) auf feuchten

Walb- und Seestraubswiesen. Sie kommt auch mit 1 Blüthenkopfe vor, und schon Schulz warnt, solche Gr. nicht etwa für *I. hirta* zu halten.

403. *Pulicaria vulgaris* Gärt.; L. sp. (L. Sch. 1777).

404. *P. dysenterica* L. sp. (T. 1788) fehlt in einzelnen Gegenden, wie z. B. um Schwerin und Grabow.

Galinsoga parviflora Cav. (Langm. 1841), eine Peruanerin, ist jetzt in der Einbürgerung begriffen, und z. B. in den Ludwigs-lustler Gärten, so wie bei Wandrum unv. Schwerin, schon ein lästiges Unkraut geworden; ebenso bei Hamburg, Berlin (wo sie im 2. Decennium dieses Jahrhunderts dem botanischen Garten entschlüpft ist), Greifswald und in der Prov. Preußen (hier seit 1807 verwildert).

405. *Bidens tripartita* L. (L. Sch. 1777).

406. *B. cernua* L. (T. 1788).

Rudbeckia laciniata L. (Brockm. 1853) aus Nordamerika stammend, wird sich gleichfalls einbürgern, wie sie dies schon bei Elßbeck und Wandsbeck gethan hat; bei Grabow ist sie schon an mehreren Stellen an der Elbe verwildert.

Helianthus tuberosus L. (Schmidt vor 1828) am hohen Elßufer bei Boizenburg; desgl. in Gärten und an Bäumen im Kirchdorfe Gressow (Külzer Ort) fast verwildert.

407. *Filago germanica* L. (L. Sch. 1777).

408. *F. arvensis* L. (L. Sch. 1777).

409. *F. minima* Fr. (T. 1795 als *montana*).

410. *Gnaphalium sylvaticum* L. (L. Sch. 1777).

411. *G. uliginosum* L. (L. Sch. 1777).

412. *G. luteo-album* L. (Link 1810) in der Haideebene, aber nicht häufig, z. B. bei Ronow! Glaisin, Grabow; desgl. auch in dem kleinen nordöstlichen Haidegebiete.

413. *G. dioicum* L. (L. Sch. 1777).

414. *Helichrysum arenarium* L. sp. (T. 1788) S. 120.

* 415. *Artemisia Absinthium* L. (L. Sch. 1777) wahrscheinlich nur eingebürgert; sie fehlt auf Pöl und der Halbinsel Wustrow, und ist in der Wismarschen Strandgegend sehr selten; im Binnenlande an manchen Orten sehr häufig. S. 41. 112. 121.

416. *Artemisia campestris* L. (L. Sch. 1777).

β. *sericea* Fr. in der Nähe des Meeresstrandes.

417. *A. vulgaris* L. (L. Sch. 1777) S. 121.

418. *A. maritima* L. (Siems. 1808) Seestrandspflanze, häufig z. B. auf Pöl und an d. Wism. Bucht. S. 41.

β. *gallica* W. an der Wism. Bucht (C. Griew.).

γ. *salina* W. bei Wismar, nicht bei Daffow.

A. pontica L. (Betzke 1849) bei Pönglin verwildert.

419. *Tanacetum vulgare* L. (L. Sch. 1777). S. 35. 121!

β. *crispum* (v. Kamptz 1806) in Zartwitz bei Mirow.

420. *Achillea Ptarmica* L. (T. 1788).

421. *A. Millefolium* L. (L. Sch. 1777). Vergl. S. 38. 121.

422. *Anthemis tinctoria* L. (T. 1788) fehlt z. B. bei Ludwigslust.

* 423. *A. arvensis* L. (L. Sch. 1777) mit der Saat eingebürgert.

* 424. *A. Cotula* L. (T. 1788). Vergl. S. 34.

* 425. *Matricaria Chamomilla* L. (L. Sch. 1777) als officinelle Pflanze eingebürgert? S. 121.

426. *Chrysanthemum Leucanthemum* L. (T. 1788). Vergl. S. 37.

* 427. *Ch. Parthenium* Pers.; L. sp. (L. Sch. 1777); früher als officinelle Pflanze eingebürgert?

* 428. *Ch. inodorum* L. (T. 1788).

β. *maritimum* L. (T. 1788) am Seestrande.

* 429. *Ch. segetum* L. (L. Sch. 1777) früher unter der Saat eine wahre Landplage, jetzt aber durch sorgfältigere Ackerwirthschaft in ihrem Vorkommen schon sehr beschränkt.

430. *Arnica montana* L. (T. 1788) bei Grabow, Ludwigslust und Neustadt nicht selten, bei Güstrow in den Röwer Tannen; bei Rummow; bei Sülz, früher auch bei Krumbek in einem Gehölz nach der Rehberger Gränze zu. Vergl. S. 41. 121.

431. *Senecio campestris* Retz sp. (Thede 1828) sehr selten, nur bei Satow unv. Kröpelin gefunden; ob dahin nur zufällig verirrt?

432. *S. palustris* L. sp. (L. Sch. 1777).

* 433. *S. vulgaris* L. (L. Sch. 1777). S. 39. 40. 138.

434. *S. viscosus* L. (T. 1788).

435. *S. sylvaticus* L. (T. 1788).

436. *S. erucaefolius* L. (D. 1828) am Elbberge bei Boizenburg, bei Görslow unv. Schwerin, an Wegen und Ackerändern bei Daffow.

437. *S. Jacobaea* L. (T. 1788).

β. *aquaticus* Huds. (Schultz 1806) an der Trave bei Daffow, bei Grabow, Neustadt, Neubrandenburg u. a. D.

γ. *barbaraeifolius* Krock. (Giesebr. 1837) bei Mirow in der Alee.

438. *S. nemorensis* L. (C. Griew. 1839. 1828!) am Elbufer bei Bierhof unv. Boizenburg! auf dem Mittelwerder bei Dömitz weit und breit wuchernd (Fiedler); bei

Rummer unv. Ludwigslust in einem Erlengebüsch! (Madauß), bei Kladow unv. Krivitz! (Willebr.), bei Rostock, Evershagen; zu Neustrelitz am Zierker See verwildert.

Ann. Ueber die Vereinigung des *S. nemorensis* und *saraceniensis* zu einer einzigen Art s. C. Grievant in Archiv VIII. 185 ff. — Uebrigens scheinen wir in M. beide Formen zu haben, wenigstens erklärt Detharding in einem Briefe an Betcke die am Elbufer vorkommende Pflanze verschieden von der bei Rostock wachsenden.

439. *S. paludosus* L. (Schmidt 1828) nur an der Elbe! und ihren Nebenflüssen in der Haideebene.

b. *Cynarocephalus*.

Calendula officinalis L. (T. 1788) im südlichen Europa heimisch, zeigt sich mitunter als Gartensflüchtling. S. 33.

Echinops sphaerocephalus L. (Link 1810) ist auf der Schöninsel bei Gilstrow verwildert, wie auch an anderen Orten in Norddeutschland, z. B. auf Fasmund und am Elbufer (bei Lauenburg und im Geb. der Flora von Hamburg).

440. *Cirsium lanceolatum* L. sp. (L. Sch. 1777).

441. *C. palustre* L. sp. (L. Sch. 1777).

442. *C. acaule* L. sp. (L. Sch. 1777) fehlt z. B. bei Ludwigslust.

443. *C. oleraceum* L. sp. (L. Sch. 1777).

* 444. *C. arvense* L. sp. (L. Sch. 1777).

(442 + 43.) *C. oleraceo-acale* (Betcke 1857!) zw. Ave und Marien unv. Bentzin an der Chaussee!

(441 + 43.) *C. hybridum* Koch (Betcke 1857!) bei Brunsdorf unv. Bentzin! und auf den Wiesen an der Burg bei Bentzin, zwischen den Stammeltern.

Silybum marianum L. sp. (T. 1788) früher unter dem Namen „Stäffführn“ d. i. Stechföner cultivirt, jetzt aber nur noch selten verwildert. S. 39.

* 445. *Carduus acanthoides* L. (Nolte s. 1823 sec. Betcke!). Bei Ruhrade unv. Ribnitz (Zabel), bei Wismar

(Wüftnei); bei Puchow unv. Pentzlin! und zwischen Gr. und Al. Bielen (Betzke). — Ob nur verliert?

446. *C. crispus* L. (L. Sch. 1777).

447. *C. nutans* L. (T. 1788).

C. pycnocephalus Jacq. wurde im Sommer 1855 in einem einzigen Gr. bei Warnemünde an einer Stelle gefunden, wo im vor-
aufgehenden Jahre französischer Ballast ausgeladen war (G. Griewant).

* 448. *Onopordon Acanthium* L. (T. 1788). Vergl. S. 32.

449. *Lappa communis* Coss. et Germ., *L. sp.* (L. Sch. 1777). S. 35. 121.

α. *major* Gärt.

β. *minor* DC.

γ. *tomentosa* Lam.

450. *Carlina vulgaris* L. (L. Sch. 1777).

451. *Serratula tinctoria* L. (L. Sch. 1777) zerstreuet
durch ganz M.!

452. *Jurinea cyanoides* Gärt. sp. (Schmidt 1828)
wurde im J. 1811 bei Ramm zwischen Loosen und Lübb-
theen in der Haideebene gefunden und ist zwar später dort
vergebens gesucht worden, da sie aber in jener Gegend
noch in der Karrenziner Haide (zw. Rosin und Neuhaus),
aber schon auf hannöverschem Gebiete vorkommt, also dort
einen weiteren Verbreitungsbezirk hat, dürfen wir ihr das
Bürgerrecht wohl nicht vorenthalten.

453. *Centaurea Jacea* L. (T. 1788).

454. *C. phrygia* L. (G. Brück. 1828) früher am
Wege von Hansdorf nach Gorow und an mehreren Orten
derselben Gegend in Hecken, — neuerdings aber dort von
keinem Botaniker (namentlich nicht von Betzke!) gesehen;

im J. 1859 aber hat Dr. Weidner sie bei Sülz gefunden. Auch im Gebiet der Flora von Hamburg kommt sie vor.

Anm. *C. nigrescens* ist bei Detharding zu streichen.

* 455. *C. Cyanus* L. (L. Sch. 1777). S. 40. 121.

456. *C. Scabiosa* L. (L. Sch. 1777). Vergl. S. 35.

457. *C. maculosa* Lam. (T. 1788) nicht selten, namentlich um Neubrandenburg! Penzlin (Betcke), Güstrow, fehlt aber bei Ludwigslust, Schwerin und im nördlichen Mecklenburg, wie auch in Neuvorpommern und auf Rügen.

Anm. Schon im J. 1810 machte Link in s. Misc. darauf aufmerksam, daß die südeuropäische *C. paniculata* von der in Deutschland bis auf die neueste Zeit so benannten Art sehr wesentlich abweiche.

C. Calcitrapa L. (Arndt 1853) wurde ein einziges Mal auf dem Acker bei dem Neuen Krüge vor Neubrandenburg verirrt gefunden! Mehrfach ist aber mit fremdem Luzernesamen schon

C. solstitialis L. (Prah 1837) eingeschleppt worden, z. B. bei Boizenburg, Güstrow, Doberan und Mallin (an letzterem Orte zugleich mit *Helminthia echinoides* von Danneel gef.), — aber sie verschwindet nach einjähriger Dauer immer wieder.

c. Cichoria-
ceae.

458. *Lampsana communis* L. (L. Sch. 1777).

459. *Arnoseris minima* L. sp. (T. 1788).

460. *Cichorium Intybus* L. (L. Sch. 1777).

461. *Thrinicia hirta* Roth. (D. 1809) auf Wiesen bei Toitenwinkel, an Ackerändern hinter Silbemow längs der Warnow, bei Wustrow auf dem Fischlande und bei Dierhagen (Zabel), — aber nicht bei Neustrelitz.

462. *Leontodon autumnalis* L. (L. Sch. 1777).

β. *pratensis* Link 1810.

463. *L. hastilis* L. (L. Sch. 1777).

β. *glabratus*.

464. *Picris hieracioides* L. (T. 1788) bei Daffow

an Wegen und Hecken, zwischen Voltenhagen und Wismar an der Küste häufig, desgl. bei Karenz (Griew.), bei Malchin an Aekerrändern, bei Penzlin an der Vieler Mühle und dem Stadthofe, bei Wolbeck an der Wolfshagenschen Gränze. — Bei Schwerin und Güstrow scheint sie zu fehlen.

Helminthia echiioides L. sp. (D. 1828) wird hin und wieder aus dem südlichen Europa durch Ballast (bei Warnemünde) und durch Luzernesamen (z. B. bei Mallin!) eingeschleppt, verschwindet aber bald wieder.

465. *Tragopogon major* Jacq. (D. 1809) bei Dömitz, Rostock auf dem Stadtwalle, an der Ostseeküste bei Harkensee, Elmenhorst u. a. D.

T. porrifolius L. (T. 1788) bei Rostock, Malchin, Gubrow, Ludwigslust, Ankershagen, ist wohl nur ein Gartenflüchtling.

466. *T. pratensis* L. (L. Sch. 1777) stellenweise sehr häufig.

467. *Scorzonera humilis* L. (T. 1788) auf Seestrandswiesen bei Warnemünde, bei Sülz (Weidner), Malchin auf Wiesen am Grammentinschen Holze, bei Güstrow in den Röwer Lannen, im Gebiete der Flora von Grabow auf dürrer Sandboden, wo sie aber z. B. bei Ludwigslust schon ausgerottet zu sein scheint.

468. *Hypochoeris glabra* L. (Deth. 1810) auf sandigen Aeckern in der Haldeebene, bei Schwerin auf dem Kalkwerder und bei Zippendorf, bei Güstrow, Elmenhorst, Dietrichshagen unv. Rostock, und Mirow.

469. *H. radicata* L. (L. Sch. 1777) weit verbreitet, selbst am Seestrande.

β. glaberrima F. Schultz 1837 bei der Zirzower Mühle unv. Neubrandenburg.

470. *Achyrophorus maculatus* L. sp. (T. 1788)

nicht häufig: z. B. bei Neubrandenburg a. m. O.! bei Remplin auf den höchsten Hügeln (Betzke), bei der Wolfow'schen Gypsmühle (Zab.), Sülz (Weidn.), Parchim, Grabow u. a. O. in der Haideebene.

471. *Taraxacum officinale* Wig.; L. sp. (L. Sch. 1777). Vergl. S. 31. 122.

β. *lividum* Koch auf Seestrandswiesen bei Daffow und Warnemünde häufig, — aber auch im Binnenlande?

472. *Chondrilla juncea* L. (T. 1788).

β. *latifolia* M. B. (= *acanthophylla* Deth.) am sandigen Ostseestrande häufig, aber auch auf den Hängen bei Grevismühlen, bei Grabow und Boizenburg.

473. *Lactuca Scariola* L. (T. 1788): Dömitz auf den Festungswällen (Fiedler), Malchin vor dem Mühlen-thore, Pentzlin (Betzke), Güstrow, Schwerin, Cosa-Bromau u. Friedland. S. 138.

474. *L. muralis* L. sp. (L. Sch. 1777).

L. virosa L. (T. 1795), im südlichen Europa heimisch, wurde vor mehr als 60 Jahren bei Sternberg verwildert gefunden; ob sie diesen Standort behauptet hat, ist mir nicht bekannt. S. 138.

* 475. *Sonchus oleraceus* L. (L. Sch. 1777). Vergl. S. 39.

* 476. *S. asper* Will. (T. 1788).

Anm. Nach Link (Mscr.) unterscheiden sich diese Art von der vorigen, außer durch die in den Floren angegebenen Kennzeichen, auch noch durch die spindelförmige Wurzel, während *S. oler.* eine vielfach zertheilte habe — Ich selbst kann das Geständniß nicht unterdrücken, daß es mir überhaupt mit der specifischen Trennung beider Arten noch etwas mißlich vorkommt.

477. *S. arvensis* L. (L. Sch. 1777).

β. intermedius Brückn. mit fahlen Blütenstielen und Hauptkelchen, z. B. bei Neubrandenburg.

γ. maritimus caule 1-2 floro, simplici, 1-pedali, foliis integerrimis, acute denticulatis (Deth.) auf salzhaltigen Strandwiesen.

478. *S. palustris* L. (Link 1808) wurde bisher nur im nördlichen M. gefunden: am Daffower See, am Ufer der Stepenitz und der Warnow (bei Marienehe), am Torfgraben bei Markgrafenhaid und in sumpfigen Gräben bei Tottenswinkel.

479. *Crepis biennis* L. (T. 1788) soll im nördlichen M. seltener vorkommen, als im südlichen, doch ist sie auch dort an einzelnen Orten häufig, wie z. B. bei Wismar am Wege nach Pöl (C. Griew.).

480. *C. tectorum* L. (T. 1788).

β. integrifolia Link 1810 = *stricta* Schultz.

481. *C. virens* Will. (Link 1810).

β. pinnatifida W.

482. *C. paludosa* L. sp. (T. 1788).

483. *Hieracium pilosella* L. (L. Sch. 1777).

β.? *stoloniflorum* W. K.? (Madauss 1841) nach Langmann von Madauß bei Lutheran unv. Rübz gefunden.

Anm. Die Var. *pilosissimum* bei Deth. ist zu streichen, s. Griew. krit. Studien S. 31.

484. *H. Auricula* L. (T. 1788) häufiger im östlichen M., westlich von Schwerin noch nicht gefunden.

(483 + 84.) *H. Pilosello-Auricula* G. Griew. 1856, krit. Studien S. 33, hin und wieder zw. den Stammesleuten.

485. *H. praealtum* Will. (Betzke 1828) in einer Bachschlucht bei Daffow, selten; bei Malchin auf dem

neuen Rücken, um Pentslin nicht selten; Neubrandenburg vor dem Trollenhägener Holze rechts nach Neverin zu, im Schloßgarten zu Hohenzieritz.

486. *H. Rothianum* Wallr. (Betzke 1828 als *echioides*) bei Malchin (nicht Pentslin) auf dem neuen Kirchhofe und an der Stadtmauer.

487. *H. pratense* Tausch. (Schultz 1806) bei Neubrandenburg auf den Birkbuschwiesen, bei Schwerin an der Wismarschen Chaussee auf der Wadewiese, im Gebiete der Flora von Grabow, bei Glüstraw auf dem Rosiner Torfmoor, bei Malchin, Burg Schütz, Möllensdorf, Pentslin.

488. *H. murorum* L. (L. Sch. 1777).

β. *sylvaticum* Koch.

γ. *polyphyllum* Neilr. = *vulgatum* Fr.

489. *H. sabaudum* L. Neilr. (T. 1788).

α. *boreale* Fr.

β. *rigidum* Hartm.

490. *H. umbellatum* L. (T. 1788).

Ann. In keiner anderen Familie geschieht das Verwüthen und Einbürgern so leicht, wie in dieser, weil die meist mit einer Federkrone versehenen Früchtchen durch den Wind fortgeführt und weit verstreuet werden. Daher ist auch in keiner Familie der ursprüngliche Bestand der Flora so schwierig fest zu stellen, weil manche als einheimische Pflanzen erscheinende, wohl nur eingebürgerte, früher zu verschiedenen Zwecken cultivirte Pflanzen sind, die jetzt freilich schon lange nicht mehr angebauet werden. Sollten daher anderen Botanikern der von mir gebrauchten Sterne zu viele oder zu wenige scheinen, so will ich darüber nicht streiten.

* 491. *Xanthium Strumarium* L. (T. 1788), früher häufig in M. eingebürgert, jetzt aber hier, wie auch in anderen deutschen Ländern (z. B. in Württemberg) immer

mehr verschwindend, in Schweden (nach Fries) sogar schon ganz ausgestorben. Ich habe es lange auf meinen Excursionen nicht gesehen, bis ich es im J. 1856 bei Kl. Nemerow, wo Schulz es schon vor mehr als fünfzig Jahren sammelte, wieder fand. Als anderweitige Standorte werden genannt: Warnemünde, Malchin häufig (T. 1788), Neubrandenburg an der Stadtmauer (Schulz 1806, — verschwunden?), Pleek (! 1835), Güstrow in der Schnoien Vorstadt (Pr. 1837), Lübkow bei Penzlin, Boizenburg auf Sanddünen häufig (1828 C. Griew.). Bei Dömitz (Fiedler) und Ludwigslust (G. Brück.) ist es verschwunden, und scheint im Gebiete der Floren von Grabow und Schwerin ganz zu fehlen.

492. *Lobelia Dortmanna* L. (Nolte c. 1823) im ^{52. Lobelia-} Mechower See im Ratzburgischen; sie ist zwar später von ^{ceae.} keinem messb. Botaniker weiter gesehen, und namentlich von C. Griewank und Willebrand dort im J. 1837 vergeblich gesucht worden; da aber ihr Fund auf guter Autorität beruhet und sie in dem angrenzenden Holstein einen weiteren Verbreitungsbezirk hat, darf ihr das Bürgerrecht wohl nicht vorenthalten werden.

493. *Jasione montana* L. (L. Sch. 1777).

53. Campanulaceae.

β. major = perennis Deth.

γ. litoralis Fr.

494. *Phyteuma spicatum* L. (T. 1788).

495. *Campanula rotundifolia* L. (L. Sch. 1777).

496. *C. patula* L. (L. Sch. 1777).

* 497. *C. Rapunculus* L. (Link 1795) in der Haldeebene nicht selten, bei Wustrow (am Salzhaff?); im öst-

lichen M. nur in dem Raume zwischen Wendorf, Ankershagen und Zahren unweit Pentzlin. — Eingebürgert?

498. *C. persicifolia* L. (T. 1788).

499. *C. bononiensis* L. (Schultz 1819) in der nördlichen Hälfte von M. Strelitz nicht selten, besonders um die Tolense herum auf Hügeln und in Schluchten! außerdem bei Pentzlin, Rargow unweit Waren, Rostock u. a. D., — fehlt aber im Haide- und Sandgebiet, wie auch bei Güstrow und Schwerin.

* 500. *C. rapunculoides* L. (L. Sch. 1777).

501. *C. Trachelium* L. (L. Sch. 1777).

502. *C. latifolia* L. (Schultz 1806) bei Neubrandenburg a. m. D.! Ribnitz, Kröpelin, A. Karin, Daffow in vielen Gehölzen, namentlich in einem Bruche zwischen Harkensee und Rosenhagen (C. Griew.).

503. *C. Cervicaria* L. (Schultz 1806) sehr selten in M., — ich selbst habe sie nie gefunden und ich kann auch nur einen einzigen Fundort angeben, wo sie gewiß vorkommt, nämlich ein Gehölz zwischen Jägerhof, Karlsruhe und Schmachtenhagen unweit Waren, wo Hr. Drewes in Güstrow (in dessen Herbarium ich ein dieser Localität entstammendes Exemplar gesehen haben,) sie im J. 1842 gesammelt hat; nach einer neueren Mittheilung des Herrn Pastor Reuter in Zabel (gest. 1860) käme sie in jenem Gehölze an der Landstraße von Waren nach Gr. Giewitz sogar in großer Menge vor.

Anm. Alle anderen von früheren Floristen angegebenen Fundorte werden zu streichen sein, indem die Pflanze an manchen ausgerottet sein mag, an anderen aber mit der folgenden Art verwechselt worden ist. — Schultz will sie bei Ballin unv. Stargard gefunden

haben, — es fehlte aber (nach Einl. Mscr.) der Beweis dafür in seinem Herbarium.

504. *C. glomerata* L. (L. Sch. 1777) fehlt in der Haideebene und im Klüger Ort; bei Wismar kommt sie schon vor und ist im östlichen M. weit verbreitet!

Specularia Speculum L. sp. (Schreiber 1853) wurde bei Grabow und Daffow mit der Saat eingeschleppt; an letzterem Orte bemerkte C. Griewank sie zuerst im J. 1839, und auch im vorigen Jahre fand er sie dort und auch auf der Feldmark von Rosenhagen in großer Menge unter dem Raps.

505. *Vaccinium Myrtillus* L. (L. Sch. 1777). ^{54. Vaccinicae.}
Vergl. S. 30. 31. 111. 122.

506. *V. uliginosum* L. (L. Sch. 1777) besonders häufig in der Haideebene! aber auch in anderen Landestheilen vorkommend. — Vergl. Bulgraven S. 31.

507. *V. Vitis Idaea* L. (T. 1791) in den Haide- und Sandgegenden weit verbreitet und stellenweise sehr häufig; — Vergl. S. 30. 35. 111.

508. *V. Oxycoccus* L. (L. Sch. 1777). S. 35.

509. *Arctostaphylos Uva ursi* L. sp. (Weigel 1828) ^{55. Ericineae.}
auf dem Fischlande; in der Dobertiner Haide am Wege von Schwinz nach Sandhof; zwischen Picher und Kraak, bei Grabow in den Tannen zwischen der Stadtziegelei und Gr. Laasch. Fehlt in M. Strelitz.

510. *Andromeda polifolia* L. (L. Sch. 1777).

511. *Calluna vulgaris* L. sp. (L. Sch. 1777).

512. *Erica Tetralix* L. (T. 1791) häufig in den Haidegegenden! auch bei Warnemünde, Markgrafenhaide und Sülz; fehlt in M. Strelitz.

513. *Ledum palustre* L. (L. Sch. 1777). — Vergl. Porst S. 37, ein Name der wahrscheinlich slavischen Ur-

sprungs ist, denn im Russischen bezeichnet Porosst Strauchwerk auf Wiesen. S. 122. 138.

514. *Pyrola rotundifolia* L. (L. Sch. 1777) bei Neubrandenburg im Brüderbruch! von Nolte häufig bei der Ziegelei nördlich vom Blauer See im Moor gefunden, — von Wüßtnei auch im Steinfeld der Holz bei Schwerin. Von den älteren einheimischen Botanikern ist sie meist mit der folgenden verwechselt worden.

515. *P. chlorantha* Sw. (Link 1810).

516. *P. minor* L. (T. 1788), sogar in den Dünenkesseln bei Warnemünde.

517. *P. secunda* L. (T. 1788).

518. *P. uniflora* L. (T. 1788).

519. *P. umbellata* L. (T. 1788) im Gebiete der Sandflora nicht selten! aber auch in den Tannen bei Bafedom (Betcke) und Rothenmoor! bei Brudersdorf.

Anm. *P. media* Sw., mit welcher uns die Floristen beschenken, ist zu streichen, denn Betckes Vermuthung (Archiv V. 212), daß die von Detharding, Link u. a. angeführte *P. media* nichts anderes als *P. chlorantha* sei, wird durch eine anscheinend von Blandows Hand in Timms Exemplar seines Prodrömus hineingeschriebene Diagnose bestätigt, woraus hervorgeht, daß unsere älteren Botaniker der *P. chlorantha* jenen Namen beilegt. Auch Detharding selbst hat später brieflich gegen Betcke seine Angabe im Conspectus zurückgenommen.

56. Monotropaeae.

520. *Monotropa Hypopithys* L. (T. 1788).

β. *hirsuta* z. B. bei Ankershagen (Betcke).

57. Aquifoliaceae.

521. *Ilex Aquifolium* L. (T. 1788) in der Heideebene! nicht selten, bei Loosen z. B. mindestens 16' hoch; bei Güstrow im Primer; in den Wäldern bei Ribnitz und auf dem Fischlande (Zabel). Vergl. Hülsbusch S. 34.

522. *Fraxinus excelsior* L. (L. Sch. 1777). S. 29. 58. Oleaceae.

Ligustrum vulgare L. (L. Sch. 1777) cultivirt und verwildert
3. B. auf dem Windmühlenberge bei Remplin (Zabel).

523. *Cynanchum Vincetoxicum* L. sp. (L. Sch. 59. Asclepiadeae. 1777) auf der Insel Buchwerder im Daffower See, auf Pöl, bei Boizenburg, Neubrandenburg häufig! Scheint im Gebiete der Floren von Schwerin, Grabow, Ludwigslust, Güstrow und Malchin zu fehlen. S. 138.

524. *Vinca minor* L. (T. 1788) bei Boizenburg am 60. Apocynae. Schloßberge, Ludwigslust zwischen Warlow und Picher, Malchin auf dem Stadtwalle, im Rempliner Laubwalde unweit des Saatenberges, im Schwandter Buchholz nach Lüdershof hin, in der Mildenitzer Halde; bei Neubrandenburg hinter dem hohen Ufer, wo ich die Pflanze vor etwa 20 Jahren häufig fand, habe ich sie neuerdings vergebens gesucht, ohne daß diese Localität anderweitige Veränderungen erlitten hätte. (S. 41.)

525. *Menyanthes trifoliata* L. (L. Sch. 1777). S. 32. 122. 61. Gentianeae.

526. *Limnanthemum nymphaeoides* L. sp. (Crome 1809) bei Dömitz in der Elde beim Brodaer Hafen und im schwarzen Wasser bei Polz; bei Boizenburg in Wassergräben und in der Sude häufig; früher auch im Schweriner See, wo sie aber nicht mehr vorhanden zu sein scheint. Fehlt in M. Strelitz.

527. *Sweertia perennis* L. (T. 1788) bei Parchim auf den Slater Wiesen, Sternberg, Wamkow, Barkow unweit Plau; auf den Recknitz- und Trebelwiesen; bei Malchin, Neubrandenburg auf den Birkenbuschwiesen! Galenbeck untw. Friedland bei der Teufelsbrücke.

528. *Gentiana cruciata* L. (T. 1788) bei Malchin,

Nempslin und Faulenrost; Neubrandenburg am Dagberge! und zwischen den Bergen am Wege nach Neverlin! am Prilwitzer und Weisdiner Schloßberge.

529. *Gentiana Pneumonanthe* L. (Blandow 1806) in der Haideebene häufig! aber auch bei Schwerin, Goldberg, Mirow und im Häschendorfer Holz bei Rostock.

530. *Gentiana campestris* L. (L. Sch. 1777). S. 40. 122.

531. *Gentiana Amarella* L. (A. Brück. 1803) und zwar die Form *uliginosa* W. bei Neubrandenburg auf dem alten Turnplätze! im Brüderbruch und auf den Wiesen bei der Krappmühle; bei Pleek (unweit Friedland) auf der Pferdewiese! Malchin auf den Wiesen am Basse-dower Scheidegraben; bei Markgrafenhaide; bei Daffow auf Salzwiesen und benarbteten Stellen der Ostseeküste.

Anm. Eine Vereinigung unserer Art mit der mittel- und süddeutschen, von ihr habituell so verschiedenen *G. germanica* W. kann ich nicht für gerechtfertigt halten, zumal bei der weiten Verbreitung der *Amarella* in Mecklenburg und der Mark, sie sich immer gleich bleibt und niemals eine *G. germanica* daraus wird. — An meinen Exemplaren aus der Umgegend von Neubrandenburg und Berlin sind die linear-lanzettförmigen Kelchzipfel ungemein lang, fast von der Länge der Blumenkrone selbst. — Sie wird nie so üppig als die schöne *G. germanica*, welche ich in den bayerischen Alpen in 6. von 1' Höhe und mit 90, zum Theil 1" langen Blüthen gesammelt habe.

532. *Cicendia filiformis* L. sp. (Crome 1828) in der ganzen Haideebene in feuchten Gräben auf Moorboden! aber auch bei Marnitz und auf feuchten, sandigen Wiesen bei Schwan.

533. *Erythraea Centaurium* L. sp. (L. Sch. 1777) häufig durch ganz M. — Vergl. S. 40. 122.

534. *Erythraea linariaefolia* Pers. (Link 1808) auf Salzwiesen am Seestrande bei Warnemünde und Daffow.

535. *Erythraea ramosissima* Pers. (Link 1806) durch ganz Mecklenburg zerstreuet, aber nicht häufig.

β. *pulchella* Sw. sp., caule subsimplici, plerumque unifloro (Link 1806) auf Salzwiesen am Seestrande, bei Sülz (Weidner).

536. *Polemonium coeruleum* L. (Schreib. 1853), ^{62. Polemoniaceae.} bei Grabow verwildert, im Trebelthale an mehreren Orten in Erlenbrüchern ziemlich häufig, z. B. bei Wasdow, Tangrim, Karlsthal bis Eichenthal, anscheinend wild (Weidner).

Collomia grandiflora Dougl., nicht *linearis* Nutt. (F. Timm 1851) eine im nordwestlichen Amerika heimische Pflanze, kommt bei den Babeldower Tannen in großer Menge vor, wahrscheinlich dem Babeldower Schloßgarten entflohen, und scheint Lust zu haben sich in M. einzubürgern.

537. *Convolvulus sepium* L. (L. Sch. 1777). S. 40. ^{63 Convolvulaceae.}

538. *Convolvulus arvensis* L. (L. Sch. 1777). S. 41.

Anm. *C. Soldanella* L., mit welcher uns einige deutsche Floren beschenken, ist zu streichen. — Dagegen wird ohne Zweifel der aus Sibirien stammende *C. davuricus* Siems., welchen man unter dem Namen der perennirenden Winde seit etwa 10 Jahren allgemeiner in den Gärten zieht, sich in unserer Flora noch vollständig einbürgern. Schon in den Gärten wuchert er fast ärger als der Hopfen, so daß er dort nur mit großer Aufmerksamkeit und nach jahrelangem Kampfe wieder zu vertilgen ist; wie wird er dann erst, wenn es ihm einmal dem Garten zu ent schlüpfen gelingt, im Freien um sich greifen, wo Niemand ihn in Schranken zu halten oder auszurotten strebt?

539. *Cuscuta europaea* L. (L. Sch. 1777). S. 40.

540. *Cuscuta Epithymum* L. = *C. Trifolii* Babing. (Siems. 1828) nur im westlichen und südwestlichen M.

bis jetzt gefunden: auf Kleefeldern bei Daffow, wo sie besonders zur Zeit der Nachmact ganze Felder überzieht und zerstört; auf Wiesen bei Grabow, Ludwigslust, Sasiniz, Schwerin und Sternberg.

* 541. *Cuscuta Epilinum* Weihe (D. 1828) bei Grabow, Glüströw, Malchin u. a. D. auf Flachsfeldern, mit Leinsamen eingeführt.

542. *Cuscuta monogyna* Vahl. (Griew. 1839. 1828!) wurde zwar nur einmal bei Altenhof unvw. Boizenburg auf *Salix viminalis* gefunden, da sie aber von dort abwärts an der Elbe bis in das Gebiet der Flora von Hamburg vorkommt, dürfen wir ihr die Aufnahme unter die Bürger der Flora wohl nicht weigern.

Anm. Die *Cuscutina suaveolens* Ser. (hassiacae Pfeif), welche sich seit 1843 im mittleren Deutschland, besonders unter der Luzerne, an vielen Orten zu Zeiten massenweise eingefunden hat, ist in Mecklenburg noch nicht gesehen worden. Sie stammt aus dem südlichen Amerika und ihre Uebersiedlung nach Deutschland ist den Botanikern sehr räthselhaft gewesen. Vielleicht bin ich im Stande etwas zur Lösung dieses Räthfels beitragen zu können. Zwischen den J. 1830 und 40, etwa um die Mitte jenes Decenniums, wurden den deutschen Landwirthen vielfältig in den öffentlichen Blättern einige neue süd-amerikanische Futterkräuter als ganz vorzüglich angepriesen, welche auch zum Anbau in Deutschland geeignet seien. Darunter befand sich auch eins, welches den Namen Alfalfa führte, und welches ein mir verwandter meßb. Landmann sich in Folge jener Anpreisungen zusammen mit *Paspalum stoloniferum* und einem *Tripsacum*, aus Valparaiso kommen ließ. Als besagte Alfalfa angelangte, erwies es sich aber, daß sie nichts anderes sei, als die längst bekannte — Luzerne, welche in Folge dieser Entdeckung, wenn ich nicht irre, nun gar nicht ausgefäet wurde. Vielleicht haben andere mitteldeutsche Landwirthe sich auf gleiche Weise täuschen lassen und Alfalfa aus Süd-Amerika bezogen, welche ihnen dann wahrscheinlich die *C. sua-*

veolens als ein der Luzerne dort beigefestetes Unkraut mitgebracht haben wird.

543. *Asperugo procumbens* L. (L. Sch. 1777). ^{61 Boragi-}
Ruderalpflanze, z. B. bei Neubrandenburg am Stadthofe
 sehr häufig! desgl. bei Penzlin und Malchin (Betzke),
 Dargun (Struck), Medow unweit Goldberg, selten bei
 Schwerin. — In der Haideebene scheint diese Pflanze zu
 fehlen.

544. *Echinosperrnum Lappula* L. sp. (T. 1795)
 Malchin zwischen den Schennen vor dem Steintore, an
 der Friedländer Stadtmauer (1803), bei Mildenitz unv.
 Woldeck an der Wolfsh. Gränze auf der Mauer bei dem
 alten Thurm (1806); früher auch auf der Ballaststelle
 bei Warnemünde.

Ann. Ich habe diese Pflanze in M. noch niemals lebend beobachtet, auch ist sie in neuerer Zeit von keinem unserer Botaniker wieder erwähnt worden. Ob sie an jenen Standorten noch vorhanden sein mag? Da sie auf Arkona, bei Demmin und Prenzlau, so wie auch auf den Müldersdorfer Ralsbergen (wo ich sie selbst gesammelt,) vorkommt, — also weit im nordöstlichen Deutschland verbreitet ist, halte ich sie für eine wirklich hier heimische Art.

545. *Cynoglossum officinale* L. (L. Sch. 1777).
 C. 122. 137.

Omphalodes verna Mönch. (Wredow 1809) hin und wieder verwildert, z. B. bei Wittenburg, im Ludwigslust Schloßgarten.

Borago officinalis L. auf Schuttstellen verwildert, soll aus dem Oriente stammen.

546. *Anchusa officinalis* L. (L. Sch. 1777); sie variiert mit etwas größeren, weißen Blumen.

* 547. *Anchusa arvensis* L. sp. (L. Sch. 1777) eingeb.

Nonnea pulla L. sp. (O. Danneel 1849) bei Dargun auf der Feldmark des alten Bauhofes am Rande einer Mergelgrube; in der

Ludwigslust Baumschule, aber nur einmal gefunden. Wahrscheinlich ist diese Pflanze nur zufällig eingeschleppt worden.

548. *Symphytum officinale* L. (L. Sch. 1777). S. 112.

549. *Echium vulgare* L. (L. Sch. 1777).

550. *Pulmonaria officinalis* L. (L. Sch. 1777) häufig in M., nur in der Haideebene selten. S. 122.

Anm. *P. oblongata* Schrad., von Langmann auf Wetde's Autorität aufgeführt, ist zu streichen, da letzterer bei weiterer Beobachtung gefunden hat, daß die anfänglich für *oblongata* gehaltenen Pflanzen sich zur *P. officinalis* herausbildeten. — Ob Dethardings *P. officinalis* β (*omnibus partibus quadruplo minor et multo hirsutior, foliis immaculatis, radicalibus ovato-lanceolatis in petiolum productis, nec cordatis, vix unciam longis*) wirklich *P. angustifolia* L. sei, weiß ich nicht, da sie mir noch nicht zu Gesichte gekommen ist; sie soll bei Lüßow (im Predigerholz) und Striesdorf unv. Güstrow wachsen.

* 551. *Lithospermum officinale* L. (L. Sch. 1777) fehlt im Gebiete der Floren von Grabow, Ludwigslust und Güstrow? eingebürgert?

* 552. *Lithospermum arvense* L. (L. Sch. 1777) eingebürgert.

553. *Myosotis palustris* With. (L. Sch. 1777).

β . *caespitosa* Schultz (1819) kann ich mit Döll nur für eine Varietät der sehr veränderlichen Stammform halten; sie findet sich sogar am Seestrande bei Warnemünde und Daffow.

554. *Myosotis sylvatica* Hoffm. (D. 1828).

555. *Myosotis intermedia* (Link 1808).

556. *Myosotis hispida* Schlecht. (T. 1788?)

557. *Myosotis versicolor* Pers. (D. 1828).

558. *Myosotis stricta* Link (Schultz 1819).

559. *Myosotis sparsiflora* Mik. (Schultz 1837) bis-

her nur in M. Strelitz gefunden: bei Friedrichshof und bei Neustrelitz in der Schloßkoppel. — Ihr anderweitiger nächster Standort ist im Geb. der Flora von Hamburg.

* 560. *Solanum nigrum* L. (L. Sch. 1777) allgemein ^{65. Solanaceae.} eingebürgert. S. 138.

β. *miniaturum* Bernh. (Schultz 1837) bei Neustrelitz und bei Daffow am Traveufer; beim Sandkrug zw. Wismar und Rütz (Weidner).

γ. *humile* Bernh. (John 1837) bei Güstrow und häufig im Predigergarten zu Kladow bei Krivitz, wo die Stammform gänzlich fehlt (Willebrand 1856).

561. *Solanum Dulcamara* L. (L. Sch. 1777). S. 30. 122. 138.

Physalis Alkekengi L. (T. 1795), *Nicandra physaloides* Gärt. (C. Griew. 1829!) und *Atropa Belladonna* L. (Anon. 1783) cult. und verwildert; dasselbe ist mit *Lycium barbarum* L. (Lgm. 1841) der Fall.

* 562. *Hyoscyamus niger* L. (L. Sch. 1777) ist wohl nur eingebürgert. Vergl. Dull Bitterfrut S. 32. 122. 136.

β. *agrestis* Kit.

* 563. *Datura Stramonium* L. (L. Sch. 1777) eingebürgert auf Schuttstellen, aber in seinem Vorkommen sehr unbeständig. — Vergl. Stäbführn S. 39. 123. 129. 136.

564. *Verbascum Thapsus* L. (L. Sch. 1777). S. 123. ^{66. Scrophulariaceae.}

565. *V. phlomoides* L., G. Meyer, Neilrich (Schultz 1819) bei Neubrandenburg hinter Belvedere, Roga untr. Friedland, im Priltwiger Schloßgarten, Grabow auf dem Kirchhofe und beim Schießhause, W. Wehningen, Boizenburg am Schlosse und Elbberge. ^{a. Verbascaceae.}

β. *thapsiforme* Schrad. (Schultz 1819) in

manchen Gegenden, z. B. bei Neubrandenburg, sehr gemein, viel häufiger als die Stammform und *Thapsus*.

566. *V. Lychnitis* L. (Brück. 1803) bei Neubrandenburg auf dem Walle und bei der Papiermühle, bei Neustrelitz, Wittenhagen (unw. Feldberg) am Wege nach Tornowhof, Grabow u. s. w.

β. *album* Link 1810 = *V. Moenchii* Schultz 1819, bei Stargard am Schloßberge sehr häufig, wo es schon im J. 1810 beobachtet wurde und ich es auch noch in den J. 1838 und 1855 fand, und zwar ausschließlich diese Var., nicht aber die gelbblühende Stammart; Link fand sie auch bei Neustrelitz und im Rempliner Park.

567. *Verbascum nigrum* L. (L. Sch. 1777) sehr gemein, — z. B. auch auf dem Starg. Schloßberge.

β. *bracteatum* G. Meyer, und zwar flor. albis.

Anm. Diese schöne Var. fand ich am 30. Juli 1855 an der Chaussee bei Moltow in zwei Exemplaren inmitten zahlreicher Exemplare der Stammform, welche dort in der ganzen Gegend südlich vom Malchiner See auf dem mergelhaltigen Boden unter den *Verbascis* vorherrscht, während auf dem sandigen Boden in der Nähe von Waren *V. thapsiforme* entschieden das Uebergewicht bekommt.

(565 + 566.) *V. thapsiforme* - *Lychnitis* Schiede (*ramigerum* Schr. Link 1810) bei Stargard auf dem Schloßberge von Schultz in einem einzigen Ex. gefunden; bei Pentzlin, bei Rink a. d. Müritz.

(564 + 567.) *V. Thapso-nigrum* Schiede (*collinum* Schr. Schultz 1819) bei Neubrandenburg a. m. O.! im Dorfe Bafedow; bei Grabow a. m. O.; auf der Insel Buchwerder im Daffower See.

(565 + 567.) *V. thapsiforme-nigrum* Schiede (*adulterinum* Koch. Brockm. 1853) bei Grabow unw. des

Bahnhofes in 1 Gr. zwischen den Stammeltern; auch bei Kladow fand es Willebrand 1854 in einem Exemplare.

(565 + 567.) *V. nigro-phlomoides* Brockm. 1855 (*collino-nigrum* Brockm. im Archiv VII. S. 257) auf dem Grabower Kirchhofe zwischen den Stammeltern. — Vergl. Brockmüller in den Archives de la Flore de France et d'Allemagne 1855 p. 35.

(566 + 567) *V. nigro-Lychnitis* Schiede (Schultz 1819 S. 15) bei Stargard am Schloßberge.

Anm. Einzelne Localitäten, wie der Starg. Schloßberg und einige Orte bei Grabow, begünstigen die Bastardbildungen sehr, da die Stammeltern dort auf einem kleinen Raume zusammengedrängt vorkommen.

V. speciosum Schrad. (Schreib. 1853) wurde im Ludwigsfluster Schloßgarten verwilbert gefunden, desgleichen

V. Blattaria L. (Brock. 1852) bei der Dömitzer Ziegelei, wohin der Same, nach Dr. Fiedlers Urtheil, durch eine Elb-Überschwemmung gelangt war.

568. *Scrophularia nodosa* L. (L. Sch. 1777). b. Antlrrbi-

569. *Scrophularia aquatica* L. var. *Ehrharli* Stev. (T. 1788). neac.

Ser. vernalis L. (Danneel 1849) verwilbert bei Zeterow, Grabow und Ludwigsflust.

570. *Gratiola officinalis* L. (T. 1788) häufig auf den Wiesen der Haideebene, aber auch bei Schwerin, Warnemünde und Schlage unv. Rostock. S. 138.

571. *Digitalis ambigua* Murr. (Schmidt! 1836) in einem Walde zwischen Brechen und Schönhof unv. Feldberg; im Wildpark bei Neustrelitz (Weidner); in einem Buchenwalde am Kölpin-See; auf einer Waldwiese zw. dem Primer und Ruhner Berg bei Marnitz; im Poiten-

dorfer Holz bei Grabow; im Steinfelder Holz bei Schwerin. S. 138.

* 572. *Antirrhinum Orontium* L. (Thede 1809) auf sandigen Aekern bei Daffow, Warin und in der Haideebene eingebürgert.

* 573. *Linaria minor* L. sp. (T. 1788) an dem steinigen Seestrande bei dem h. Damme nach Rethwisch zu; auch als Unkraut in Gärten und auf Aekern eingebürgert, obgleich nicht häufig, z. B. bei Kemplin auf Aekern (Betste), zu Neubrandenburg in Gärten!

* 574. *Linaria Elatine* L. sp. (Thede 1806) bei Schöffin und Daffow nach der Ernte auf den Feldern; eingebürgert.

L. arvensis L. sp. (Drewes 1841) bei Wredenhagen und Besow, ist wahrscheinlich nur zufällig mit der Saat eingeschleppt.

* 575. *Linaria vulgaris* Mill. L. sp. (L. Sch. 1777) halte ich gleichfalls nur für eine eingebürgerte Pflanze. S. 123.

Anm. *L. Loeselii* kommt in M. nicht vor; vergl. Archiv V. S. 166.

576. *Veronica scutellata* L. (T. 1788); auch bei Warnemünde.

577. *Veronica Anagallis* L. (T. 1788).

578. *Veronica Beccabunga* L. (L. Sch. 1777) S. 36. 123.

579. *Veronica Chamaedrys* L. (L. Sch. 1777).

580. *Veronica montana* L. (Thede 1806) bei Grabow im Werler und Beckentiner Holz, Schwerin auf dem Werder, in der Zichhuser Forst, im Primer bei Güstrow, im Kempliner und Kalenschen Holz bei Malchin, in der Bürgerhorst bei Neustrelitz.

581. *Veronica officinalis* L. (L. Sch. 1777). S. 123.

582. *Veronica latifolia* L. (T. 1788) im östlichen M. nicht selten, (um Malchin und Neubrandenburg! sehr häufig,) scheint im Gebiete der Floren von Güstrow und Schwerin zu fehlen und auch in der Grabower Flora (wie Schreiber dies Gebiet abgegränzt hat,) nur an einer einzigen Stelle, nämlich bei Ludwigslust, vorzukommen.

Ann. Ob auch die var. *prostrata* L. (Sach 1841) auf der Schäferwiese bei der Useriner Mühle vorkommt, bedarf noch der Bestätigung; in der Mark im Gebiete der Berliner Flora gemeinschaftlich mit *Potentilla verna* (cinerea) und *Euphorbia Cyparissias* auftretend, deren Verbreitungsbezirk sich bis in das südliche sandige M. Strelitz herein erstreckt, dürften wir sie auch hier erwarten.

583. *Veronica longifolia* L. (Brück. 1803) Neubrandenburg auf den Birkenbuschwiesen am Tolenseufer! Neustrelitz am Wege nach Gr. Quassow im Graben beim Torfbruch, bei Sülz (Roch), am Ufer der Elbe! und ihrer Nebenflüsse in der Haideebene.

584. *Veronica spicata* L. (T. 1788) namentlich im östlichen M. (z. B. bei Neubrandenburg!) nicht selten.

β. *laxiflora* (E. Boll 1855) mit lockerblütiger Traube, deren übereinander stehende Blumen durch ansehnliche Zwischenräume getrennt sind; der Stengel ist nach oben zu etwas kantig. Im Nemrower Holz bei Neubrandenburg unweit des hohen Ufers; Juni 1855.

585. *Veronica serpyllifolia* L. (L. Sch. 1777).

586. *Veronica arvensis* L. (L. Sch. 1777).

587. *Veronica verna* L. (L. Sch. 1777).

588. *Veronica triphyllos* L. (L. Sch. 1777).

Ann. *V. praecox* All. will A. Brückner 1817 bei Pleetz am Grabenrande des Knüppelbammes gefunden haben, was nicht unmöglich wäre, da sie in Norddeutschland ziemlich weit hinaufreicht

(Berlin, Prenzlau und Stettin); es fehlt aber der Beweis für diesen Fund.

* 589. *Veronica agrestis* L. (L. Sch. 1777) allgemein auf cult. Boden eingebürgert. Nur für Varietäten dieser Species kann ich halten:

β. *opaca* Fr. (Griew. 1847).

γ. *polita* Fr. (Schultz 1837).

* 590. *Veronica Buxbaumii* Ten. (D. 1828) bei Ronow, Ludwigslust, Schwerin, Rostock, Madow und bei der Gielower Mühle (Zabel) in Gärten als Unkraut, mit ausländischen Sämereien eingebürgert.

* 591. *Veronica hederaefolia* L. (L. Sch. 1777) auf cult. Boden eingebürgert.

592. *Limosella aquatica* L. (T. 1791) z. B. bei Neubrandenburg! Sponholz! Wulfenzin (Betsche), Allersdorf unnt. Marlow (Zab.), Boizenburg, in der Teldau u. a. D.

c. Rhinanthaeae.

593. *Melampyrum cristatum* L. (T. 1795) in der Heideebene und in dem kleinen nordöstlichen Heidegebiete häufig, aber auch an der Trave bei Daffow.

* 594. *Melampyrum arvense* L. (L. Sch. 1777) mit dem Getreide eingebürgert.

595. *Melampyrum nemorosum* L. (L. Sch. 1777). S. 31.

596. *Melampyrum pratense* L. (L. Sch. 1777).

Anm. *M. sylvaticum* L. ist in M. noch nicht gefunden worden, denn Timms *M. sylv.* ist nichts anderes als *M. pratense*. Vint nennt es zwar 1795, später in j. Mscr. 1810 fehlt es.

597. *Pedicularis sylvatica* L. (L. Sch. 1777). S. 138.

598. *Pedicularis palustris* L. (L. Sch. 1777). S. 35. 36. 138.

599. *Pedicularis Sceptrum Carolinum* L. (T. 1788)

früher bei Neubrandenburg auf den Tolense-Wiesen! jetzt durch Torfstich ausgerottet, ebenso auch bei Sülz; auf den Peenewiesen bei Malchin ist sie noch vorhanden! bei Rönnow östlich von Krivitz soll diese schöne Pflanze gleichfalls vorkommen. S. 138.

600. *Rhinanthus minor* Ehr. (D. 1828) auf den Wiesen der Haideebene häufig; bei Dammwalde am Wentower See? (Struck).

601. *Rhinanthus major* Ehr. (L. Sch. 1777). S. 35.

602. *Euphrasia officinalis* L. (L. Sch. 1777).

β. *pratensis* = *Rostkowiana* Auct.

603. *Odontites rubra* Pers. = *Euphr. Odontites* L. (L. Sch. 1777) bildet nach Zabel drei in einander übergehende Formenreihen:

α. *latifolia*, (*O. verna* Reich.)

β. *angustifolia* (*O. serotina* Reich?)

γ. *littoralis* Fr. (*O. verna* Drej.),

letztere nur auf Strandwiesen; vergl. C. Griewant's abweichendes Urtheil im Archiv 8, 181, welcher die letztere zuerst in M. (1846) beobachtet hat.

604. *Orobanche rubens* Wallr. (Meyer 1841) zw. 67. *Orobanchaeae*.
Gädebehn und Robande bei Krivitz.

605. *Orobanche coerulea* Vill. (Blandow? 1828. 1802!) an der Müritz bei Waren! Pflanz im hohen Holz! nicht bei Kemplin (Betsche).

606. *Orobanche arenaria* Bork. (T. 1788 als *major*) bei Kemplin! am Grafenwerder bei Penzlin und am Windmühlenberge bei Waren (Betsche), bei Feldberg (Gerhardt).

* 607. *Orobanche ramosa* L. (Schultz 1819) bei Warlin unv. Neubrandenburg häufig! mit Taback, Hanf

und Kaps eingeführt, und von Schultz vor 1819 und von Dr. A. Müller 1835 dort gefunden, also dort eingebürgert.

Anm. Dieser Gattung ist in M. noch sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden und die Angaben unserer älteren Botaniker über die einzelnen Arten sind sehr unzuverlässig. Ich habe daher nur dasjenige hier aufgenommen, was sich noch mit Sicherheit ermitteln ließ.

608. *Lathraea Squamaria* L. (L. Sch. 1777).

68. Labiatae.

609. *Mentha sylvestris* L. (Brück. 1803).

α. *viridis* Schultz 1806. S. 41.

β. *nemorosa* W. (Schultz 1819).

γ. *gratissima* (Schultz 1810 bei Linn.).

610. *Mentha aquatica* L. (L. Sch. 1777).

β. *parviflora* (Schultz 1819.)

γ. *saliva* L. (T. 1795)

(609 + 610.) *M. aquatica-sylvestris* = *nepetoides* Lej. (C. Griew. 1851. 1849!) an der Trave unweit Dassow häufig, wo weder *sylvestris* noch *aquatica* in der Nähe wachsen.

Anm. C. Griewank erklärt diese Pflanze für eine gute, selbstständige Art, Wirtgen aber, der sich sehr eifrig mit den Menthen beschäftigt hat, hält die *M. nepetoides* nur für einen Bastard. — In Bezug auf die ganze Gattung sagt er in seiner Flora der preuß. Rheinprovinz (Bonn 1857) S. 347: „diese, durch ihre zahlreichen Formen und durch die Menge ihrer Bastarde ausgezeichnete Gattung, gehört zu den schwierigsten der Flora, wenn man sich eine genaue Kenntniß derselben verschaffen, und nicht die abweichendsten Formen unter einer Art vereinigen will. Ihre Neigung zu feuchten Wohnplätzen und die Zeit ihrer ganzen Entwicklung, die von den Sommerregen abhängt, bewirkt die außerordentliche Mannichfaltigkeit: die Formen mit ungestielten Blättern erhalten bei anhaltendem Regen längere oder kürzere Blattstiele, bei andauernder Trockenheit erhalten die kahlen und drüsigigen Formen eine dichte Behaarung, die behaarten

einen weißen oder grauen Filz u. s. w.; die ährenblüthigen Formen werden durch Verflümmung kopfig während die quirlblüthigen statt des endständigen Blattbüschels oft auch einen Kopf bilden, so wie nicht selten die kopfigen Formen bei bedeutender Laubentwicklung am Ende des Stengels einen Blattbüschel treiben; Bastardbildungen heben die Gränzen in dem Blütenstande gänzlich auf. Das Vorhandensein oder der Mangel der Blattstiele giebt gar keinen Halt, da z. B. *M. sylvestris* an nassen Standorten häufig Blattstiele erhält."

611. *Mentha arvensis* L. (L. Sch. 1777).

β. *angustifolia* Deth.

612. *Mentha Pulegium* L. (Schmidt 1828) am Elbufer häufig!

Elsholtzia Patrini Lep. = *cristata* W. (Boll 1841) aus Sibirien stammend, als Unkraut auf Höfen und in Gärten verwildert, z. B. bei Neubrandenburg (seit 22 J. beobachtet!), Neustrelitz und Grabow, — und sich wahrscheinlich einbürgern.

613. *Lycopus europaeus* L. (L. Sch. 1777).

614. *Salvia pratensis* L. (T. 1791) in einigen Gegenden, z. B. Neubrandenburg, Ankershagen und Waren, sehr häufig, bei der Wolkowschen Gypsmühle unv. Dargun (Zabel), bei der Randendorfer Mühle unv. Krivitz (G. Brückner); in anderen (Grabow, im ganzen nördlichen M.?) gänzlich fehlend.

615. *Origanum vulgare* L. (L. Sch. 1777) S. 123.

616. *Thymus Serpyllum* L. (L. Sch. 1777) S. 123.

β. *Chamaedrys* Fr. (Schultz 1837).

γ. *angustifolius* Pers. (Schultz 1819).

617. *Calamintha Acinos* L. sp. (L. Sch. 1777).

618. *Clinopodium vulgare* L. (L. Sch. 1777).

* 619. *Nepeta Cataria* L. (L. Sch. 1777).

620. *Glechoma hederacea* L. (L. Sch. 1777). Vergl. Huber S. 34. 123.

* 621. *Lamium amplexicaule* L. (L. Sch. 1777).

* 622. *Lamium purpureum* L. (L. Sch. 1777).

β. incisum W. (D. 1828) bei Rostock, Sülz (Zabel), Schwerin beim Rantower See, Bentzin.

(621 + 622.) *L. amplexicaule-purpureum* Mey. (intermedium Fr. D. 1828) bei Daffow, Schwerin u. a. D.; ein fruchtbarer Bastard.

623. *Lamium maculatum* L. (Link 1795) in der Haideebene sehr häufig! auch bei Rostock und Neustrelitz. Bei Daffow in zwei Formen: *α. rugosum* Reich. mit eiförmigen Blättern und grünen Kelchen (kommt auch weißblühend vor), *β. nemorale* Reich. mit fast dreieckig-herzförmigen Blättern und rothbraun gefärbten Kelchen (C. Griem.).

(622 + 623.) *L. purpureo-maculatum* Boll. — Vinf sagt in f. diss. bot. 1795: in silvis et ad sepes vicorum prope silvas sitorum non raro plantam legi inter *L. purpureum* et *maculatum* intermediam, foliis inferioribus ovatis, crenatis, longissime petiolatis ut in *L. purpureo*, superioribus floribusque *L. maculato* simillimis.“

624. *Lamium album* L. (L. Sch. 1777).

625. *Galeobdolon luteum* L. sp. (L. Sch. 1777).

* 626. *Galeopsis Ladanum* L. (L. Sch. 1777) unter der Saat durch fast ganz M. eingebürgert.

* 627. *Galeopsis ochroleuca* Lam. (Thede 1806) in der Haideebene weit verbreitet! außerdem nur noch bei Schwerin gefunden.

Anm. Die Verschiedenheit in der geographischen Verbreitung scheint die Vereinigung der beiden vorausgehenden, allerdings kaum durch charakteristische Merkmale getrennten Arten unzulässig zu machen;

für mich wenigstens ist dieser Grund der einzige, welcher mich von der Vereinigung beider abhält. Ueber die zwischen ihnen stattfindenden verwandtschaftlichen Beziehungen s. Wirtgen in den Verhandl. d. naturhist. Vereins d. preuß. Rheinlande XI S. 437 ff.

628. *Galeopsis Tetrahit* L. (L. Sch. 1777).

β. *versicolor* Curt. (Schultz 1806).

γ. *bifida* Böning. (Schreib. 1853) soll im Gebiete der Flora von Grabow ebenso häufig wie die Stammform sein; auch an der Trave bei Daffow zusammen mit der Stammform; auf dem Werder bei Schwerin.

δ. *pubescens* Bess. (Lang. 1841) bei Schwerin, Ricksow unv. Neustrelitz? aber nicht bei Pentslin (Betzke).

629. *Stachys germanica* L. (Brück. 1803) in der Umgegend von Neubrandenburg a. m. O.! (bei dem Neuen Krüge, bei Broda am Hahnenberge, im Nemerower Holz), besonders häufig aber bei Kl. Nemerow auf den Aekern hinter dem Hofe nach der Tolense zu! desgl. zw. Kl. Nemerow und Nonnenhof! bei Usadel; sodann bei Bülow am Malchiner See und wahrscheinlich im meißl. Kreidegebiete weit verbreitet, da sie kalkhaltigen Boden liebt.

630. *Stachys sylvatica* L. (L. Sch. 1777).

631. *Stachys palustris* L. (T. 1788).

(630 + 631). *St. sylvatica-palustris* (ambigua Sm. Flörke 1828) am Pfaffenteich bei Rostock, bei Tessenow unv. Marnitz, bei Pleetz; nach Nolte ein unfruchtbarer Bastard.

* 632. *Stachys arvensis* L. (T. 1791) häufig auf Aekern eingebürgert, z. B. bei Malchin und Pentslin.

* 633. *Stachys annua* L. (Betzke 1841) bei Siehdichum auf dem Acker an den Rehser Birken, und bei Mallin unv. Pentslin eingebürgert.

634. *Stachys recta* L. (T. 1788) fehlt nur im Sandgebiete und der Haideebene (wo sie nur am Elbufer vorkommt), da sie kalkhaltigen Boden liebt.

635. *Betonica officinalis* L. (L. Sch. 1777) wie die vor.

* 636. *Marrubium vulgare* L. (L. Sch. 1777) eingebürgert? S. 123.

637. *Ballota nigra* L. (L. Sch. 1777).

α. *ruderalis* Sw. (*vulgaris* Lk.) im Binnenlande allgemein verbreitet.

β. *borealis* Schweig. (*foetida* Deth. 1809) an der Ostseeküste bei Dietrichshagen, bei Rostock vor dem Kröpeliner Thore, in Zäunen bei Warnemünde, — und bei Grabow? (Schreiber). Auch Sonder gesteht die Vereinigung beider Formen zu, da er bei Hamburg deutliche Uebergänge zwischen ihnen fand.

* 638. *Leonurus Cardiaca* L. (L. Sch. 1777).

* 639. *Leonurus Marrubiastrum* L. (C. Griew. 1839. 28!) in der Haideebene bei Gothmann, der Dömitzer Stadtziegelei und Neese; häufiger im Geb. d. Fl. von Hamburg.

640. *Scutellaria galericulata* L. (L. Sch. 1777).

641. *Scutellaria hastifolia* L. (G. Brück. 1828) an der Elbe und Elde bei Dömitz seltener, häufiger bei Boizenburg und im Gebiete der Flora von Hamburg.

642. *Prunella vulgaris* L. (L. Sch. 1777).

643. *Prunella grandiflora* Jacq. (T. 1788) häufig bei Kemplin, auch bei der Breslauer Ziegelei unv. Neustrelitz; liebt kalkhaltigen Boden.

644. *Ajuga reptans* L. (L. Sch. 1777).

645. *Ajuga genevensis* L. (L. Sch. 1777 fälschlich als *pyramidalis*).

646. *A. pyramidalis* L. (Giesebr. 1837) bei Mirow in der Allee; ich habe selbst ein von dorthier stammendes Ex. in Betkes Herbarium gesehen. Auch im Gebiete der Flora von Berlin kommt diese Art vor.

647. *Teucrium Scordium* L. (L. Sch. 1777) häufig auf den Wiesen der Haldeebene und auch durch das übrige M. verstreuet, aber selten.

T. Scorodonia L. (im holsteinischen Elbgebiete und auf Rügen) soll nach Fink (1795) in Wäldern bei Rostock wachsen, wird aber von keinem anderen einheimischen Botaniker weiter erwähnt, weshalb es wohl mit Recht ausgeschlossen bleibt.

648. *Verbena officinalis* L. (L. Sch. 1777).

69. Verbenaceae.

649. *Pinguicula vulgaris* L. (L. Sch. 1777); häufig durch ganz M., sogar auf Seefrandswiesen.

70. Lentibulariaceae.

650. *Utricularia vulgaris* L. (L. Sch. 1777).

651. *Utricularia neglecta* Lehm. (Landt 1837) im Torfmoor bei Mirow.

652. *Utricularia intermedia* Hayne (Beuthe 1828) bei Neustrelitz am Zierker See und auf den sumpfigen Wiesen am Serran-See bei dem Schweizerhause; Schwerin in Torfgruben auf dem Werder; Ludwigslust?

653. *Utricularia minor* L. (L. Sch. 1777) weit durch M. verbreitet, obgleich seltener als *vulgaris*.

Anm. Die Utricularien haben eben denselben veränderlichen Character, welchen so viele Wasserpflanzen besitzen, und ihre Arten bedürfen in M. noch einer genauen Revision. Wahrscheinlich besitzen wir deren noch mehr, als die vier vorstehend genannten, aber über die specifische Selbstständigkeit der *U. spectabilis* Madauss und *U. macroptera* G. Brück. (bei Schreiber 1853) aus dem Gebiete der Grabower Flora möchten doch noch sorgfältigere Untersuchungen nöthig sein, bevor wir ihnen das Speciesrecht zuertheilen dürfen. Nach einem Briefe von Detharding stimmte ein Ex. der *U. macroptera*,

welches Brückner ihm geschickt, so genau mit der in der Flora Danica t. 128 dargestellten *Utricularia* überein, als wenn die Abbildung nach jenem Gr. gemacht wäre. Zu welcher Art aber die dargestellte Pflanze zu ziehen sei, darüber herrschen unter den Botanikern Meinungsverschiedenheiten.

71. *Primula-*
ceae.

654. *Trientalis europaea* L. (T. 1788) in der Haideebene sehr häufig! ebenso auch im nördlichen Haidegebiete bei Ribnitz; außerdem durch M. zerstreuet (Glüstrów, Döberau, Tessin, Dargun! u. a. D.), am seltensten in M. Strelitz, wo sie bisher nur bei Neustrelitz! von Langmann gefunden wurde. (S. 41.)

655. *Lysimachia thyrsiflora* L. (T. 1788).

656. *Lysimachia vulgaris* L. (L. Sch. 1777).

657. *Lysimachia Nummularia* L. (L. Sch. 1777).

658. *Lysimachia nemorum* L. (T. 1791) Rostock im Mönchweiden, Lübbsee untw. Daffow, Schwerin auf dem Werder, Grabow im Neeser Holz bei Marienhof; fehlt in M. Strelitz.

* 659. *Anagallis arvensis* L. (L. Sch. 1777) auf cult. Boden allgemein eingebürgert. S. 32. 37. 138.

β. *coerulea* Schreb. (v. Kamptz 1806) bei Mirow und A. Karin; diese Var. soll kalkhaltigen Boden lieben.

660. *Centunculus minimus* L. (T. 1788) häufig in M., auch bei Warnemünde.

661. *Primula farinosa* L. (Flörke 1795) auf den Wiesen rings um den Neubrandenburger Werder herum! im Bruch bei der Neubrandenburger Papiermühle! auf der großen Friedländer Wiese; bei Galenbeck untw. Friedland überzieht sie die Wiesen mit einem rothen Flor! auf den Peenewiesen bei Zettchenhof untw. Malchin; auf den Neck-

nitzwiesen; auf den Wiesen bei Warnemünde nach Markgrafenheide zu.

662. *Primula officinalis* L. (L. Sch. 1777). S. 123.

663. *Primula elatior* Jacq. (D. 1809) bei Ramin unv. Wittenburg häufig; in Wäldern und Wiesen der Daffower Gegend häufiger als die vorige.

P. acaulis, angeblich von Detharding bei Petschow und Neuburg unv. Wismar gefunden, wo aber Wülfnei sie in neuerer Zeit vergebens gesucht hat, ist ohne Zweifel zu streichen, da D. wahrscheinlich nur verkümmerte Ex. der *P. elatior* vor sich gehabt hat; s. Griewank in Archiv VIII. S. 179.

664. *Hottonia palustris* L. (L. Sch. 1777).

665. *Samolus Valerandi* L. (T. 1791) eine See- und Salinenpflanze, auch bei Rühn. S. 96.

666. *Glaux maritima* L. (T. 1788) Seestrands- und Salinenpflanze, aber auch (von E. Arndt) zw. Menkendorf und Bresgard in der Haldeebene an Gräben gefunden, wodurch auch dort ein Salzgehalt des Bodens (der $\frac{1}{2}$ M. weiter südlich bei Ronow schon gefunden ist,) angezeigt wird.

667. *Armeria vulgaris* W., L. sp. (L. Sch. 1777). S. 33. ^{72. Plumbagineae.}

β. maritima Wild. (Deth. 1809) am Seefernde z. B. auf Pöl, bei St. Jacob an der Wismarschen Bucht und bei Warnemünde.

Ann. Vergl. über diese Art E. Griewank im Archiv VIII. S. 180 wo derselbe ihr Speciesrechte vindicirt. Auch noch später (im J. 1855) schreibt mir derselbe: „ich habe sie neuerdings sorgfältig untersucht, und sie constant von der vorigen unterschieden gefunden: Wurzel vielköpfig, Wuchs rasenartig, Blätter kurz, schmal-linealisch, stumpf, Schaft behaart, Hüllblättchen stumpf, mit kurzer Stachelspitze, Kelche zottig, Höhe der Pflanze 4 bis 6". Es ist dies wirklich die in den Gärten zur Einfassung der Beete benutzte „Grasnelke.“ G. Griewank scheint sie dagegen auch als Var. der *vulgaris* zu betrachten.

668. *Statice Limonium* L. (T. 1795) am Seefrande bei Markgrafenheide, am Binnenwasser bei Wustrow und auf der Insel Bül! aber auch auf Salzwiesen bei Sülten univ. Brühl.

73. *Plantagineae.*

669. *Littorella lacustris* L. (T. 1791) am Langwitzer See unweit Bafedow, Grabow im Moor an der Ludwigsluster Chaussee, Neustadt am See, am Mechower See im Rakeburgischen.

670. *Plantago major* L. (T. 1788). S. 36.

671. *Plantago media* L. (T. 1788) weit durch M. verbreitet, aber „selten in der Haldeebene. Ich sah sie hier noch nicht“ (G. Brückner).

672. *Plantago lanceolata* L. (T. 1788).

β. *sericea* W. (D. 1809) an sandigen Stellen des Meeresufers.

673. *Plantago maritima* L. (T. 1788) Seefrandspflanze, auch noch am Daffower Binnensee auf Wiesen und Niederungen. S. 39.

β. *dentata* K.

674. *Plantago Coronopus* L. (T. 1788) Seefrandspflanze.

675. *Plantago arenaria* W. K. (Treviranus 1828) in sandigen Gegenden der Haldeebene (z. B. bei der Dömitzer Kalkbrennerei) und auch bei Mirow auf d. Weinberge.

Amaranthaceae.

Amaranthus Blitum Koch (T. 1788) und *retroflexus* L. (Schreib. 1853) hin und wieder als Gartenunkraut verwildert.

74. *Chenopodeae.*

676. *Chenopodium maritima* L. sp. (T. 1788) häufig am Seefrande und auch bei der Sülzer Saline (Zab.).

677. *Salsola Kali* L. (T. 1788) am Seefrande, und am Elbufer! häufig.

678. *Salicornia herbacea* L. (T. 1788) Seestrands- und Salineupflanze.

679. *Polycnemum arvense* L. (Meyer 1828) Grabow auf dem Krohusberge, bei Wanzlig und auf dem Karstädter Berge; am Ostorfer Berge bei Schwerin; bei Güstrow? am Hahnenberge bei Broda unv. Neubrandenburg sehr selten!

Echinopsilon hirsutus L. sp. will Detharding einmal bei Warnemünde zwischen *Chenopodina maritima* gefunden haben, in neuerer Zeit aber hat man dort vergebens darnach gesucht (C. Griewant).

* 680. *Chenopodium hybridum* L. (T. 1788).

* 681. *Chenopodium urbicum* L. (T. 1795).

* 682. *Chenopodium murale* L. (T. 1788).

* 683. *Chenopodium album* L. (L. Sch. 1777).

β. *opulifolium* Schrad. (Neuendorf 1828 in litt. ap. Dethard.) bei Rostock.

* 684. *Chenopodium glaucum* L. (T. 1788).

* 685. *Chenopodium polyspermum* L. (T. 1788).

* 686. *Ch. Vulvaria* L. (T. 1788) bei Rostock, Malchin (am Steinhore) und Mirow als Gartenunkraut eingebürgert. S. 32.

Ch. Botrys L. (Brockm. 1853) seit dem J. 1844 mit fremden Samereien in einigen Ludwigsluster Gärten als Unkraut eingeschleppt.

Blitum virgatum L. (A. Brückn. 1817) hin und wieder verwildert, z. B. bei Neustrelitz und Räbelich.

* 687. *Blitum bonus Henricus* L. sp. (L. Sch. 1777).

* 688. *Blitum rubrum* L. sp. (L. Sch. 1777).

Anm. Alle Arten der Gattungen *Chenopodium* und *Blitum* sind im Geleite der Kulturpflanzen eingebürgert.

Obione portulacoides L. sp. (T. 1791) Seestrandspflanze, früher bei Warnemünde, ist nach C. Griewant's Versicherung dort in vielen

Sahren nicht mehr gesehen worden, und scheint an unserer Küste verschwunden zu sein.

689. *Obione pedunculata* L. sp. (Link 1808) Seestrandspflanze, häufig bei Warnemünde und Rörvershagen.

Atriplex hortense L. (Brück. 1803) Gartensflüchtling.

690. *Atriplex litorale* L. (T. 1791).

β. *marinum* (D. 1828) — beide Formen nur am Seefstrande.

691. *Atriplex angustifolium* Sm. (L. Sch. 1777) eingebürgert?

692. *Atriplex latifolium* Wahlb. (L. Sch. 1777) eingebürgert? Diese Art ist reich an Formen:

α. *vulgare*.

β. *validum, robustius*.

γ. *prostratum* am Seefstrande.

δ. *oppositifolium* (A. Sackii R. S.) am Seefstrande und um Salzquellen z. B. bei Süsten unt. Brühl (Griew.)

ε. *microspermum*.

ζ. *laciniatum* Schk.! non L. (Link 1810) am Seefstrande bei Warnemünde und um die Saline bei Sülz.

* 693. *Atriplex roseum* L. (Brück. 1803) auf Schutt in Zabel im N. Dömitz, und auf Salzboden bei Warnemünde eingebürgert.

Anm. Vergl. über diese Gattung Heugel in den Arbeiten des naturforsch. Ver. in Riga Bd. I. S. 257 ff.

75. Polygo-
neae.

694. *Rumex maritimus* L. (T. 1788) am Seefstrande und im Binnenlande häufig.

β. *palustris* Sm. (D. 1828) mit der Stammart, von welcher diese Var. sich durch keine beständigen Merkmale trennen läßt; s. C. Griew. im Archiv I. S. 22.

695. *Rumex conglomeratus* Murr. (L. Sch. 1777) (403)
als *acutus*). S. 124.

696. *Rumex obtusifolius* L. (T. 1791).

697. *Rumex crispus* L. (L. Sch. 1777).

698. *Rumex Hydrolapathum* L. (T. 1795).

699. *Rumex aquaticus* L. (L. Sch. 1777) bei Neubrandenburg häufig im Brüderbruch! bei Malchin am Furth! an der Peene bei Grubenhagen u. s. w.

(698 + 699.) *R. aquatico-Hydrolapathum* Mey. (*heterophyllus* Schultz 1819) bei Neubrandenburg im Brüderbruch, bei Neustrelitz und bei Malchin am Furth gefunden.

700. *Rumex sanguineus* L. (D. 1828 *nemorosus* Schr.).

701. *Rumex Acetosa* L. (L. Sch. 1777).

702. *Rumex Acetosella* L. (L. Sch. 1777). „Rohde Süßrhen“ (S. 40), Anzeichen eines saueren, unfruchtbaren Bodens, den es mitunter wie mit einem bräunlich-rothen Flor überzieht, dem Kasse aber so abhold, daß es nach dem Mergeln sogleich völlig verschwindet.

703. *Polygonum Bistorta* L. (T. 1788).

704. *Polygonum amphibium* L. (L. Sch. 1777).

β. *maritimum* Deth. „caule prostrato, foliis lanceolatis, acuminatis, undulatis strigosis, subcordatis sessilibus, spicis subgeminatis terminalibus erectis.“ Am sandigen Meeresufer.

705. *Polygonum lapathifolium* L. (Ditmar 1809) vielleicht nur (wie auch die folgenden beiden Arten) eingebürgert?

β. *nodosum* Pers. (Prahl 1837).

γ. *incanum* Link 1810.

706. *Polygonum Hydropiper* L. (T. 1788).

707. *Polygonum Persicaria* L. (L. Sch. 1777).

β. mite Schrk. (Beuthe 1841) nur erst bei Neustrelitz und Grabow beachtet, aber wahrscheinlich viel weiter durch M. verbreitet; nach Wimmer Fl. v. Schlesien ein Bastard der beiden vorigen, worauf zu achten!

γ. minus Huds. (Schultz 1806).

708. *Polygonum aviculare* L. (L. Sch. 1777). S. 40.

β. litorale Link 1810, aufrecht und wenig ästig.

γ. salinum, foliis crassiusculis, Link 1810 am Strande und um Salinen.

* 709. *Polygonum Convolvulus* L. (L. Sch. 1777). eingebürgert.

* 710. *Polygonum dumetorum* L. (T. 1788) eingebürgert.

P. Tataricum L. hin und wieder zwischen dem cultivirten *P. Fagopyrum* L. (Buchweizen).

Thymeleae. *Daphne Mezereum* L. (Brockm. 1852) verwildert im Park zu Neese unweit Grabow in einem Erlenbruche. S. 138.

76. Santalaceae. 711. *Thesium ebracteatum* Hayne. (Wredow 1809) scheint durch die ganze Haideebene, wenn auch nur sparsam, verbreitet zu sein.

712. *Thesium intermedium* Schr. (Thede 1808) wurde bisher nur einmal bei Wittenburg gefunden; auch Link mscr. citirt diesen Fund und C. Griewank besitzt aus der Wredowschen Doubletten-Sammlung ein angeblich bei Wittenburg gesammeltes Exemplar. Da sich nun dieser Fundort sehr gut an das häufigere Vorkommen dieser Art im Gebiete der Hamburger Flora anschließt, so dürfen wir dieser Species das Bürgerrecht wohl nicht vorenthalten.

77. Eleagreae. 713. *Hippophaë rhamnoides* L. (Becker 1805) an

der Ostseeküste, besonders auf den hohen Lehmufern des Klützer Orts! liebt, ohne auf salzhaltigen Boden angewiesen zu sein, dennoch die Meeresküste, und ist an derselben auch durch Rügen, Pommern und Preußen weit verbreitet. (S. 33.)

* 714. *Aristolochia Clematitis* L. (T. 1788) früher ^{78. Aristolochiaceae.} als officinell cult., jetzt verwildert und eingebürgert, besonders im westlichen und südwestlichen M. (z. B. bei Boizenburg! Redefin, Ludwigslust, Grabow, Parchim), aber auch bei Mummendorf unv. Dassow, Sternberg, Güstrow, Dobertin und Malchow; Malchin? S. 138.

Asarum europaeum L. soll von Wredow 1809 bei Redefin in der Haideebene gef. sein, bleibt aber, da sichere Beweise für diesen Fund fehlen, noch zweifelhaft, obgleich es dort wohl vorkommen könnte, da es im Geb. d. Fl. von Hamburg wächst.

715. *Empetrum nigrum* L. (T. 1791) auf dem ^{79. Empetretaceae.} Sukower Torfmoor bei Crivitz, in der Wooster Haide bei Goldberg, im Torfmoor bei Ikendorf, Sülz und Gölde-
nitz; bei Warnemünde.

* 716. *Euphorbia helioscopia* L. (L. Sch. 1777) ein- ^{80. Euphorbiaceae.} gebürgert. S. 138.

717. *Euphorbia palustris* L. (L. Sch. 1777) auf den Wiesen der Haideebene, auch bei Markgrafenheide und dem Schnatermann unv. Rostock, und am Landgraben bei Friedland.

718. *Euphorbia Cyparissias* L. (T. 1791) in den sandigen Gegenden des südl. M. häufig, in M. Strelitz die Nordgränze ihres Vorkommens bei Neustrelitz, und in den angränzenden Theilen von M. Schwerin bei Ankers-
hagen (Bette) erreichend.

719. *Euphorbia Esula* L. (Hahn 1809) an Acker-

rändern und Wegen in der Haideebene ziemlich häufig! fehlt in M. Strelitz.

* 720. *Euphorbia Peplus* L. (L. Sch. 1777) eingebürgert.

* 721. *Euphorbia exigua* L. (D. 1809) im Gebiete der Ostseeküste zw. dem Dassower Binnensee und dem Breitling nicht selten; aber auch bei Penzlin an dem Ränderberge und bei Mirow; unter der Saat eingebürgert.

722. *Mercurialis perennis* L. (L. Sch. 1777). S. 138.

* 723. *Mercurialis annua* L. (T. 1788) nur als Gartenunkraut eingebürgert; fehlt im südöstlichen Haidegebiete und im Gebiete der Schweriner Flora; der südwestlichste bekannte Standort ist Marnitz. S. 138.

81. *Urticeae*. * 724. *Urtica urens* L. (L. Sch. 1777). S. 33. 124.

* 725. *Urtica dioica* L. (L. Sch. 1777). S. 32. 124.

* 726. *Parietaria officinalis* L. (L. Sch. 1777) Penzlin, Malchin, Parchim, Rostock (an den Mauern des Klostergartens), Wismar auf der Reiserbahn. S. 31.

Cannabis sativa L. (T. 1788) cultivirt und verwildert.

* 727. *Humulus Lupulus* L. (L. Sch. 1777) cultivirt, und verwildert eingebürgert? S. 124.

728. *Ulmus campestris* L. (L. Sch. 1777). S. 34. 39. 124.

β. *suberosa* Ehr.

729. *Ulmus effusa* W. (Flörke 1793) häufig angepflanzt, — ob ursprünglich einheimisch?

82. *Cupuliferae*.

730. *Fagus sylvatica* L. (L. Sch. 1777). S. 36. 75.

731. *Quercus Robur* L. (L. Sch. 1777).

732. *Q. sessiliflora* Sm. (T. 1788). S. 29. 75. 124.

733. *Corylus avellana* L. (L. Sch. 1777).

734. *Carpinus Betulus* L. (L. Sch. 1777). S. 33.

Anm. Ueber d. merkw. Weiß-Buche b. Burg Schlig s. Archiv V. 221.

735. *Salix pentandra* L. (L. Sch. 1777). S. 31. 124. ^{83. Salici-}

736. *S. fragilis* L. (L. Sch. 1777). S. 39. 124. ^{neac.}

(735 + 736.) *S. pentandra-fragilis* Wim. (*cuspidata* Schultz 1819).

Anm. Ueber die Weiden-Bastarde s. Wimmer in der Denkschrift der Schlesischen Gesell. für vaterländ. Cultur 1853.

737. *S. alba* L. (T. 1788). S. 36. 124.

β. *vitellina* L. (T. 1788). S. 32.

(736 + 737.) *S. fragilis-alba* Wim. (*Russeliana* Sm. Schultz 1819).

738. *S. amygdalina* L. (T. 1788). Vergl. *S. triandra* S. 31. 124.

739. *S. viminalis* L. (T. 1788). S. 30.

(738 + 739.) *S. triandra-viminalis* Wim. (*undulata* Ehr. Lk. 1810) selten: bei Pentslin, im Zasniker Garten univ. Ludwigslust. Ein unfruchtbarer Bastard.

740. *S. holosericea* W.? (Willebr. 1852) im westl. M., in einer alten Sandgrube links am Wege von Granzin nach Stolpe. Ich habe sie nicht gesehen.

741. *S. acutifolia* W. (C. Griew. 1847. 41!) in den Hambergen bei Grevismühlen, Hagenow auf dem Hagen, Birzow bei Grabow.

742. *S. purpurea* L. (T. 1788) S. 124.

743. *S. cinerea* L. (Becker 1805). S. 31.

β. *aquatica* Sm.

744. *S. Caprea* L. (T. 1788). S. 34. 38.

(739 + 744.) *S. viminali-Caprea* Wim. = *Smithiana* Willd. (Betzke 1840!) auf der Wiese zw. Tolense und Lieps.

745. *S. aurita* L. (T. 1788).

β. uliginosa Willd. (Schultz 1819).

746. *S. repens* L. (L. Sch. 1777).

α. repens L. (*depressa* T. 1791).

β. fusca Sm.

γ. argentea Sm. (*arenaria* T. 1791) auf sandigem Boden am Seestrande und im Binnenlande.

δ. rosmarinifolia L. (L. Sch. 1777).

ε. vitellina (*laeta* Schultz 1819).

(739 + 746.) *S. viminali-repens* Wim. (*angustifolia* Fr., Zabel 1859!) in den Dünen des Binnenstrandes bei Dierhagen.

(745 + 746.) *S. repens-aurita* Wim. (*ambigua* Ehr. und *spathulata* Schultz 1819) ein unfruchtbarer Bastard.

747. *Populus tremula* L. (L. Sch. 1777). S. 29.

P. alba L. (L. Sch. 1777) wird angepflanzt und bildet mit der vorhergehenden den Bastard:

P. alba-tremula Wim. (*canescens* Sm. Lk. 1810).

P. pyramidalis Roz. (Langm. 1841) allgemein angepflanzt an den Landstraßen u. s. w., in neuester Zeit jedoch (wie auch in anderen deutschen Ländern) weniger, weil sie durch ihren Schatten und die weitgreifenden Wurzeln den Acker benachtheiligt, und sie außerdem auch noch der Raupenzucht Vorschub leisten soll. Wie weit dieser letztere Vorwurf begründet ist, darüber kann ich nicht entscheiden, nur glaube ich bemerkt zu haben, daß hier bei Neubrandenburg die Gärten vor dem Treptower Thore, an denen eine Pappelallee entlang führt, häufiger von den Raupen heimgesucht sind, als unsere anderen Gärten. — Das größte Ex. dieses Baumes, welches ich in M. gesehen, stand früher neben dem großherzogl. Schlosse in Ludwigs Lust, und erreichte mit seinem Wipfel gerade die Höhe der Plattform dieses Gebäudes, die, wenn ich nicht irre, 100' hoch liegt. Diese schöne Pappel wurde durch den Novembersturm 1836 umgestürzt.

P. balsamifera L. kommt nur angepflanzt vor.

748. *Populus nigra* L. (T. 1788). S. 29. 124.

749. *Betula alba* L. (L. Sch. 1777) = *verrucosa* ^{84. Betuli-}
 Ehr. S. 112. ^{neae.}

β. *pendula*. γ. *laciniata* Wahlb.

750. *B. pubescens* Ehr. (Brück. 1803) bleibt z. B. bei Neubrandenburg auf den Birkbuschwiesen immer strauchartig und ihre Blätter sind an der Basis herzförmig oder gerade abgestutzt. Eine Vereinigung mit der vorigen halte ich für unmöglich.

751. *B. humilis* Schrk. (Brück. 1793) auf den Tolense- und Recknitz-Wiesen (bei Schulenburg und Zarnow) häufig.

Anm. Auch *B. odorata* Bech. soll in M. vorkommen, doch fehlt mir ein sicherer Nachweis dafür.

752. *Alnus glutinosa* L. sp. (L. Sch. 1777). S. 32.

Anm. *A. incana* DC. wird nur hin und wieder angepflanzt.

753. *Myrica Gale* L. (T. 1791) zwischen dem Breit- ^{85. Myri-}
 ling und Ribnitz in großer Menge; auch auf den Recknitz- ^{ceae.}
 wiesen und auf dem Fischlande. S. 138.

* * *

754. *Taxus baccata* L. (Lk. 1810) hin und wieder ^{86. Conife-}
 in der Rostocker Haide, scheint sich aber immer mehr zu ^{rae.}
 verlieren, wie dies auch in der Stubnitz auf Rügen der Fall sein soll. S. 34.

755. *Juniperus communis* L. (L. Sch. 1777). S. 32. 112. 124.

756. *Pinus sylvestris* L. (L. Sch. 1777). S. 124.

Anm. *P. Abies* L., *Larix* L., *Picea* L. und *Strobus* L. kommen nur angepflanzt vor.

II. Monocotyledoneae.

87. Hydro-
charideae.

1. *Stratiotes aloides* L. (L. Sch. 1777) häufig. S. 29.

2. *Hydrocharis morsus Ranae* L. (L. Sch. 1777).

88. Alisma-
ceae.

3. *Alisma Plantago* L. (L. Sch. 1777). S. 138.

β. *lanceolatum* With.

γ. *graminifolium* Wahl. (Deth. 1828) im
Dassower See (C. Griew.).

4. *Alisma parnassifolium* L. (T. 1828 bei Deth.)
in und am See bei dem Bafedower Theerosen! und im
Langwitzter See untt. Bafedow.

5. *Alisma natans* L. (T. 1788) nicht häufig, z. B.
bei Neubrandenburg, Ducheow untt. Malchin (Zab.), Neu-
stadt und Ludwigslust (Vetche).

β. *lanceolatum* G. Brückn. (foliis ovato-
lanceolatis, acutis) bei Neubrandenburg.

6. *Alisma ranunculoides* L. (T. 1795) bei Rossow
untt. Lage auf dem Moor, bei Toitenwinkel, bei Rostock
rechts von der Fähre, bei Schwerin am Dstorfer See!

7. *Sagittaria sagittaeifolia* L. (L. Sch. 1777).

89. Buto-
meae.

8. *Butomus umbellatus* L. (L. Sch. 1777).

90. Juncagi-
neae.

9. *Scheuchzeria palustris* L. (T. 1788).

10. *Triglochin maritimum* L. (T. 1788) häufig auf
salzhaltigen und nicht-salzhaltigen Wiesen. S. 38.

11. *Triglochin palustre* L. (L. Sch. 1777). S. 32.

91. Pota-
meae.

12. *Potamogeton natans* L. (T. 1788). S. 33. 39.

β. *fluitans* Roth. (D. 1809) selten, nach Prah!
bei Güstrow in den Gräben an der Nebel nach der Primer
Burg zu, — der einzige, speciell namhaft gemachte Stand-

ort. — Die bei Hamburg vorkommende Var. *γ. oblongus* Viv. ist in M. noch nicht bemerkt.

13. *Potamogeton rufescens* Schrad. (T. 1791 serratus).

14. *Potamogeton gramineus* L. (L. Sch. 1777).

β. nitens Web. (Schultz 1837) im Weissdiner See unv. Neustrelitz, Güstrow im Gutower See, Schwerin auf der Wiese bei dem neuen Pulvermagazin, im Neustädter See (und zwar die Form *curvifolius* Hartm.).

15. *Potamogeton lucens* L. (T. 1788.)

β. decipiens Nolte im Schaalsee (sec. Garcke).

Num. Betcke fand diese Art in der Elbe (nicht im Neustädter See,) mit Blättern von mehr als 1' Länge; die größten, welche ich gesehen, hatten Gr., die ich im J. 1859 im Herthasee auf Gasmund sammelte; sie maßen 9" Par. in der Länge und 1½" in der Breite.

16. *Potamogeton praelongus* Wulf. (Thede 1809). im Barnimschen See des Antes Crivitz; im Geveziner See; in der Tolense!

17. *Potamogeton perfoliatus* L. (T. 1788).

18. *Potamogeton crispus* L. (L. Sch. 1777).

19. *Potamogeton compressus* L. (T. 1788? *complanatus*).

β. acutifolius Link 1828 z. B. bei Pentzlin und Zippelow (an der Pies) in einem Wasserloch auf dem Felde (Betcke).

20. *Potamogeton obtusifolius* M. K. (Schultz 1806 *compressus*!)

21. *Potamogeton mucronatus* Schr. (Boll 1859) sehr häufig im Tolensefluß bei Neubrandenburg (zw. der Bierradenmühle und dem See!).

22. *Potamogeton pulsillus* L. (L. Sch. 1777).

β. *tenuissimus* (Beuthe 1837) im Weißbinner See unweit Neustrelitz.

23. *Potamogeton pectinatus* L. (T. 1788).

β. *marinus auctor. non L.!* (T. 1791) in der Ostsee bei Wismar, Daffow, Travemünde.

24. *Potamogeton filiformis* Pers. = *marinus* L. (Schultz 1806) in der Tolenze bei Broda! und Meiershof! im Ziegelsee bei Schwerin vor der Ziegelei auf dem Werder; aber auch im Salzwasser des Kl. Jasmunder Boddens im J. 1857 und 59 von mir gefunden.

Anm. Das Vorkommen dieser Art im Salzwasser ist mehrfach in Abrede gestellt worden, aber mit Unrecht. Die Ex. aus dem Jasmunder Bodden zeigen auch nicht die geringsten Unterschiede von denen aus der Tolenze, beide aber weichen so erheblich von *P. pectinatus* β. ab, daß schon F. Schultz im sup. I. meint, wenn *marinus auctor.* und *pectinatus* nach Smiths Vorgang zusammengezogen würden, müßten die Tolenze-Ex. wenigstens als var. *lacustris* davon getrennt werden. Der echte *P. pectinatus* kommt übrigens gleichfalls in der Tolenze vor, und zwar an demselben Standorte, wo *filiformis* bei Meiershof wächst. Beide sind auf den ersten Blick von einander zu unterscheiden.

25. *Potamogeton densus* L. (Langm. 1841) in der tiefen Kuhle auf den Bahler Weideköpeln unweit Boizenburg. Häufig im Gebiete d. Flora von Hamburg.

26. *Ruppia maritima* L. (C. Griew. 1839) im Daffower Binnensee und in der Wismarschen Bucht.

27. *R. rostellata* Koch (T. 1797) im Breitling hinter dem Pinnengraben häufig und auch auf der Wiese bei Warnemünde; an der Wismarschen Bucht; bei Daffow; in Gräben bei Wustrow auf dem Fischlande (Zabel).

28. *Zannichellia palustris* L. (T. 1788) bei Güstrow im Sumpffsee.

β. *pedicellata* Wahlb. (C. Griew. 1839) in der Ostsee, und in Salzlachen an deren Ufer bei Rosenhagen, Harkensee und Warnemünde; in Gräben bei Wustrow auf dem Fischlande (Zabel).

29. *Najas marina* L. (major Roth, D. 1808) im Breit-^{92. Naja-}
ling an den Warnemünder Wiesen und überhaupt um ^{deae.}
Rostock herum häufig; im Daffower See; im Neumühler See bei Schwerin; im Rahnenfelder See bei Penzlin; in der Tolense dicht bei der Rehser Landzunge, und zwar hier viel ästiger und dabei zarter im Bau, wie an den übrigen Standorten (Betzke).

Ann. Ueber diese letztere etwas abweichende Form schreibt De-
tharding 1830 an Betzke: „Ihre *Najas* ist nichts anderes als *N. ma-*
rina. Die Pflanze ist diöcistisch, und demgemäß sind bei verschiedenen
Exemplaren, je nachdem männliche oder weibliche vorliegen, auch die
Blüthentheile verschieden gebildet. In tiefen Gewässern, wie bei
Warnemünde und im Daffower Binnensee, wird sie viel länger und
treibt keine Gelenkwurzeln, im seichten Wasser aber legt sie sich nieder
und treibt fast aus jedem Gelenk lange Wurzelfasern.“ Außer dem
tieferen und seichteren Wasser, ist auch ohne Zweifel der vorhandene
oder mangelnde Salzgehalt desselben auf die Ausbildung der Pflanze
von Einfluß.

30. *Zostera marina* L. (T. 1788) am ganzen Ostsee-
strande. S. 128.

31. *Lemna trisulca* L. (L. Sch. 1777).

93. *Lemna-*
ceae.

32. *Lemna polyrrhiza* L. (T. 1788).

33. *Lemna minor* L. (L. Sch. 1777). S. 30.

34. *Lemna gibba* L. (T. 1788).

35. *Typha latifolia* L. (L. Sch. 1777). S. 31. 36. ^{94. Typha-}
^{ceae.}

36. *Typha angustifolia* L. (T. 1788).

37. *Sparganium ramosum* Huds. (Brück. 1803).

38. *Sparganium simplex* Huds. (L. Sch. 1777).

39. *Sparganium minimum* Fr. (T. 1788 *natans*).

95. *Aroldese.*

40. *Arum maculatum* L. (T. 1788) in feuchten Gehölzen des Klützer Orts, am Wallgraben bei Rostock, im Ludwigsluster und Rempliner Park. An den drei letztgenannten Orten wohl nur verwildert; der erstere reihet sich an die Standorte im Lauenburgischen und Hamburgischen an. S. 138.

41. *Calla palustris* L. (T. 1788) bei Ludwigslust in der Gegend der Liep! bei Grabow am Eldesfer u. a. D., bei Schwerin a. m. D., in der Milbenitz bei Goldberg, bei Neustrelitz, in einem Bruche auf dem Wanzkaer Felde! bei Prilwitz in einem Bruche nach Hohenzieritz zu, bei Kl. Nemerow und bei der Kotelower Mühle. S. 138.

* 42. *Acorus Calamus* L. (L. Sch. 1777) soll erst im 15. Jahrhunderte als Arzeneimittel aus Asien nach Europa verpflanzt sein, — jetzt allgemein eingebürgert. S. 30. 125.

96. *Orchideae.*

43. *Orchis militaris* L. (L. Sch. 1777 fälschlich als *mascula*) auf kleinen Feldwiesen zw. Broma, Schönbeck und Rattey unweit Friedland! am Gehölze bei Remplin; auf den Reethwiesen bei Boizenburg? S. 125.

Ann. Ich vereinige unter vorstehendem Namen *O. purpurea* Huds. und Rivini Gouan.

44. *Orchis Morio* L. (L. Sch. 1777) im östlichen M. (z. B. bei Neubrandenburg!) nicht selten, auch am See-Strande bei Warnemünde häufig; selten auf Pfl. S. 125.

45. *Orchis mascula* L. (T. 1791) in Gehölzen bei Daffow, im Steinfelder Holz bei Schwerin, im Niendorfer

Holz zw. Bassdorf und Brunsbaupten, bei Steinhagen südlich vom Malchiner See. S. 125.

46. *Orchis laxiflora* Lam. (C. Griew. 1839. 30!) in einem Torfmoore bei Pötenitz am Britwal und auf einer Wiese bei Rosenhagen; bei Markgrafenheide (Brinkmann); bei Malchin auf der Wiese vor dem Mühlenthore, rechts; in 1 Ex. bei Penglitz 1856 gef. (Vetcke). — Fehlt in M. Strelitz, namentlich bei Jakske, wo Schulz sup. 2 sie angiebt. S. 125.

Anm. Ein im J. 1812 bei Demmin im Eichholz von A. F. Brückner gesammeltes Ex. besitze ich in meinem Herbarium; dieser Standort fehlt bei Jabel.

47. *Orchis maculata* L. (L. Sch. 1777).

48. *Orchis latifolia* L. (L. Sch. 1777).

49. *Orchis incarnata* L. = *angustifolia* Wim. (Prah 1837) durch ganz M. verbreitet.

β. *ochroleuca* (Wüsten. 1854) Kronen weißlich-gelb, die Mitte der Unterlippe rein-gelb, ohne alle Spur einer durch dunklere Punkte und Linien hervorgebrachten Zeichnung, wie die Stammart eine solche zeigt; der Stengel meist etwas kürzer, als bei dieser, und sehr dick (bei einem vorliegenden Ex. beträgt sein oberer Durchmesser, unmittelbar unter der Blütenähre, 7^{mm}). — Auf Wiesen bei Sternberg, Cölsin unv. Crivitz, Rodenwalde unv. Wittenburg, Krakow, Neubrandenburg im Wolfswinkel (hier am 27. Juni 1857 von mir gefunden).

Anm. *O. sambucina* im Archiv VIII. 96 ist zu streichen; die als solche beanspruchten Ex. gehören dieser Varietät der *incarnata* an.

50. *Gymnadenia conopsea* L. sp. (T. 1788).

51. *Platanthera bifolia* L. sp. (T. 1788). In der

Umgegend von Neubrandenburg früher häufig, in den letzten 10 Jahren aber viel seltener geworden (S. 78). In anderen Gegenden Meßlenburgs noch sehr häufig.

β. montana Reichb. (Schmidt Wismariens. 1850) auf dem Potreniser Torfmoor unvw. Rostock, bei Hagenow, Quast und in Gehölzen bei Daffow.

Anm. „Ich habe mich völlig überzeugt (schreibt mir G. Brückner), daß die *P. montana* (*chlorantha*) nur eine Abart der *bifolia*, — und das kaum, — ist. Alle angegebenen Zeichen sind unstät, und finden sich fast nur mehr an den größeren, stärkeren Exemplaren.“

52. *Ophrys muscifera* Huds. (C. v. Oertzen 1828) bei Brunn unvw. Neubrandenburg; bei Neubrandenburg auf den Wiesen hinter der Kuhweide! bei Galenbeck unweit Friedland an der Teufelsbrücke, — also nur in der nördlichen Hälfte von M. Strelitz.

53. *Herminium Monorchis* L. sp. (T. 1788) bei Malchin auf dem Bornberge, — andere Standorte sind mir nicht bekannt.

54. *Anacamptis pyramidalis* L. sp. (Danneel 1843) bei Remplin, sehr selten.

55. *Epipogon aphyllus* (Sw.) L. sp. (Meyer 1836) bei Schwerin auf dem Werder auf Buchenwurzeln.

56. *Cephalanthera pallens* Sw. sp. (T. 1788) bei Ratzeburg, Schwerin hinter Wickendorf im Gehölz, Döberan am Buchenberge, im Rempliner Holz am Saatenberge, Neustrelitz in der Ralkhorst.

57. *Cephalanthera Xiphophyllum* L. fil. sp. (T. 1788) im Rempliner Holz selten, bei Brudersdorf unvw. Demmin am Fußsteige nach Levin, bei Sülz (Weidner).

58. *Cephalanthera rubra* L. sp. (Thede 1828) zu

Wendorf unv. Güstrow auf der Bullenhorst und auch noch a. a. O. daselbst, Holzendorf unv. Sternberg, Wamfow, Schwerin, Neustrelitz in der Bürgerhorst und im Holze beim Schweizerhause.

59. *Epipactis Helleborine* Crtz. (L. Sch. 1777).

β. *viridiflora* Hoffm.

60. *Epipactis palustris* Crtz. (L. Sch. 1777).

61. *Listera ovata* L. sp. (T. 1788).

62. *Neottia Nidus avis* L. sp. (L. Sch. 1777).

63. *Goodyera repens* L. sp. (T. 1788) in den Nadelholzwaldungen des östlichen und mittleren M. sehr häufig! scheint aber im westlichen M. zu fehlen.

64. *Spiranthes autumnalis* L. sp. (T. 1788) auf trockenen Hügeln bei der Sildemower Tief unv. Rostock; bei Neubrandenburg im Brüderbruche sehr selten! angeblich auch auf dem Werder im Wentower See 1 Gr. (Struck).

65. *Corallorrhiza innata* L. sp. (Blechtschmidt 1828) bei Neustrelitz in der Ralkhorst sehr selten!

66. *Liparis Loeselii* L. sp. (Thede 1806).

67. *Malaxis paludosa* L. sp. (T. 1788).

68. *Iris Pseud-Acorus* L. (L. Sch. 1777). S. 29. 36. 97. *Irideae*.

69. *Iris sibirica* L. (Brockmann 1828) in der Sassenitzer Wilddahn unv. Ludwigslust, und bei Grabow auf den Elbewiesen.

70. *Galanthus nivalis* L. (Vollbr. 1837) bei Neubrandenburg im Starg. Bruch an einer Stelle dicht am Seeufer sehr häufig! 98. *Amaryl-lideae*

Narcissus Pseudo-Narcissus L., *Leucojum vernalis* L., *aestivum* L. (S. 138) finden sich mitunter verwildert.

71. *Asparagus officinalis* L. (T. 1788) am Ostsee- 99. *Asparagaceae*.

strande bei Warnemünde und Dassow, aber auch im Binnenlande, z. B. auf dem Datzberge bei Neubrandenburg! wo diese Pflanze schon seit 60 Jahren beobachtet ist; bei Grabow, Boizenburg.

72. *Paris quadrifolia* L. (L. Sch. 1777): S. 138.

73. *Convallaria Polygonatum* L. (T. 1788) durch ganz M. verstreuet, aber viel seltener als die folgende; hier bei Neubrandenburg, wo ich sie früher im Remerower Holz fand, habe ich sie jetzt schon seit Jahren vergebens gesucht. Sie duftet noch schöner als *C. majalis*. — Vergl. Salomonsfägel S. 38.

74. *C. multiflora* L. (L. Sch. 1777).

75. *C. majalis* L. (L. Sch. 1777). Vergl. Pilzenconfalgen S. 36. 78. 125.

Anm. *C. verticillata* ist bei den früheren meklenb. Floristen zu streichen.

76. *Smilacina bifolia* L. sp. (L. Sch. 1777).

100. Lila-
ceae. *Tulipa silvestris* L. hin und wieder verwildert, z. B. in Obstgärten bei Dassow und im Park bei Rostock; sie soll aus Taurien stammen und erst seit der Mitte des 16. Jahrh. sich im übrigen Europa verbreitet haben.

77. *Anthericum Liliago* L. (T. 1788) in der Haideebene a. m. O., aber auch im östlichen M. bei Rempplin, Weltzin und Wulfenzin.

78. *Anthericum ramosum* L. (T. 1791) durch ganz M., aber nicht häufig z. B. bei Ludwigslust, Goldberg, Güstrow, Tessin, Malchin, am Reiterberge bei Feldberg, bei der Wolkowschen Gypsmühle (Zabel), in der Strelitzer Haide (Betzke), Friedland im Kamelower Holz.

* 79. *Ornithogalum nutans* L. (Schultz 1819) als lästiges Unkraut in Gärten und auf Stadtwällen einge-

bürgert; es soll erst im J. 1570 nach dem europäischen Continent gekommen sein.

Ornithogalum umbellatum L. (Deth. 1809) wird hin und wieder mit Dung aus den Gärten auf die Acker verschleppt.

80. *Gagea pratensis* Wahlb. sp. (L. Sch. 1777).

81. *Gagea arvensis* Wahlb. sp. (T. 1788).

82. *Gagea spathacea* Hayne sp. (Thede 1806) durch ganz M. Schwerin, in M. Strelitz wohl nur übersehen.

83. *Gagea minima* L. sp. (Röper 1844) in Buchenwäldern bei Doberan.

84. *Gagea lutea* L. sp. (D. 1809).

85. *Allium ursinum* L. (Vortisch 1849) im Gelbenfander Forst unweit Ribnitz. S. 38. 70.

86. *Allium acutangulum* Schrad. var. *fallax* Don. (Schmidt 1828) auf den Wiesen an der Elbe und deren Nebenflüssen in der Haideebene nicht selten; auch bei der Wolkowschen Gypsmühle (Zabel).

87. *Allium vineale* L. (T. 1788) nicht häufig, z. B. bei Grabow, Warnemünde, Neustrelitz, Neubrandenburg!

88. *Allium Scorodoprasum* L. (T. 1788): im Gebiete der Rostocker Flora an mehreren Orten, bei Malchin, Pentzlin, St. Memerow! u. s. w.

89. *Allium oleraceum* L. (Link 1806).

Allium carinatum L., von unseren Botanikern schon so oft erkannt, wird neuerdings von Schreiber (1853) aus dem Gebiete der Grabower Flora angeführt, wo es bei Ludwigslust dicht vor dem Grabower Thore an einer Gartenhecke gefunden wurde, ist aber dorthin (nach Brodmüllers gewiß richtigem Urtheil) aus dem nahen Garten der Villa Gustava gelangt, wo es in großer Menge cultivirt wird. — *A. carinatum* in Schultz Fl. Starg. ist *A. Scorodoprasum*! — Bei Pauenburg und unweit Hamburg kommt es vor.

Allium Schoenoprasum L. hin und wieder verwildert, besonders am Elbstrande.

* 90. *Muscari botryoides* L. sp. (D. 1828) auf Aekern bei Grabow und in der Umgegend häufig eingebürgert, durch Garten-Dung dorthin verschleppt.

91. *Narthecium ossifragum* L. sp. (Nolte c. 1823) im Geb. d. Fl. von Hamburg häufig auf Torfmooren, ist von Nolte (nach Ausweis eines von diesem herstammenden Exemplares, welches Betcke durch Detharding erhielt,) auch in Mecklenburg schon gefunden worden, der Fundort ist aber nicht näher bekannt, und es ist daher später von den einheimischen Botanikern vergebens gesucht worden.

Colchica- *Colchicum autumnale* L. (Rose 1853) wurde in einigen ver-
ceae. wilberten Gr. bei Grabow gefunden; zur einheimischen Wiesenflora, wie im südlichen Deutschland, gehört es ganz gewiß nicht!

101. Junca- 92. *Juncus maritimus* L. (Link 1808) am Seestrande,
ceae. z. B. bei Wustrow auf dem Fischlande (Zabel), zwischen Warnemünde und Diedrichshagen, bei Weitendorf auf Pöl, und bei der Pötenitzer Ziegelei untw. Dassow (C. Griew.).

93. *Juncus communis* E. Meyer.

α. *conglomeratus* L. (L. Sch. 1777).

β. *effusus* L. (T. 1788).

94. *Juncus glaucus* Ehr. (T. 1791).

95. *Juncus balticus* Willd. (D. 1809) am Seestrande: in den Dünenkesseln bei Warnemünde.

96. *Juncus filiformis* L. (D. 1828) auf salzhaltigen Wiesen am Seestrande und im Binnenlande.

97. *Juncus capitatus* Weig. (T. 1788) z. B. bei Dierhagen auf dem Fischlande (Z.), und in der großen Haideebene a. m. D.

98. *Juncus lamprocarpus* Ehr. (L. Sch. 1777).

α. *lamprocarpus* Ehr. (Schultz 1819).

β. *silvaticus* auct. non Reich. (T. 1788).

γ. *alpinus* Vill. (D. 1828) bei Ludwigslust, Weisbin am langen See.

99. *Juncus obtusiflorus* Ehr. (T. 1788) auch auf Strandwiesen bei Warnemünde und Daffow.

100. *Juncus supinus* Mönch. (T. 1795).

β. *uliginosus* Roth. (Schultz 1806).

101. *Juncus squarrosus* L. (T. 1788;) auch bei Warnemünde am Strande.

102. *Juncus compressus* Jacq. (T. 1788).

β. *Gerardi* Lois. (D. 1828) auf salzhaltigen Wiesen am Strande und um Salinen.

103. *Juncus Tenageia* Ehr. (T. 1788).

104. *Juncus bufonius* L. (L. Sch. 1777).

105. *Luzula pilosa* L. sp. (L. Sch. 1777).

106. *Luzula campestris* L. sp. (L. Sch. 1777).

β. *multiflora* Lej. (Schultz 1837).

γ. *pallescens* (Blandow 1828, *albida*) bei Waren.

δ. *congesta* Lej. im Torfmoor bei Ballin unweit

Stargard.

107. *Cyperus flavescens* L. (T. 1788) beim Baserower Theerosen und am Rahnenfelder See (Betsche), bei Mirow und Fleeth; im Geb. d. Flora von Grabow an mehreren Stellen. 102. Cyperaceae.

108. *Cyperus fuscus* L. (T. 1788).

β. *virescens* Hoffm.

109. *Schoenus nigricans* L. (T. 1788) auf den Kemptinschen Wiesen an der Peene, auf den Wiesen des Cüm-

merower Seeß von Alsbude bis Neufalen (Zabel)! bei Friedland, Brunn! und Galenbeck.

110. *Schoenus ferrugineus* L. (Schultz 1837) bei Neubrandenburg auf den Wiesen hinter der Ruhweide, bei Brunn! auf der großen Friedländer Wiese, auf den Galenbecker Wiesen; bei Gr. Niendorf am Saume der Hofwiese nach Wamkow zu, Peenewiesen bei Alsbude! Trebelwiesen bei Kl. Methling (Zabel); die anderen Standorte sind zweifelhaft.

111. *Cladium Mariscus* L. sp. (T. 1788) bei Friedland, Brunn, Galenbeck, Neustrelitz; Malchin, auf den Wiesen amummerower See, auf den Trebel- und Recknitzwiesen (Zabel), Leppin bei Zabel, Wamkow, im Bruch der Rostocker Heide hinter Markgrafenheide, bei Schwerin auf dem Werder beim Schelfvogtsteich.

112. *Rhynchospora alba* L. sp. (T. 1791).

113. *Rhynchospora fusca* L. sp. (Thede 1809) bei Warin, Pustohl und in der Haideebene a. m. D.

114. *Heleocharis palustris* L. sp. (L. Sch. 1777).

β. *uniglumis* Link 1810 auf Torfwiesen bei Warnemünde und Daffow.

115. *Heleocharis ovata* Roth. sp. (Crome 1828) früher am Lanfower See bei Schwerin, in neuerer Zeit nicht wieder gefunden, im Geb. der Flora von Hamburg aber a. m. Stellen; ihr Verbreitungsbezirk scheint also dort ein weiterer zu sein, weshalb wir ihr die Aufnahme in die Flora wohl nicht weigern dürfen.

116. *Heleocharis acicularis* L. sp. (T. 1788).

β. *fluitans* Döll. im Bahler Torfmoor unweit Boizenburg.

117. *Scirpus caespitosus* L. (L. Sch. 1777); auch am Strande bei Warnemünde.

118. *Scirpus pauciflorus* Light. (T. 1788); desgl.

119. *Scirpus parvulus* R. S. (Röper 1850) bei Wustrow auf dem Fischlande in den flachen Buchten des Saaler Boddens in Menge (Zabel).

120. *Scirpus fluitans* L. (Crome 1828) im Bruch bei Krebsförde unv. Schwerin.

121. *Scirpus setaceus* L. (T. 1788).

122. *Scirpus lacustris* L. (T. 1788).

β. *Tabernaemontani* Gm. (D. 1828) auf Salzwiesen bei Soltow in der Teldau, im Graben an der Salzquelle bei Ronow, auf Torfwiesen bei Daffow und Warnemünde.

123. *Scirpus maritimus* L. (T. 1788) auf Wiesen am Seestrande, aber auch bei Daffow, Dömitz und Boizenburg. S. 125.

124. *Scirpus silvaticus* L. (L. Sch. 1777).

125. *Scirpus compressus* Pers. (T. 1788).

126. *Scirpus rufus* Schrad. (D. 1809) auf Strandwiesen häufig.

127. *Eriophorum alpinum* L. (Blandow 1809) bei Pustohl, Brüel, Sülz, Waren! Zabel, Neustrelitz am See beim Schweizerhause und auf sumpfigen Wiesen in den Serranschen Bergen (Beuthe)!

128. *Eriophorum vaginatum* L. (L. Sch. 1777).

129. *Eriophorum polystachyum* L. (T. 1795 als *angustifolium*).

130. *Eriophorum latifolium* Hoppe (L. Sch. 1777).

131. *Eriophorum gracile* Koch (Schultz 1819 tri-

quetrum) bei Sagke unnt. Friedland in einem Bruche neben der Eichhorster Pfarrwiese, Weisbin, Quassow, Grabow auf den Thorwiesen, Torfwiesen bei Daffow, Sülz u. a. D.

132. *Carex dioica* L. (T. 1788). Vergl. S. 39.

133. *Carex Davalliana* Sm. (Neuendf. 1828) auf Wiesen hinter der Fähre bei Rostock.

134. *Carex pulicaris* L. (T. 1788) auf Wiesen bei Neubrandenburg, Malchin, Grabow und am Priwal.

135. *Carex chordorrhiza* L. (D. 1811) bei Rostock auf der sumpfigen Wiese an der Ob. Warnow bei dem Pulvermagazin; am Weisbinner See (unnt. Neustrelitz) rechts vom Abhange des Schloßberges.

136. *Carex disticha* Huds. (T. 1795) = *intermedia* Good. S. 125.

137. *Carex arenaria* L. (L. Sch. 1777) S. 125.

138. *Carex vulpina* L. (L. Sch. 1777).

β. *nemorosa* W. auf feuchten Wiesen bei Daffow.

139. *Carex muricata* L. (T. 1788).

β. *divulsa* Good. (Schultz 1819).

140. *Carex teretiuscula* Good. (D. 1828).

141. *Carex paniculata* L. (T. 1788).

142. *Carex paradoxa* Willd. (D. 1809).

143. *Carex brizoides* L. und zwar die Form

α. *campestris* (C. Schreberi Schrk. D. 1809) bei Neubrandenburg auf Tillys Schanze, bei der Wolkow'schen Gypsmühle (Zabel), bei Grabow a. m. D., und auf der Bleiche in einem Dorfgarten zu Bahlen unnt. Boizenburg.

144. *Carex remota* L. (T. 1788).

145. *Carex stellulata* Good. (Schultz 1806).

146. *Carex leporina* L. (T. 1788).

147. *Carex elongata* L. (T. 1788).
148. *Carex canescens* L. (Schultz 1806).
149. *Carex caespitosa* L.! (*C. pacifica* Drej. Zabel 1860!) auf den Rednitz-, Trebel- und Peenewiesen.
150. *Carex vulgaris* Fr. (L. Sch. 1777 als *caespitosa*).
151. *Carex stricta* Good. (Schultz 1819) S. 31.
152. *Carex acuta* Good. (L. Sch. 1777).
153. *Carex Buxbaumii* Wahlb. (Zabel 1860! in litt.)
auf den Peene-Wiesen bei Alsbude!
154. *Carex limosa* L. (T. 1788).
155. *Carex pilulifera* L. (Schultz 1806).
156. *Carex montana* L. (T. 1788).
β. *ericetorum* Poll. (Link 1795).
157. *Carex praecox* Jacq. (T. 1788).
158. *Carex digitata* L. (T. 1788) Malchin im Hainholz, Schwerin im Steinfeld der Holz und auf dem Werder, Neubrandenburg im Nemerower Holz in der Schlucht vor dem hohen Ufer!
159. *Carex panicea* L. (L. Sch. 1777).
160. *Carex glauca* Scop. (T. 1788).
161. *Carex strigosa* Huds. (*C. Griew.* 1845) im Holz bei Lübbsee unv. Daffow! im Gehölz am heil. Damme.
162. *Carex pallescens* L. (T. 1788).
163. *Carex flava* L. (T. 1788) häufig, auch auf Strandwiesen.
β. *Oederi* Ehr. (Schultz 1806).
164. *Carex distans* L. (T. 1788).
165. *Carex Hornschuchiana* Hoppe (*C. Griew.* 1847) auf der Torfwiese am Priwal! bei Penzlin am See und im Mewenort, auf den Rednitz-, Trebel- und Peenewiesen (Zabel).

Anm. *C. binervis* auf Pöhl ist zu streichen, worüber zu vergl. Archiv VIII. S. 184; fehlt wahrscheinlich auch in Holstein.

166. *Carex extensa* Good. (Röp. 1841) bei Warnemünde und an der Wismarschen Bucht auf Salzwiesen; auf der Wiese am Priwal (C. Griew.)!

167. *Carex silvatica* Huds. (T. 1788).

168. *Carex Pseudo-Cyperus* L. (T. 1788).

169. *Carex ampullacea* Good. (Schultz 1806).

170. *Carex vesicaria* L. (T. 1788).

171. *Carex paludosa* Good. (Schultz 1806).

172. *Carex riparia* Curt. (Link 1795).

173. *Carex filiformis* L. (L. Sch. 1806).

174. *Carex hirta* L. (T. 1788).

103. Grami- * 175. *Panicum sanguinale* L. (Brück. 1803 nicht
neae. Timm!) früher cult., jetzt völlig eingebürgert.

* 176. *Panicum filiforme* Koel. sp. (Deth. 1809) eingebürgert.

* 177. *Panicum Crus galli* L. (L. Sch. 1777) desgl.

* 178. *Setaria verticillata* L. sp. (Beuthe 1841) bei Neufirelitx und Rostock in Gemüsegärten und auf Aedern eingebürgert.

* 179. *Setaria viridis* L. sp. (Brück. 1803) in Gärten und zwischen Getreide eingebürgert.

* 180. *Setaria glauca* L. sp. (T. 1788) desgleichen, fehlt bei Ludwigslust.

181. *Phalaris arundinacea* L. (L. Sch. 1777).

Ph. canariensis L. hin und wieder verwildert, aber sich nicht fortpflanzend, weil der Same nicht reif wird (C. Griew.).

182. *Hierochloa odorata* L. sp. (T. 1795) auf Wiesen bei Markgrafenheide und Daffow, wahrscheinlich auch

an der Elbe, da es häufig auf dem Elbwerder bei Lenzen und im Gebiete der Flora von Hamburg bis Blankenese hinab gefunden wird.

183. *Anthoxanthum odoratum* L. (L. Sch. 1777).

184. *Alopecurus pratensis* L. (L. Sch. 1777).

β. *nigricans* Sonder nicht Hornem.; (Prahl 1837)

b. Güstrow, später von Dreves dort vergebens gesucht. S. 191.

* 185. *Alopecurus agrestis* L. (T. 1791) eingebürgert
z. B. bei Kritzow, Grabow u. a. D.

186. *Alopecurus geniculatus* L. (L. Sch. 1777).

β. *fulvus* Sm. (D. 1828) auch am Strande bei Warnemünde.

γ. *bulbosus* (Prahl 1837) bei Güstrow.

187. *Phleum arenarium* L. (T. 1795) im Fluglande der Dünen am See-Strande.

188. *Phleum Boehmeri* L. sp. (T. 1788).

189. *Phleum pratense* L. (L. Sch. 1777).

β. *nodosum* L. (T. 1788).

* 190. *Leersia oryzoides* L. sp. (Prahl 1837) ursprünglich ein Unkraut der Reisfelder, jetzt zufällig in M. a. m. D. eingebürgert (Rostock, Güstrow [von Dreves später dort vergebens gesucht], Ludwigslust, Kaltenhof an der Elbe); in M. Strelitz noch nicht gefunden, namentlich nicht bei Neustrelitz.

191. *Agrostis alba* L. (T. 1795).

β. *gigantea* Roth.

192. *Agrostis vulgaris* With. (L. Sch. 1777 rubra).

193. *Agrostis canina* L. (T. 1791).

* 194. *Apera Spica venti* L. sp. (L. Sch. 1777)
wahrscheinlich mit dem Getreide eingebürgert.

Polypogon monspeliensis Desf. wurde im Sommer 1855 bei Warnemünde an einer Stelle gefunden, wo im vorausgehenden Winter französischer Ballast ausgeladen war (Griewank crit. Studien S. 8).

195. *Calamagrostis lanceolata* Roth. L. sp. (T. 1788).

C. litorea Schr. sp. (Röper 1844) früher (im J. 1818) bei Warnemünde, ist in neuerer Zeit nicht wieder gesehen; sie ward auch im Geb. der Lübecker Flora bei Falkenhausen a. d. Wadnitz, so wie in Preußen an 2 Stellen im Weichselgeb. gefunden, und soll auch in Litthauen bei Polangen und an den Dünen wachsen.

196. *C. Epigeios* L. sp. (T. 1788) im Binnenlande und auch am Strande bei Warnemünde und Daffow.

197. *C. Halleriana* DC. (Neuendorf 1828).

198. *C. neglecta* Ehr. sp. (T. 1795).

199. *C. varia* Schr. sp. (Beuthe 1837 ap. Schultz sup. 2) unweit Neustrelitz bei Torwitz nach Prelank zu.

200. *C. sylvatica* Schr. sp. (T. 1788).

201. *Ammophila arenaria* L. sp. (T. 1788) auf Dünen und Flugsandfeldern des Binnenlandes.

(196 + 201.) *A. baltica* Flügge sp. (T. 1793) auf Dünen bei Warnemünde und Daffow in Gesellschaft der Stammeltern.

202. *Milium effusum* L. (L. Sch. 1777).

Anm. *Stipa pennata* L. (Lgm. 1850) soll am Ostseeufer bei Doberan in Menge wachsen, was mir aber nicht glaublich erscheint, da vor dem J. 1850 schon so viele aufmerksame Botaniker jene Gegend besucht haben, ohne dieses Gras dort zu finden. Bei Neubrandenburg, wo Dr. Sach es gefunden haben will, kommt es nicht vor; auch auf Pöel will man es gefunden haben.

203. *Phragmites communis* L. (L. Sch. 1777) durch ganz M., selbst auf Salzwiesen am Ostseestrande. S. 38.

204. *Koeleria cristata* L. sp. (T. 1788).

β. *glauca* DC. (Lgm. 1841).

205. *Aira caespitosa* L. (T. 1788).

β. *Wibeliana* Sond. soll bei Dömitz und Boizenburg gefunden sein, was indeß nach Röpers Meinung noch zweifelhaft bleibt.

206. *Aira flexuosa* L. (L. Sch. 1777 *montana*).

Anm. Die dem NW. Deutschlands angehörige Var. *uliginosa* Weihe möchte vielleicht in der Haideebene aufzufinden sein.

207. *Corynephorus canescens* L. sp. (T. 1788).

208. *Holcus lanatus* L. (L. Sch. 1777).

209. *Holcus mollis* L. (T. 1788).

210. *Arrhenatherum elatius* L. sp. (T. 1788).

Avena brevis Roth. (Schultz 1837) hin und wieder unter der Saat eingeschleppt.

* 211. *Avena strigosa* Schreb. (T. 1788) unter *A. sativa* eingebürgert.

* 212. *Avena fatua* L. (T. 1788) zwischen Getreide eingebürgert, besonders unter Roggen.

213. *Avena pubescens* L. (T. 1795).

214. *Avena pratensis* L. (L. Sch. 1777).

215. *Avena tenuis* Moench. (Trevir. 1828) auf dürren, sonnigen Hügeln bei Doberan und Schwerin (an letzterem Orte in neuerer Zeit aber nicht wieder gefunden).

Avena flavescens L. (Prahl 1837) cult. und verwildert z. B. bei Glüstrom, Schwerin, Doberan.

216. *Avena caryophylla* L. sp. (T. 1788).

217. *Avena praecox* L. sp. (T. 1788).

218. *Triodia decumbens* L. sp. (T. 1795).

219. *Melica uniflora* Retz. (T. 1788).

220. *Melica nutans* L. (T. 1788).

221. *Briza media* L. (L. Sch. 1777). S. 31.

Poa procumbens Curt. (Rüper 1850) bei Warnemünde mit Ballasterbe aus südlichen Gegenden eingeschleppt.

222. *Poa annua* L. (T. 1788).

223. *Poa bulbosa* L. (Schultz 1819) bei der Krappmühle unweit Neubrandenburg, rechts am Wege, wo es besonders in der *forma vivipara* vorkommt. Bei Warnemünde? (T. 1795).

224. *Poa nemoralis* L. (T. 1788).

β. *fertilis* Host. (T. 1795 *palustris*).

225. *Poa sudetica* Haenke (Flörke 1803) am Galenbecker See untw. Friedland, in Buchenwäldern bei Doberan.

226. *Poa trivialis* L. (T. 1788).

227. *Poa pratensis* L. (T. 1788).

β. *angustifolia* (T. 1788).

228. *Poa compressa* L. (T. 1788).

229. *Glyceria spectabilis* M. K. L. sp. (T. 1788.)

230. *Glyceria fluitans* L. sp. (L. Sch. 1777). Vergl. Schwadengröße S. 39. 111.

231. *Glyceria distans* L. sp. (T. 1795) auf salzhaltigen Wiesen am Seestrande und im Binnenlande.

232. *Glyceria maritima* Huds. sp. (Link 1808) auf Strandwiesen z. B. bei Wustrow auf dem Fischlande (Zabel), Warnemünde, Daffow.

233. *Glyceria aquatica* L. sp. (L. Sch. 1777) auch auf salzhaltigen Wiesen bei Daffow.

234. *Molinia coerulea* L. sp. (L. Sch. 1777). Vergl. S. 36, wo statt *Melica* „*Molinia*“ zu lesen.

235. *Dactylis glomerata* L. (L. Sch. 1777).

236. *Cynosurus cristatus* L. (L. Sch. 1777).

237. *Festuca myuros* Ehr. var. *sciuroides* Roth.
(Trevir. 1828) auf Hügeln bei Doberan.

238. *Festuca ovina* L. (L. Sch. 1777).

β. *duriuscula* L. sp. pl. (T. 1795).

? γ. *heterophylla* Lam. (D. 1828) nach Röper
für M. noch zweifelhaft.

239. *Festuca rubra* L. (T. 1788).

β. *heterophylla* Röper im meßenb. Quarto Ka-
sender 1841 Nr. 69; vergl. Röper 3. Flora Meßenburgs
II. S. 238 oben.

240. *Festuca silvatica* Vill. (Prah 1837) in feuchten
Raubwäldern bei Güstrow, Rostock, Crivitz und auf der
hohen Burg bei Schlemmin; im Rempliner Walde in
Menge (Zabel), bei Sülz (Weidner).

241. *Festuca gigantea* L. sp. (T. 1788).

242. *F. borealis* M. K. (Zabel 1858) in der Heene
bei Upst unweit Dargun.

243. *Festuca arundinacea* Schreb. (T. 1791).

244. *Festuca elatior* L. (L. Sch. 1777).

(244 + 263). *F. loliacea* Huds. (Röp. 1844) ein Bastard
von *F. elatior* und *Lolium perenne* L. (Röp.) bei Rostock
(zwischen den Stammeltern) und bei Neustrelitz auf der
Wiese am Zierker See gefunden.

245. *Brachypodium sylvaticum* Mönch. sp. (Brück.
1803).

246. *Brachypodium pinnatum* L. sp. (T. 1788).

* 247. *Bromus secalinus* L. (L. Sch. 1777) unter dem
Getreide eingebürgert.

* 248. *Bromus mollis* (L.) Babington. (T. 1788) wahr-
scheinlich nur eingebürgert.

β. racemosus L. (D. 1828).

γ. commutatus Schrad. (Schultz 1819).

* 249. *Bromus arvensis* L. (L. Sch. 1777) eingebürgert.

β. patulus Wimm. M. K. für M. noch sehr zweifelhaft (Röper).

250. *Bromus asper* Murr. (T. 1795) z. B. bei Malchin im Pinnower und Rempliner Walde (Zab.).

251. *Bromus erectus* Huds. (D. 1828) bei Mechow unweit Ratzburg.

252. *Bromus inermis* Leys. (Schmidt 1828) bei Kessin unv. Rostock, auf der Insel Buchwerder im Daffower See, am Elbufer bei Dömitz und Boizenburg.

253. *Bromus sterilis* L. (T. 1788).

254. *Bromus tectorum* L. (L. Sch. 1777) häufig, im Haidegebiet aber nur am hohen Elbufer bei Wend. Wehningen (G. Brück.).

* 255. *Gaudinia fragilis* L. sp. (Griew. 1847) auf einer Wiese bei Daffow mit fremdem Grassamen eingeschleppt und dort seit 1835 beobachtet; desgl. im Geb. d. Flora von Hamburg.

256. *Triticum junceum* L. (T. 1791) auf der See- seite der Dünen; selten auf Bül, häufig bei Warnemünde und Daffow; auf dem Fischlande (Zabel).

257. *Triticum repens* L. (L. Sch. 1777) S. 38. 125.

β. glaucum Desf. (Röp. 1844).

(256 + 57.) *T. acutum* DC. (D. 1828) in Gemeinschaft der Stammeltern am sandigen Meeresstrande.

(256. 57 + 59.) *T. strictum* Deth. 1828, wahrscheinlich ein Abkömmling des voraufgehenden Bastards und des *Elymus arenarius* (Röper); auf niedrigen, im Winter und

bei starken Stürmen von der See bespülten Stellen der Dünen bei Warnemünde, zwischen den Stammelstern.

Ann. Wenn Garcke (ed. 4.) meint, *T. strictum* sei vielleicht nur eine Abart von *T. repens*, so hat er wahrscheinlich nie authentische Ex. davon gesehen! Es gleicht (wie schon Röper z. Fl. N. II, 269 bemerkt,) vielmehr einem schlanken *Elymus arenarius*.

258. *Triticum caninum* L. (Link 1795).

259. *Elymus arenarius* L. (T. 1788) auf den Dünen und auf Flugsandfeldern im Binnenlande z. B. bei Rudwigslust, Neustrelitz und in der Rostocker Haide.

260. *Elymus europaeus* L. (Prahl 1837) in feuchten, sumpfigen Laubhölzern (besonders auf Kalkboden): am h. Damn, bei Güstrow im Töpferkuhlenbruch (von Drewes dort aber vergebens gesucht), bei Teterow.

* 261. *Hordeum murinum* L. (L. Sch. 1777) eingebürgert. S. 32.

262. *Hordeum secalinum* Schreb. (T. 1795) auf Wiesen b. Warnemünde und an d. Wismarischen Bucht häufig.

Hordeum maritimum L. (Rathsack bei Röper 1846) an der neuen Ballaststelle bei Warnemünde, wohl von der Nordseeküste durch Ballasterde dorthin verschleppt.

* 263. *Lolium perenne* L. (L. Sch. 1777) eingebürgert?

Lolium italicum A. Br. (Röp. 1844) kult. und hin und wieder verwildert z. B. bei Rostock, Grabow und Daffow.

* 264. *Lolium temulentum* L. (L. Sch. 1777) zw. dem Sommergetreide eingebürgert. S. 138.

* 265. *Lolium arvense* Schrad. (A. Br. 1803) zw. Weizen eingebürgert. S. 36.

266. *Lepturus incurvatus* L. sp. (Häcker 1844! 47) auf dem Priwal in großer Menge, zw. der Pötenitzer Wief und der Ostsee, auch bei Iliemstorf an der Wism. Bucht.

Ann. Vergl. über diese Art C. Griewank im Archiv V. 159 und VIII. 178. In einer neueren brieflichen Mittheilung meint Gr., daß an den Küsten der Nord- und Ostsee nur diese Art vorkomme, nicht aber der echte *L. filiformis* Trin. Ich glaube daß Gr., wenigstens was die deutsche Ostseeküste betrifft, Recht hat, denn Gr. des angeblichen *L. filiformis* von Mönchgut, die ich kürzlich durch Herrn Zabel erhielt, sind dem mir von Griewank mitgetheilten *L. incurvatus* völlig gleich! Beide unterscheiden sich aber auf den ersten Blick in ihrem ganzen Habitus von dem echten *L. filiformis* Trin., den ich aus dem Gebiete der Flora von Rom besitze: bei diesem ist der Stalm in der That dünn wie ein Faden, und die Aehre bleibt auch im trockenen Zustande ganz gerade gestreckt; die ganze Pflanze ist viel zarter und schlanker, und bildet keine solche nach allen Seiten hin ausgebreitete rasenförmige Büschel, wie *L. incurvatus*.

267. *Nardus stricta* L. (T. 1788).

III. Filicoideae.

(Vergl. Röper 1843.)

104. Polypodiaceae.

1. *Pteris aquilina* L. (L. Sch. 1777) Röper S. 64.
2. *Blechnum Spicant* L. sp. (v. Kamptz 1806) Röper 67; bei Voißow unweit Mirrow in der Haide; in der großen Haideebene an m. D. (Grabow, Neu-Karstädt, Vofup).
3. *Asplenium septentrionale* L. sp. (Schultz 1819) Röper 69, mit dem folgenden, und auch bei Neubrandenburg bei der hintersten Mühle sehr selten (wo ich diese Art bis jetzt noch nicht habe auffinden können).
4. *Asplenium Breynii* Retz. (Schultz 1819) Röper 73; bei Beseitz an der Steinmauer im Holz am Wege nach Friedlsand.
5. *Asplenium Ruta muraria* L. (L. Sch. 1777) Röper 74; an alten Stadt- und Kirchhofsmauern nicht eben selten!

6. *Asplenium Filix femina* L. sp. (L. Sch. 1777) Röp. 73.

7. *Asplenium Trichomanes* L. (T. 1788) Röp. 74, durch ganz M., aber immer nur auf kleine Räume beschränkt: bei Neubrandenburg nur bei der hintersten Mühle! bei Hirschshagen an den Ruinen der rothen Kirche, an der Kirchhofsmauer in Zachow unv. Stargard! zwischen Ulrichshufen und Sagel in einem Hohlwege! desgl. im Hainholz bei Malchin; an der Kirchhofsmauer zu Dampzin und zu Gresse (im Klüger Ort); auch im Geb. der Fl. von Grabow a. m. D.

8. *Cystopteris fragilis* L. sp. (L. Sch. 1777) Röp. 78, an aus Geröllen aufgeführten Kirchhofsmauern der Dörfer nicht selten.

9. *Polystichum cristatum* L. sp. *Callipteris* Ehr. (T. 1788).

10. *Polystichum spinulosum* Sw. sp. (T. 1788) Röp. 82.

β. *dilatatum* Hoff. sp. (Schultz 1819).

11. *Polystichum Filix mas* L. sp. (L. Sch. 1777). Vergl. S. 125.

12. *Polystichum Oreopteris* Sw. sp. (Brück. 1803) Röp. 81, in den Tannen am Wege von Neubrandenburg nach Kowa; im Hufen bei Pentzlin.

13. *Polystichum Thelypteris* L. sp. (T. 1788) Röp. 80.

14. *Aspidium aculeatum* Sw. (Röp. 1843 p. 97) in einem kleinen Tannengehölz bei Rostock; bei Sülz in 2 Ex. von Dr. Weidner gefunden; Glüströw in den Riewer Tannen?

15. *Polypodium Dryopteris* L. (T. 1788) Röp. 63.

Anm. Nach dem ähnlichen, kalkliebenden *P. Robertianum* Hoff. (*calcareum* Sm.) habe ich sowohl im mecklenburgischen als auch im

rügianischen Kreidegebiete vergebens gesucht; es kommt dort nur immer *Dryopteris* vor.

16. *Polypodium Phegopteris* L. (Thede 1806) Röp. 62: Neubrandenburg im Brodaschen Holz; Neustrelitz beim Schweizerhause; Malchin im Kalenschen Holz u. s. w., im Geb. der Fl. von Güstrow und Grabow aber noch nicht gefunden.

17. *Polypodium vulgare* L. (L. Sch. 1777). S. 125.

105. Osmundaceae.

18. *Osmunda regalis* L. (T. 1788) Röp. 103; bei Ribnitz zw. Rörkitz und Neuhufen (Zabel), bei Malchin im Kalenschen Holz am Moor hinter der Ziegelei; am Torfgraben hinter Markgrafenheide nicht selten; bei Woldeck in der Nähe der Wolfshagenschen Ziegelei, bei Neustrelitz in der Kalkhorst (ausgerottet?); — im Geb. der Flora von Grabow a. m. D.

106. Ophioglosseae.

19. *Ophioglossum vulgatum* L. (T. 1788) Röp. 123; Neubrandenburg auf den Wiesen hinter der Ruhweide! Malchin auf den Kemplischen Wiesen nahe an der Peene; Sülz auf den Recknitzwiesen; bei Warnemünde; Grabow b. d. Lehmföhlen; Ludwigslust nur auf G. Brückners Wiese gefunden.

20. *Botrychium Lunaria* Sw. (L. Sch. 1777), weit durch M. verbreitet, auch in den Dünenkesseln bei Warnemünde.

21. *B. simplex* Hitchk. (Roep. 1859) auf sandigem, mit spärlicher Grasdecke bewachsenem Boden am nördlichen Rande der Barnsdorfer Tannen, $\frac{1}{4}$ M. von Rostock, zusammen mit *B. Lunaria* und *matricariaefolium* in einem einzigen Ex. ein einziges Mal gefunden am 22. Juni 1847.

22. *B. matricariaefolium* A. Braun (Roep. 1850) in den Barnsdorfer Tannen mit den beiden vorigen; in den

Dünenfesseln bei Warnemünde sparsam, häufiger aber in den Dünen bei Dierhagen auf dem Fischlande, — an letzteren beiden Orten mit *B. Lunaria* und *rutaefolium*.

23. *B. rutaefolium* Al. Br. (T. 1788) bei Malchin an zwei Stellen im J. 1847 gefunden, bei Dargun (Zabel); in den Dünenfesseln bei Warnemünde, Dierhagen und Neuhufen auf dem Fischlande (Zabel).

Anm. Nur Röpers gewichtige Autorität (s. dessen Abhandlung in der bot. Zeitung 1859 No. 2) veranlaßt mich diese vier zusammen und durcheinander vorkommenden Botrychien als ebenso viele Species aufzuführen.

24. *Lycopodium complanatum* L. (T. 1788) Röp. 130. ^{107. Lycopodiaceae.}

β. *Chamaecyparissus* A. Br. (G. Brück. 1849) früher bei Quast unweit Ludwigslust, jetzt soll es dort wieder ausgerottet sein.

25. *Lycopodium clavatum* L. (L. Sch. 1777). S. 125.

26. *Lycopodium inundatum* L. (Brück. 1803) Röp. 129; auf dem Wulfenzinschen Felde in einem Bruch nach dem Brodaer Holz zu; bei Sülz in der Haideebene an vielen Orten.

27. *Lycopodium annotinum* L. (T. 1788) Röp. 137; nicht selten in M., in der Haideebene aber nur erst bei Hagenow gefunden.

28. *Lycopodium Selago* L. (T. 1788) Röp. 128.

29. *Pilularia globulifera* L. (T. 1791) Röp. S. 155; ^{108. Marsileaceae.} am See bei dem Basedower Theerosen; auf dem Görries'er Moor bei Schwerin.

30. *Equisetum hiemale* L. (L. Sch. 1777) Röp. ^{109. Equisetaceae.} S. 150; durch ganz M., wenn auch an den einzelnen Orten nicht häufig, — bei Neubrandenburg z. B. am

Ufer des Teiches bei der hintersten Mühle! und im Remerower Holz am Seeufer! Malchin, Rothenmoor! u. s. w. (S. 39 und 126).

31. *Equisetum limosum* L. (T. 1788) Röp. S. 149.

32. *Equisetum palustre* L. (T. 1788) Röp. S. 149.

33. *Equisetum pratense* Ehrh. (Schultz 1819 als *umbrosum*) Röp. S. 147. in den Wäldern um Neubrandenburg nicht selten! Neustrelitz in der Bürgerhorst; in der Wolkowschen Haide (Zabel), bei Güstrow in den Hasenhöfen, — gewiß auch noch weiter verbreitet, aber nicht beachtet.

34. *Equisetum silvaticum* L. (L. Sch. 1777) Röp. 146.

35. *Equisetum Telmateja* Ehr. (Röp. 1843 S. 146) bei Klocksin und Grubenhagen am Malchiner See und zwar die var. *serotina*; am Ufer der Trave und des Daffower Sees; in der Rönitz bei Raseburg. — In M. Strelitz (namentlich bei Neubrandenburg), wo es nach Schultz 2. Nachtrag wachsen soll, noch nicht gefunden.

36. *Equisetum arvense* L. (L. Sch. 1777). Vergl. S. 32 und 126.

β. *serotinum* Mey. = *E. campestre* Schultz sup. 1, vergl. Milde in der Denkschrift d. Schlesischen Gesell. u. s. w. 1853 S. 186.

IV. Musci frondosi.

(Nach Fiedler 1844, mit einigen Emendationen.)

110. Sphag-
neae.

1. *Sphagnum cymbifolium* Dill. (L. Sch. 1777).

β. *compactum* Brid.

2. *Sphagnum squarrosum* Pers. (Bland. 1804).

3. *Sph. subsecundum* N. E. (Schultz 1819).
 β . *contortum* Schultz bei Satzke unv. Friedland!
4. *Sph. acutifolium* Ehr. (T. 1788).
5. *Sph. cuspidatum* Ehr. (Crome 1803).
 β . *plumosum* Brid. (Schultz 1828) = *Sph. laxifolium* C. Müll.
6. *Splachnum ampullaceum* L. (T. 1788). 111. Splachnaceae.
7. *Physcomitrium pyriforme* Brid. (T. 1788). 112. Funariaceae.
8. *Ph. sphaericum* Schwäg. sp. (Schultz 1819) bei Neubrandenburg am fl. Zhlenpohl.
9. *Ph. fasciculare* Hedw. sp. (Bl. 1804).
10. *Funaria hibernica* Hook. (Crome 1805) selten,
3. B. an den Zippendorfer Anhöhen bei Schwerin.
11. *F. hygrometrica* Hedw. (L. Sch. 1777).
12. *Phascum serratum* Schreb. (T. 1788). 113. Phasceae.
13. *Ph. muticum* Schr. (T. 1788).
14. *Ph. Floerkeanum* W. M. (Flörke nach 1816) bei Rostock.
15. *Ph. patens* Hedw. (Sch. 1806) auf feuchtem Lehm- und Thonboden ziemlich selten.
16. *Ph. cuspidatum* Schr. (T. 1788).
17. *Ph. bryoides* Dick. (Sch. 1806) auf sandigem, nassem Boden ziemlich selten.
18. *Ph. curvicolium* Hedw. (Fied. 1844) in hochgelegenen Wäldern an Grabenrändern selten.
19. *Ph. nitidum* Hedw. (T. 1788).
20. *Ph. crispum* Hedw. (Sch. 1806) ziemlich selten.
21. *Ph. subulatum* L. (T. 1788).
22. *Pottia cavifolia* Ehr. (T. 1788). 114. Pottiaceae.
23. *P. minutula* Fürn. (Sch. 1806).

24. *Pottia truncata* Hedw. sp. (T. 1788).

β. *intermedia* Schwägr. sp.

25. *Anacalypta lanceolata* Hedw. sp. (T. 1788).

β. *aciphylla* Wahlb. (Bl. 1809).

115. Trichostomeae.

26. *Barbula unguiculata* Hedw. (T. 1788). — Hierher gehören als Var.: *B. cuspidata*, *apiculata*, *microcarpa*, *obtusifolia* Schultz.

27. *B. fallax* Hedw. (Bl. 1804).

28. *B. brevicaulis* Schwäg. (Sch. 1823) „in prae-ruptis sylvestribus Duc. Megap. Starg.“, fehlt bei Fiedler.

29. *B. gracilis* Schwäg. (F. 1844) selten auf thonig-sandigen Felsen.

30. *B. Hornschuchiana* Schultz (1819 als *revoluta*) Neubrandenburg bei der Brandmühle.

31. *B. convoluta* Hedw. (T. 1788).

32. *B. muralis* L. sp. (L. Sch. 1777).

33. *B. subulata* L. sp. (T. 1788).

34. *B. laevipila* Br. Sch. (Wüst. 1844) bei Schwerin am alten Wege nach Ludwigslust an Weiden.

35. *B. latifolia* Br. Sch. (F. 1844) bei Schwerin an alten Bäumen in der Pappelallee am faulen See.

36. *B. ruralis* L. sp. (L. Sch. 1777).

37. *Trichostomum rigidulum* Hedw. sp. (Bl. 1809) selten.

38. *Tr. tortile* Schr. (T. 1788) nicht häufig.

39. *Tr. homomallum* Hedw. sp. (Sch. 1806) in Wäldern an Hohlwegen nicht häufig.

40. *Tr. pallidum* Hedw. (Bl. 1803) im Brodaer Holz bei Neubrandenburg; Malschin am Fuchsberge.

41. *Distichium capillaceum* Hedw. sp. (Sch. 1806) Fiedler No. 46.

42. *Gymnostomum rutilans* Hedw. (Sch. 1828) selten an schattigen, sandigen, nackten Anhöhen und Grabenrändern (in M. Strelitz, — nach Schultz). 116. Weisia-
ceae.

43. *Hymenostomum microstomum* Hedw. sp. (Bl. 1803).
 β. *obliquum* N. H. (Sch. 1828).

44. *Weisia controversa* Hedw. (T. 1788).

45. *W. cirrhata* L. sp. (T. 1788).

46. *W. recurvirostra* Hedw. (T. 1788).

47. *Trematodon ambiguus* Horn. (G. Brück. 1818), nur bei Ludwigslust gefunden, wo es aber in neuerer Zeit vergebens gesucht ist.

48. *Ceratodon cylindricus* Hedw. sp. (Sch. 1819) auf sandigen Anhöhen bei Neubrandenburg.

49. *C. purpureus* L. sp. (T. 1788).

50. *Dicranum cerviculatum* Hedw. (Bl. 1804).

β. *pusillum* Hedw. (Sch. 1806).

51. *D. pellucidum* L. sp. (T. 1788).

52. *D. strumiferum* Hedw. sp. (Sch. 1806) selten auf schwammigen, bewaldeten Wiesen an alten Wurzelstöcken.

53. *D. flexuosum* L. sp. (T. 1788).

54. *D. Schreberi* Sw. (Sch. 1806).

55. *D. varium* Hedw. (T. 1788).

β. *rigidulum* Sw. (Sch. 1819).

56. *D. rufescens* Sm. (Sch. 1806) nicht häufig.

57. *D. crispum* Hedw. (F. 1844) auf feuchtem Sandboden am Rande der Wege und Gräben nicht häufig.

58. *D. heteromallum* L. sp. (T. 1788).

59. *D. subulatum* Hedw. (Sch. 1819) seltener.

60. *D. longifolium* Ehr. (Bl. 1804) im Mühlenholz bei Neubrandenburg am Fußsteige nach der h. Mühle an Steinen.

61. *Dicranum flagellare* Timm! (1791) in Wäldern auf verfaultem, an der Erde liegendem Holz: bei Malchin, Ballin (unw. Stargard), Milbenitz.

62. *D. scoparium* L. sp. (L. Sch. 1777).

β. *orthophyllum* Brid. (Sch. 1819).

63. *D. majus* Sm. (Sch. 1806 als *recurvatum*, welches hierher, und nicht zur vorhergehenden Art gehört, vergl. Archiv VIII. 95); bei Neubrandenburg, Malchin, Sternberg.

64. *D. undulatum* Ehr. (T. 1788).

65. *D. Schraderi* W. M. (Bl. 1804) ziemlich selten.

66. *D. spurium* Hedw. (T. 1788) am Wege von Malchin nach Schwinkendorf auf den Hügeln in den Tannen; in den Hufentannen bei Stargard.

67. *D. glaucum* L. sp. (T. 1788).

68. *Thysanomitrium pyriforme* Schultz sp. (1819) Fiedler Nr. 45; bei Ballin unw. Stargard im Holz hinter dem Hofgarten.

117. Brya-
ceae.

69. *Mnium stygium* Sw. sp. (Bl. 1808) bei Neubrandenburg im Brüderbruch, unweit Stratzburg am Wege nach Neustrelitz, Waren, Rövershagen, Schwerin.

70. *M. punctatum* Schreb. sp. (T. 1788).

71. *M. undulatum* Hedw. (T. 1788).

72. *M. hornum* L. sp. (T. 1788).

73. *M. serratum* Brid. (Bl. 1804) Neubrandenburg am Starg. Berge.

β. *orthorrhynchum* Blandow sec. Schultz 1828.

74. *M. rostratum* Schwäg. (Bl. 1804) Neubrandenburg am hohen Ufer auf Steinen, Voitz unw. Stargard.

75. *M. cuspidatum* Schreb. sp. (T. 1788).

76. *M. affine* Blandow (1804).

77. *Mnium stellare* Dill. sp. (T. 1788) Malchin im Kalenschen Holz im ersten Hohlwege; Neubrandenburg im Mühlenholz, bei Voitz in dem Holz an der Balliner Gränze an dem Ufer eines Wasserlaufes.

78. *Bryum cernuum* Br. Sch. (Fiedl. 1860!) auf dem Ralkwerder bei Schwerin auf ausgeschütteten Ralkfelsen.

79. *B. lacustre* Blandow (1804) bei Waren; auch am Wentower See an der Südgränze von M. Strelitz durch Struck entdeckt.

80. *B. inclinatum* Sw. sp. (Bl. 1804) selten in Wäldern an feuchter Erde.

81. *B. strictum* Schultz (1828) an feuchten, grasigen und übersandeten Orten bei Neubrandenburg.

82. *B. Warneum* Blandow (1806) bei Waren.

83. *B. latifolium* Br. Sch. (Bland. 1809?) sehr selten, fehlt bei Fiedler!

Anm. Diese Art wurde von Bl. in Mecklenburg gefunden und ohne nähere Angabe des Standortes an Bridel mitgetheilt, der sie als *Weisia fornicata* bestimmte; vergl. C. Müller Synopsis Muscorum II. p. 571. (Mittheilung von Hrn. Struck).

84. *B. nutans* Schreb. (T. 1788).

85. *B. elongatum* Hedw. sp. (Bl. 1809) seltener.

86. *B. crudum* L. sp. (T. 1788).

87. *B. annotinum* L. sp. (T. 1791).

88. *B. carneum* L. (T. 1788) nicht häufig.

89. *B. pyriforme* L. sp. (L. Sch. 1777).

90. *B. intermedium* Brid. (Sch. 1806) nicht häufig.

91. *B. bimum* Schreb. (Schultz 1806).

92. *B. pseudo-triquetrum* Hedw. sp. (T. 1788).

93. *B. Duvalii* Voith. (Sch. 1828).

94. *Bryum roseum* Schreb. (T. 1788).

95. *B. turbinatum* Hedw. (Crome 1803) Schwerin am Ostorfer See beim Galgenberge.

96. *B. capillare* L. sp. (T. 1788).

97. *B. pallens* Sw. (Bl. 1817) bisher nur bei Neubrandenburg, Waren und Schwerin (auf dem Ralkwerder, von Fiedler!) gefunden.

98. *B. caespititium* L. (T. 1788).

99. *B. erythrocarpon* Schwäg. (Sch. 1806) bei Mildenitz an der Wolfshagener Gränze bei dem alten Thurme (nicht bei Stargard!).

100. *B. atropurpureum* W. M. (Bl. 1808) nicht häufig.

101. *B. argenteum* L. (T. 1788).

102. *Timmia megapolitana* Hedw. (T. 1788) nur bei Malchin am Salärberge gefunden.

103. *Aulacomnion palustre* Schreb. sp. (T. 1788).

104. *A. androgynum* L. sp. (T. 1788).

118. Meesia-
ceae.

105. *Paludella squarrosa* L. sp. (T. 1788).

106. *Meesia uliginosa* Hedw. sp. (T. 1788).

107. *M. longiseta* Hedw. sp. (T. 1788).

108. *M. Albertini* Br. Sch. (Beuthe! ap. Sch. 1828) bei Neustrelitz (nicht: Neubrandenburg!) und Schwerin.

109. *M. tristicha* Br. Sch. (Sch. 1828).

110. *Amblyodon dealbatus* Hedw. sp. (Bl. 1804).

119. Bartramia-
ceae.

111. *Bartramia ithyphylla* Brid. (Sch. 1806).

112. *B. pomiformis* L. sp. (T. 1788).

β. *crispa* Sw. (Sch. 1806).

113. *B. marchica* Brid. (Bl. 1806 in d. N. B.) bei Woldeck am Todtensee, bei Ludwigslust auf den Teuchener Wiesen.

114. *Bartramia fontana* L. sp. (T. 1788).
115. *Schistidium ciliatum* Hedw. sp. (T. 1788). 120. Grimmieae.
116. *Grimmia apocarpa* L. sp. (T. 1788).
117. *G. pulvinata* L. sp. (T. 1788).
118. *G. trichophylla* Grev. (Sch. 1819) bei Gevezin (nicht: Neubrandenburg!) an Granitblöcken.
119. *Gümbelia crinita* Brid. sp. (Struck 1860!) bei Wismar vor dem Alt-Wismar. Thore zwischen dem Schutt der abgebrochenen Wassermühle.
120. *Racomitrium lanuginosum* Hedw. sp. (T. 1788) selten an Granitblöcken.
121. *R. heterostichum* Hedw. sp. (T. 1788).
122. *R. canescens* Weis sp. (T. 1788).
123. *R. ericoides* Schrad. (Sch. 1819).
124. *Orthotrichum cupulatum* Hoffm. (Sch. 1806, 121. Orthotrichaceae. Crome?).
125. *O. anomalum* Hedw. (T. 1788).
126. *O. Ludwigii* Schwäg. (Fied. 1844) Schwerin im Steinfelder Holz.
127. *O. obtusifolium* Schrad. (Bl. 1804).
128. *O. pumilum* Schwägr. (Bl. 1804).
129. *O. tenellum* Bruch (Fied. 1844) an Pappeln am faulen See bei Schwerin.
130. *O. fallax* Bruch (Fied. 1844).
131. *O. affine* Schr. (Sch. 1806).
132. *O. fastigiatum* Bruch (Fied. 1844) an alten Bäumen am faulen See bei Schwerin.
133. *O. speciosum* N. E. (Fied. 1844).
134. *O. coarctatum* P. B. (Fied. 1844).
135. *O. crispum* Hedw. (T. 1788).

136. *Orthotrichum crispulum* Horn. (Fied. 1844) selten.
 137. *O. stramineum* Horn. (Fied. 1844).
 138. *O. diaphanum* Sch. (Bl. 1803).
 139. *O. Lyellii* Hook. (Fied. 1844).
 140. *O. leiocarpum* Br. Sch. (T. 1788).
 122. *Encalyptaceae.* 141. *Encalypta vulgaris* Hedw. (T. 1788).
 142. *E. streptocarpa* Hedw. (Sch. 1819).
 123. *Buxbaumieae.* 143. *Diphyscium foliosum* L. sp. (T. 1788).
 144. *Buxbaumia aphylla* Hall. (T. 1788).
 124. *Tetraphideae.* 145. *Tetraphis pellucida* L. sp. (T. 1788).
 125. *Polytrichaceae.* 146. *Polytrichum undulatum* L. sp. (T. 1788).
 147. *P. tenellum* Röhl. (T. 1788 undul. β).
 148. *P. angustatum* Brid. (Sch. 1819) Neubrandenburg vor dem Burgholze und bei der hintersten Mühle.
 149. *P. nanum* Dill. (T. 1788).
 150. *P. aloides* Hedw. (T. 1788).
 151. *P. urnigerum* L. (T. 1788).
 152. *P. gracile* Menz. (Sch. 1806).
 153. *P. juniperinum* W. (T. 1788).
 154. *P. strictum* Menz. (Bl. 1804 junip. var. affine).
 155. *P. piliferum* Schreb. (T. 1788).
 156. *P. formosum* Hedw. (Sch. 1806).
 157. *P. commune* L. (L. Sch. 1777). Vergl. S. 126.
 126. *Fontinaleae.* 158. *Fontinalis antipyretica* L. (T. 1788).
 159. *F. squamosa* L. (Sch. 1806) Neubrandenburg im Bach bei der Birzowschen Mühle unter der Freiarche.
 127. *Ripariaceae.* 160. *Cinclidotus fontinaloides* P. B. (Fied. 1844) an Steinen in einem Waldbach im Wahrholze bei Schwerin.
 128. *Hypnaceae.* 161. *Leucodon sciuroides* L. sp. (T. 1788).
 162. *Leptohymenium filiforme* Timm sp. (1788).

163. *Anomodon viticulosus* L. sp. (T. 1788 p. 221).
164. *A. curtispendus* L. sp. (T. 1788).
165. *Neckera pennata* Hedw. (Sch. 1806).
166. *N. crispa* L. (T. 1788).
167. *Leskea trichomanoides* Schreb. (T. 1788).
168. *L. complanata* L. sp. (L. Sch. 1777).
169. *L. sericea* L. sp. (T. 1788).
170. *L. subtilis* Hedw. (Sch. 1819) bei Stolpe unweit Stargard im Holz am See.
171. *L. polyantha* Schreb. (T. 1789).
172. *L. paludosa* Hedw. (Bl. 1806).
173. *L. polycarpa* Ehr. (Bl. 1808) nicht häufig.
174. *L. attenuata* Schreb. (T. 1788).
175. *Climacium dendroides* L. sp. (T. 1788).
176. *Hypnum exiguum* Blandow (1804).

Anm. — Nach Treviranus eine gute, selbstständige Art, die auch auf den Ruinen der Burg Godesberg bei Bonn wächst. Trev. sagt über dieselbe: „Dies Moos wird in Weber und Mohrs Flora Deutschlands mit *H. serpens* verbunden, von dem es sich durch den Standort sehr unterscheidet, sowie durch die lineal-pfriemenförmigen, ziemlich gedrängt stehenden Blätter, deren Nerv bis zur Spitze läuft, die kleinere, heller gefärbte Frucht, vor Allem aber durch den Deckel, der sich mit einer langen, aufwärts gebogenen Spitze endigt. Schwägrichen vereinigt dasselbe mit *H. tenellum* Dicks., aber Beschreibung und Abbildung desselben entsprechen dem Godesberger Moose so wenig, als Exemplare des *H. tenellum*, welche ich Hrn. Dr. Hooper verdanke. Dagegen stimmt dasselbe mit der Beschreibung und Abbildung des *H. exiguum* von Blandow in Sturms Flora, so wie mit einem Ex. der auf der Stadtmauer von Neubrandenburg (hinter dem Schauspielhause!) aufgenommenen Pflanze, welches ich von Hrn. Dr. A. F. Brückner daselbst habe, aufs vollkommenste überein.“ (Verhandl. des naturhist. Ver. der preuß. Rheinlande III. S. 18 f.). Auch bei Rostock entdeckte Blandow dies Laubmoos.

177. *Hypnum serpens* L. (T. 1788).
178. *H. velutinum* L. (T. 1788).
179. *H. Starkii* Brid. (Bl. 181?) selten).
180. *H. piliferum* L. (Crome 1803).
181. *H. incurvatum* Schr. (Bl. 1806) bei der Strzowschen Mühle unv. Neubrandenburg vor der Freitarche.
182. *H. albicans* Neck. (Sch. 1806. Crome?)
183. *H. glareosum* Br. Sch. (Fied. 1844) bei Schwerin nicht selten.
184. *H. salebrosum* Hoffm. (Crome 1803).
185. *H. nitens* Schreb. (T. 1788).
186. *H. lutescens* Huds. (T. 1788).
187. *H. populeum* Hedw. (Bl. 1804).
188. *H. plumosum* L. (Sch. 1806) selten.
189. *H. rutabulum* L. (T. 1788).
190. *H. cordifolium* Hedw. (Bl. 1804).
191. *H. cuspidatum* L. (T. 1788).
192. *H. Schreberi* W. (T. 1788).
193. *H. purum* L. (T. 1788).
194. *H. trifarium* W. M. (Sch. 1806) selten: bei Wolbeck am Todten See, Jagze im Bruch an der Eichhorster Gränze, Schwerin a. m. D.
195. *H. stramineum* Dicks. (Bl. 1808).
196. *H. myurum* Poll. (T. 1788).
197. *H. myosuroides* L. (Sch. 1828) festener als das vorige und mit diesem zusammen.
198. *H. alopecurum* L. (Sch. 1806) selten.
199. *H. abietinum* L. (T. 1788).
200. *H. Blandowii* W. M. (Bl. 1807 ap. W. M.).
201. *H. tamariscinum* Hedw. (L. Sch. 1777).

202. *Hypnum splendens* Hedw. (L. Sch. 1777).
 203. *H. sylvaticum* L. (Crome 1803).
 204. *H. denticulatum* L. (T. 1788).
 205. *H. undulatum* L. (Häcker 1848 ap. Rabh.) an
 d. mecklenb. Gränze bei Lübeck, im Ludwigslust Schloß-
 garten bei dem Mausoleum (Dr. A. Brückn. jun.).
 206. *H. riparium* L. (T. 1788).
 207. *H. ruscifolium* Neck. (Brück. 1803).
 208. *H. murale* Neck. (T. 1791) selten, 3. B. an
 der Neubrandenburger und Malchiner Stadtmauer.
 209. *H. confertum* Dick. (Fied. 1844).
 210. *H. megapolitanum* Bland. (1804).
 211. *H. Schleicheri* Hedw. (Fied. 1844) um Schwerin
 nicht selten.
 212. *H. praelongum* L. (T. 1788).
 213. *H. Stockesii* Turn. (Bl. 1808).
 214. *H. strigosum* Hedw. (T. 1788).
 β. obtusifolium.
 215. *H. longirostrum* Ehr. (T. 1788).
 216. *H. brevirostre* Ehr. (Crome 1803).
 217. *H. triquetrum* L. (T. 1788).
 218. *H. loreum* L. (T. 1788).
 219. *H. stellatum* Schreb. (T. 1788) bei Malchin
 auf der Weide beim Falsärberge, bei der Brandmühle unv.
 Neubrandenburg.
 220. *H. chrysophyllum* Bried. (Sch. 1806).
 221. *H. squarrosum* L. (T. 1788).
 222. *H. cupressiforme* L. (T. 1788).
 223. *H. silesiacum* P. B. (Häcker 1848) an der
 mecklenb. Gränze unv. Lübeck.

224. *Hypnum fluviatile* Sw. (Sch. 1806).
 225. *H. filicinum* Hedw. (T. 1788).
 226. *H. commutatum* Hedw. (Bl. 1808).
 227. *H. Crista castrensis* L. (T. 1788).
 228. *H. molluscum* Hedw. (T. 1788).
 229. *H. fluitans* L. (T. 1788).
 230. *H. aduncum* L. (T. 1788).
 231. *H. uncinatum* Hedw. (Sch. 1806).
 232. *H. lycopodioides* Schwäg. (Sch. 1806) bei Neu-
 brandenburg und Eichhorst an sumpfigen Stellen.
 233. *H. scorpioides* L. (T. 1788).
 234. *H. palustre* L. (Bl. 1806).
 129. Fissi- 235. *Fissidens incurvus* Schwäg. (Fied. 1844) an
 dentae. Grabenrändern an der Westseite des Neustädtischen Kirch-
 hofs bei Schwerin.
 236. *F. bryoides* L. sp. (T. 1788).
 237. *F. osmundoides* Hedw. (Bl. 1803).
 238. *F. taxifolius* L. sp. (T. 1788).
 239. *F. adiantoides* L. sp. (T. 1788).

V. Hepaticae.

(Nach Wüßnei 1854.)

130. Riccia- 1. *Riccia fluitans* L. (T. 1788).
 cae. 2. *R. crystallina* L. (T. 1788).
 3. *R. natans* L. (Sch. 1819) bei Eichhorst unweit
 Friedland, und von Wüßnei (briefliche Mitth.) auch bei
 Schwerin gefunden.
 4. *R. ciliata* Hoffm. (Sch. 1806) nur bei Neubran-
 denburg auf lehmigen Brachäckern gefunden.
 5. *R. glauca* L. (T. 1788).

6. *Anthoceros laevis* L. (T. 1788).
7. *A. punctatus* L. (T. 1788) seltener als d. vorige.
8. *Rebouillia hemisphaerica* L. sp. (Sch. 1806) bei 131. Mar-
 chantiaceae.
 Jagfe (unw. Friedland) im Bruch der Pferdekoppel; bei
 Schwerin am hohen Ufer (am Wege nach Zippendorf).
9. *Fegatella conica* L. sp. (T. 1788).
10. *Preissia commutata* N. E. (Wüst. 1855! in litt.)
 bei Schwerin.
11. *Marchantia polymorpha* L. (L. Sch. 1777).
- * 12. *Lunularia vulgaris* Mich. (Huth 1854) aus dem
 südl. Europa mit Topfgewächsen eingeschleppt.
13. *Metzgeria furcata* L. sp. (T. 1788).
14. *Aneura pinguis* L. sp. (T. 1788).
15. *A. multifida* L. sp. (T. 1788).
16. *A. palmata* Hedw. (T. 1788).
17. *Blasia pusilla* Mich. (T. 1788) Malchin im
 Hohlwege des Hainholzes an der Gieslower Gränze; bei
 Schwerin am Rande der Neumühler Wiese. In M. Strelitz
 noch nicht gefunden.
18. *Pellia epiphylla* L. sp. (T. 1788).
19. *Fossombronina pusilla* Schmidel sp. (T. 1788).
20. *Lejeunia serpyllifolia* Dicks. sp. (L. Sch. 1819)
 nur bei Neubrandenburg im Brodaschen Holz und bei
 Ballin unw. Stargard gefunden.
21. *Frullania dilatata* L. sp. (T. 1788).
22. *F. tamariscifolia* L. sp. (T. 1788).
23. *Madotheca platyphylla* L. sp. (T. 1788).
24. *Radula complanata* L. sp. (L. Sch. 1777).
25. *Ptilidium ciliare* L. sp. (T. 1788).
26. *Trichocolea tomentella* Ehr. sp. (T. 1788) nur

bei Malchin im Kälenschen Holz an dem Bach beim Mühlenbruch gefunden.

27. *Mastigobryum trilobatum* L. sp. (Sch. 1819) nur bei Neubrandenburg im Burgholze gefunden.

28. *Lepidozia reptans* L. sp. (T. 1788).

29. *Calypogeia Trichomanis* Scop. sp. (T. 1788). schon bei Neubrandenburg, Malchin, Güstrow und Schwerin gefunden.

30. *Chiloscyphus polyanthos* N. E. (Sch. 1819) bei Güstrow auf einer Wiese.

β. rivularis Schultz sup. p. 89. Kl. Nemerow am Mühlenbach an Baumwurzeln.

31. *Ch. pallescens* Schrad. sp. (Sch. 1806) Neubrandenburg im Brodaschen Holz.

32. *Lophoclea heterophylla* Schrad. sp. (Sch. 1819).

33. *L. bidentata* L. sp. (T. 1788).

34. *L. minor* N. E. (Wüst. 1854) bei Schwerin im Gehölze von Görslow an einer Quelle.

35. *Lioclaena lanceolata* L. sp. (T. 1791) Neubrandenburg im Brodaer Holz, Malchin im Kälenschen Holz (im ersten Hohlwege), Schwerin im Steinfelder Holz.

36. *Sphagnocretis communis* N. E., Dicks. sp. (Sch. 1806).

37. *Jungermannia trichophylla* L. (T. 1788) Neubrandenburg im Brodaschen, Malchin im Kälenschen Holz.

38. *J. setacea* Web. (Sch. 1819 = *J. Schultzii* Spr.) bei Krumbeck hinter dem Hofgarten „in turfosis paludosis“; bei Schwerin an ähnl. Localität auf dem Werder.

39. *J. connivens* Dick. (Sch. 1819).

40. *J. bicuspidata* L. (T. 1788).

41. *Jungermannia divaricata* E. B. (Sch. 1806).

42. *J. barbata* Schreb. (Sch. 1819).

43. *J. excisa* Dicks. (Sch. 1819) Neubrandenburg an den steilen Abstürzen des hohen Ufers, Schwerin auf Sand- und Haideboden.

44. *J. ventricosa* N. E. (T. 1788) bei Witzerhof unweit Malchin auf den Hügeln in den Tannen.

45. *J. inflata* Huds. (Sch. 1819) „in schattigen Wäldern auf der Erde.“

46. *J. Schultzii* N. E. (Sch. 1838); von Schultz bei Neubrandenburg gefunden.

47. *J. crenulata* Sm. (Wüst. 1854) bei Schwerin im Hasel- und Steinfeldes Holz auf feuchtem Sandboden.

48. *J. exsecta* Schm. (Sch. 1806).

49. *obtusifolia* Hook. (W. 1854) bei Schwerin im Hasel- und Steinfeldes Holz in Wegen und Vertiefungen.

50. *J. albicans* L. (W. 1854) bei Schwerin und Crivitz auf sandigem Waldboden.

51. *Scapania nemorosa* L. sp. (Sch. 1819) Neubrandenburg im Nemerower Holz, auch bei Schwerin nicht selten.

52. *S. uliginosa* N. E. (Sch. 1834 ap. Hübener) „in Mecklenburg“ — aber wo?

53. *S. undulata* L. (Sch. 1819) bei Ballin hinter dem Hofgarten in Gräben.

β. resupinata L. Neubrandenburg im Nemerower Holz, bei Schwerin auf dem Sachsenberger Gebiet.

54. *S. compacta* N. E. (Treviranus 1834 ap. Hüb.) „in Mecklenburg“ — aber wo?

55. *Plagiochila asplenoides* L. sp. (T. 1788).

56. *Alicularia scalaris* Schr. sp. (Sch. 1806).

57. *Sarcoscyphus Ehrharti* Corda (Sch. 1819) bei Neuendorf unv. Neubrandenburg am Eingang des Holzes, bei Krumbek in einem Bruche.

VI. Algae.

(Geordnet nach Rabenhorst Krypt. Flora 1847.)

Anm. Ueber das Mangelhafte der nachfolgenden Aufzählung vergl. S. 194 ff. — Die Süßwasser-Algen habe ich durch einen vorgelegten * bezeichnet.

133. Diato-
maceae.

1. *Eunotia granulata* Ehrb. (Koch 1860!) Ostsee: Doberan.

2. *E. turgida* Ehrb. (Koch 1860!) ebend.

3. *E. zebrina* Ehrb. (Koch 1860!) desgl.

4. *Diatoma tenue* Ag. (Ditm. 1806) Ostsee.

5. *Bacillaria paradoxa* Gmel. (Rab. 1847) Ostsee: Wismar.

6. *Surirella thermalis* Kütz. (Rab. 1847) desgl.

7. *S. Lamella* Ehrb. (1840) desgl.

8. *S. Testudo* Ehrb. (1840) desgl.

9. *S. fastuosa* Ehrb. (Koch 1860!) Ostsee: Doberan.

10. *S. splendida* Ehrb. (Koch 1860!) desgl.

11. *Synedra Gallionii* Ehrb. (1840) Ostsee: Wismar.

12. *S. Ulna* Ehrb. (Koch 1860!) Ostsee: Doberan.

13. *Ceratonöis Fasciola* Ehrb. (1840) Wismar.

14. *C. Closterium* Ehrb. (1840) desgl.

* 15. *Navicula gibba* Ehrb. (1840) Wismar im süßen W.

16. *N. Scalprum* G. T. (Ehrb. 1840) Ostsee: Wismar.

17. *N. Hippocampus* Ehrb. (1840) desgl.

18. *N. inversa* Ehrb. (1840) desgl.

19. *N. fulva* Ehrb. (Koch 1860!) Dŕtŕee: Doberan.
 20. *N. Silicula* Ehrb. (Koch 1860!) beŕgl.
 21. *Pinnularia viridis* Ehrb. (Koch 1860!) beŕgl.
 22. *P. flexipinna* Ehrb. nov. sp. (Koch 1860!) beŕgl.
 23. *Cocconema Boekii* Ehrb. (1840) Dŕtŕee: Wiŕmar.
 24. *Syncyclia Salpa* Ehrb. (1840) beŕgl.
 - * 25. *Tabellaria flocculosa* Roth sp. (Ditm. 1806).
 26. *Grammatophora oceanica* Ehrb. (Koch 1860!)
- Dŕtŕee: Doberan.
27. *G. stricta* Ehrb. (Koch 1860!) beŕgl.
 28. *Achnanthes longipes* Ehrb. (Koch 1860!) beŕgl.
 29. *Striatella arcuata* Ehrb. (Koch 1860!) beŕgl.
 30. *Coscinodiscus lineatus* Ehrb. (Koch 1860!) beŕgl.
 31. *Actinocyclus bioctonarius* Ehrb. (Koch 1860!)
- beŕgleichen.
32. *A. septendenarius* Ehrb. (Koch 1860!) beŕgl.
 33. *A. nonarius* Ehrb. (Koch 1860!) beŕgl.
 34. *Campylodiscus Remora* Ehrb. (1841) Dŕtŕee:
- Wiŕmar.
35. *C. Echnöis* Ehrb. (1841) beŕgl.
 36. *C. Clypeus* Ehrb. (Koch 1860!) Dŕtŕee: Doberan.
 37. *Gallionella granulata* Ehrb. (Koch 1860!) beŕgl.
 38. *G. laevis* Ehrb. (Koch 1860!) beŕgl.
 39. *G. sulcata* Ehrb. (Koch 1860!) beŕgl.
 40. *G. varians* Ehrb. (Koch 1860!) beŕgl.
 41. *Cocconöis undulata* Ehrb. (1840) Dŕtŕee: Wiŕmar.
 42. *C. Navicula* Ehrb. (1840) beŕgl.
 43. *C. borealis* Ehrb. (Koch 1860!) beŕgl.
 44. *C. fennica* Ehrb. (Koch 1860!) beŕgl.
 45. *C. lineata* Ehrb. (Koch 1860!) beŕgl.

46. *Cocconëis striata* Ehrb. (Koch 1860!) besgl.

47. *Dictyocha Fibula* Ehrb. (1840) Ostsee: Wismar.

48. *Auliscus cylindricus* Ehrb. (Koch 1860!) Ostsee: Doberan.

49. *Diplonëis didyma* Ehrb. (Koch 1860!) besgl.

134. Desmidiaceae.

50. *Merismopoedia glauca* Ehrb. sp. (Rose 1845); im Seewasser bei Wismar.

135. Nostochinae.

* 51. *Palmella cruenta* Ag. (Fiedler 1860!) auf Steinen in dem schnellfließenden Canale unterhalb der kleinen Schleuse im Ludwigslust Schloßgarten.

* 52. *Tetraspora bullosa* Roth. sp. (T. 1788) häufig in Gräben und stehenden Gewässern.

* 53. *Nostoc commune* Vauch. (T. 1788 als *Tremella Nostoc* L.) nach Regen auf Wiesen bei Malchin u. s. w. S. 40.

* 54. *Nostoc pruniforme* L. sp. (T. 1793) Klostoch im Wallgraben und in der Warnow; im Siggelfower See sehr häufig; Schwerin im Dstorfer See, Ludwigslust im Schloßgarten.

* 55. *Anabaina flos aquae* Lyngb. (v. Flotow 1845 bei Rütting Phycol. germ. S. 188. — ob auch Timms *Byssus flos aq.* 1788?).

* 56. *Cylindrospermum spirale* Ktz. (Link 1806 als *Oscillatoria decorticans*, in den N. Beitr. St. 20).

136. Oscillatoriaceae.

* 57. *Oscillaria viridis* Vauch. (Link 1806 in den N. Beitr. St. 46).

* 58. *Oscillaria princeps* Vauch. (Link l. c. 1806).

* 59. *Microcolëus autumnalis* Ag. sp. (Schultz 1806 als *Conferva velutina*); in ausgetrockneten Gräben häufig.

* 60. *Calothrix distorta* Dillw. sp. (Ditmar 1808 als *Epiphysium dist.* in N. Beitr. St. 50).

* 61. *Sphaeroplea annulina* Roth. sp. (Link 1806 in den N. Beitr. St. 46).

62. *Physactis durissima* Ktz. Phyc. Germ. p. 186. (v. Flotow 1845) auf *Ceramium rubrum* bei Doberau.

* 63. *Rivularia pygmaea* Ktz. l. c. p. 188. (v. Flotow 1845).

* 64. *Draparnaldia glomerata* Ag. (Ditmar 1808 als ^{137. Confer-}
Batrachospermum gl. in den N. Beitr. St. 50). ^{vaceae.}

* 65. *Saprolegnia ferax* Ktz. (Fiedler 1860! in litt.) auf Fliegen im Wasser macerirend.

* 66. *Oedogonium vesicatum* Vauch. sp. (Link 1806 als *Prolifera* ves. l. c. St. 46).

* 67. *Oedogonium tumidulum* Sm. sp. (Link l. c. 1806 als *Prolifera* parasitica).

* 68. *Conferva rivularis* L. (T. 1788) nicht selten in Bächen.

* 69. *Conferva floccosa* Vauch. sp. (Ditmar 1806) als *Prolifera* fl. in den N. Beitr. St. 20).

* 70. *Conferva fracta* Dillw. (Link 1806 l. c. St. 46).

* 71. *Conferva canalicularis* Roth. (T. 1788).

72. *Conferva sericea* Huds. (Kahle 1860!) in der Ostsee bei A. Gaarz.

* 73. *Conferva glomerata* L. (T. 1788) in Bächen.

74. *Conferva laetevirens* Dillw. var. *marina* (Link 1806 als *Polysperma abbreviata* l. c. St. 46) in der Ostsee.

75. *Conferva rupestris* L. (T. 1791) an Steinen bei Warnemünde!

76. *Aegagropila Linnaei* Ktz. (Rabenhorst 1847) in der Ostsee bei Warnemünde.

* 77. *Aegagropila Froelichiana* Ktz. (T. 1791 als

Conferva Aegagr.) im Mechower See (Sonder), und auch im Krafower See und in der Müritz! besonders bei Melz (wo nach Stürmen fußhohe Haufen dieser Alge am Ufer ausgeworfen vorkommen sollen, wie Siemssen 1791 berichtet).

78. *Ectocarpus ochraceus* Ktz. (Huth 1860!) in der Ostsee bei Räggsdorf.

* 79. *Spirogyra quinina* Müll. sp. (Link 1806 l. c. St. 46).

* 80. *Spirogyra elongata* Vauch. sp. (Ditmar 1806).

* 81. *Spirogyra condensata* Vauch. sp. (Ditm. 1806).

* 82. *Spirogyra nitida* Fl. Dan. (Ditm. 1806 als *Conjugata princeps* l. c.).

* 83. *Spirogyra decimina* Müll. sp. (Link 1806 l. c. St. 46).

* 84. *Zygnema cruciatum* Vauch. sp. (Ditm. 1806 l. c. St. 20).

* 85. *Zygogonium ericetorum* Roth. sp. (Link 1806 l. c. St. 46); auf Torf- und Haideboden.

* 86. *Hydrodictyon utriculatum* Roth. (G. Brückner 1860!) Ludwigslust am Bassin.

138. *Ulva-*
ceae. * 87. *Botrydium granulatum* L. sp. (T. 1788) an überschwemmt gewesenen und wieder ausgetrockneten Orten z. B. bei Malchin auf dem Gerichtsberge.

* 88. *Vaucheria bursata* Müll. sp. (Ditm. 1806 als *Ectosperma ovata* l. c. St. 20).

* 89. *Vaucheria hamata* Vauch. sp. (Ditm. 1806).

* 90. *Vaucheria Dillwynii* W. M. sp. (Link 1806 l. c.).

* 91. *Vaucheria geminata* Vauch. sp. (Ditm. 1806 l. c.).

* 92. *Vaucheria caespitosa* Vauch. sp. (T. 1788 als *Conferva amphibia*).

93. *Enteromorpha intestinalis* L. sp. (T. 1788) häufig in der Ostsee und um Salzquellen!

94. *Enteromorpha compressa* L. sp. (T. 1788) in der Ostsee bei Warnemünde!

95. *Ulva latissima* L. (T. 1788) Ostsee bei Warnemünde!

96. *Phycoseris Linza* L. sp. (T. 1788) Ostsee bei Warnemünde! auch am Fischlande (Zabel).

97. *Callithamnion repens* Dillw. sp. (T. 1793 als ^{139. Ceramiacae.} *Conferva tomentosa*) in der Ostsee.

98. *Ceramium diaphanum* Light. sp. (T. 1788 als *Conferva corallina*) in der Ostsee bei Warnemünde! und auch noch am Fischlande (Zabel).

99. *Ceramium rubrum* Huds. sp. (Link 1806 als *C. virgatum*) in der Ostsee bei Doberan! Warnemünde! und auch noch am Fischlande! (Zabel).

100. *Nemalion multifidum* W. M. sp. (Huth 1860!) in der Ostsee bei Rügsdorf.

101. *Furcellaria lumbricalis* Ag. sp. (G. Brück. 1860!) in der Ostsee bei Doberan! am Fischlande (Zabel)!

102. *Furcellaria fastigiata* Huds. sp. (T. 1788 als *Fucus*) in der Ostsee bei Doberan! Warnemünde!

103. *Ahnfeltia plicata* Huds. sp. (Deth. 1811 in b. N. Beitr. St. 7 als *Fucus*) in der Ostsee; auch von Zabel am Fischlande gefunden.

104. *Phyllophora membranifolia* Ag. sp. ? (Huth 1860!) in der Ostsee bei Rügsdorf.

105. *Phyllophora Brodiaei* Turn. sp. (Huth 1860!) bei Räggsdorf und auch noch am Fischlande! (Zabel).

106. *Chondrus crispus* Lyng. var. *aequalis* (T. 1788 *Fucus rubens*) bei Warnemünde und am Strande des Fischlandes.

Ann. *Gelidium cartilagineum* L. sp. (T. 1793) ist wohl nur durch Zufall an den Strand von Warnemünde verschleppt worden.

140. Sphaerococcae.

107. *Polysiphonia violacea* Ag. sp. (Link 1806 als *Ceramium* in der Ostsee, auch noch am Fischlande (Zab.)!

108. *Polysiphonia allochroa* Ag. sp. (Huth 1860!) am Strande bei Räggsdorf.

109. *Polysiphonia nigrescens* Lyngb. sp. (Zabel 1860!) am Fischlande.

110. *Rhodomela subfusca* Wood. sp. (G. Brück. 1860!) bei Doberan; am Fischlande (Zabel)!

111. *Sphaerococcus confervoides* L. sp. (Link 1806) Ostsee.

112. *Delesseria sanguinea* L. sp. (T. 1788) in der Ostsee, auch am Fischlande (Zabel)!

113. *Hypoglossum alatum* Huds. sp. (Deth. 1811 in d. N. Beitr. St. 7) Ostsee; auch von Zabel am Fischlande gefunden!

114. *Phycodrys sinuosa* Ag. sp. (Huth 1860!) in der Ostsee bei Räggsdorf und am Fischlande (Zabel).

141. Phycoccae.

115. *Mesogloia vermicularis* Ag. sp. (Zabel 1860!) am Fischlande.

116. *Chorda Filum* L. sp. (T. 1788 als *Fucus*).

β. *thrix*. γ. *tomentosa*; beide Var. am Fischlande (Zabel).

117. *Stilephora rhizodes* Ag. sp. (A. F. T. Brück. 1798) nach Ausweis meines Herbariums in der Ostsee bei Warnemünde!

118. *Desmarestia viridis* Müll. sp. (Zab. 1860!) am Fischlande.

119. *Laminaria saccharina* L. sp. (Deth. 1788 bei Linn, als *Fucus*), in der Ostsee.

120. *Laminaria digitata* L. sp. (Huth 1860!) in der Ostsee bei Rügendorf; auch noch am Fischlande (Zabel).

121. *Fucus vesiculosus* L. (T. 1788) gemein am Ostseestrande!

Anm. *F. ceranoides* L. (T. 1793) ist wohl durch Zufall an die mecklenburgische Küste verschlagen.

122. *Fucus serratus* L. (T. 1788; *setaceus* Druckfehler!) am Ostseestrande bei Warnemünde! auch noch an der Küste Rügens!

123. *Fucus canaliculatus* L.? (T. 1791) auf Steinen bei Warnemünde.

124. *Himanthalia lorea* L. sp. (C. Griewank 1860!) in der Ostsee bei Bostenhagen.

125. *Halidrys siliquosa* L. sp. (T. 1791 *Fucus*) bei Warnemünde! und auch noch am Fischlande (Zabel)!

* 126. *Nitella gracilis* Sm. sp. (Fiedler ap. Rabenhorst 1847), bei Schwerin. 142. Characeae.

* 127. *Nitella mucronata* A. Br. (Fiedler l. c. 1847) bei Schwerin.

* 128. *Nitella syncarpa* Thuill. (Fiedler l. c. 1847) bei Schwerin.

* 129. *Nitella flexilis* L. sp. (T. 1788 *Chara*).

* 130. *Nitella tenuissima* Desv. (Fiedler l. c. 1847) bei Schwerin.

* 131. *Chara scoparia* Bauer (Fiedler l. c. p. 1847) bei Schwerin. — Vergl. S. 37.

* 132. *Chara foetida* A. Br. (T. 1788 als *vulgaris*).

133. *Chara ceratophylla* Wallr. (Zabel 1860!) im Saaler Bodden.

* 134. *Chara latifolia* W. (Schultz 1806? als *tomentosa*) Tolenfe, Goldberger See.

135. *Chara hispida* L. (T. 1788) in Gräben und Teichen, aber nach Zabel auch im Saaler Bodden.

* 136. *Chara horridula* Deth. N. Beitr. 1811 St. 7, in alten Torflöchern hinter Markgrafenheide.

137. *Chara crinita* Wallr. (Zabel 1860!) im Saaler Bodden.

138. *Chara baltica* Fr. (Zab. 1860!) im Saaler Bodden.

139. *Chara aspera* Willd. (Deth. 1809) in der südlichen Hälfte von M. Strelitz häufig, aber auch im Saaler Bodden (Zabel), und im heiligen See bei Markgrafenheide.

* 140. *Chara fragilis* Desv. (Beuthe 1837) in Gräben bei Zierke unweit Neustrelitz.

Anm. Nicht unterzubringen weiß ich: *Batrachospermum intricatum* (Vauch.) Link, *Ceramium frondulosum* und *utriculare* Lk., *Conferva arenaria* (Roth) Lk. und *furcata* Timm, *Conjugata angulata*, *porticalis* und *variabilis* Ditmar, *Fucus prolifer* (Esp.) Dethard., *Oscillatoria Adansonii*, *leptonema* und *parietina* Ditm., *Saccosphaera aggregata* und *Spirogyra aeruginosa* Link, welche in den Mügl. Beitr. 1806, 1808 und 1811, in Timms Prodrömus und in Link's dissert. bot. noch erwähnt werden.

VII. Lichenes.

(Geordnet nach Rabenhorst 1845.)

Anm. Unsere Kenntniß auch dieser Classe ist noch sehr mangelhaft und das nachfolgende Verzeichniß der Arten ist nur ein Lückenhilfer, von dem ich wünsche, daß er bald durch eine neue, gründliche Arbeit verdrängt werden möge. Um Raum zu sparen, gebe ich daher hier nur wenige Standorte an. Vergl. S. 197.

1. *Verrucaria epidermidis* Ach. (Schultz 1806). 143. Verrucariaceae.
2. *Verrucaria carpinea* Pers. (Schultz 1806).
3. *Verrucaria nitida* Schrad. (T. 1788 als *Sphaeria*).
4. *Verrucaria punctiformis* Pers. (Sch. 1806).
5. *Pertusaria Wulfenii* var. *agelaea* Ach. (Sch. 1806 als *Urceolaria*).
6. *Pertusaria communis* DC. (T. 1791 als *Lichen pertusus*).
7. *Graphis scripta* L. sp. (T. 1788 als *Lichen*). 144. Graphideae.
 β . *pulverulenta* (Sch. 1806 als *Opegrapha*).
 γ . *serpentina* (Sch. 1806 als *Opegrapha*).
8. *Opegrapha herpetica* Ach. (Sch. 1806 als *rubella*).
9. *Opegrapha atra* Pers. (Sch. 1806 *vulgata*, *macularis*, *epipasta*).
10. *Opegrapha varia* Pers. (Sch. 1806 *notha*).
11. *Urceolaria cinerea* L. sp. (Sch. 1806). 145. Limborieae.
12. *Urceolaria scruposa* L. sp. (Sch. 1806).
13. *Placodium lentigerum* Web.? (Sch. 1806 als *Parmelia*). 146. Lecanorinae.
14. *Placodium saxicola* Poll. (Sch. 1806 *Parmelia*).
15. *Placodium elegans* Lk. (Sch. 1806 *Parmelia*).
16. *Placodium murorum* Hoffm. (Sch. 1806 *Parmelia*).
17. *Zeora brunnea* Sw. (Sch. 1806 *Parmelia*).

18. *Zeora hypnorum* Ach. (Wüstnei 1860!) auf Sandboden bei Schwerin.

19. *Zeora glaucoma* Ach. (Sch. 1806 *Parmelia*).

20. *Zeora icmadophila* Ehr. (Sch. 1806 *Lecidea*).

21. *Zeora vitellina* Ehr. var. *aurella* Schaer. (Dr. A. Brück. 1860!) bei Ludwigslust.

22. *Zeora rubra* Hoffm. (Thede 1806 in den N. Beitr.) bei Wittenburg und Rostock.

23. *Zeora cerina* Hedw. (Sch. 1806 *Parmelia*).

24. *Lecanora atra* Huds. (Sch. 1806 *Parmelia*).

25. *Lecanora subfusca* L. (T. 1788 Lichen).

26. *Lecanora sophodes* Ach. (Sch. 1806 *Parmelia*).

27. *Lecanora varia* Ehr. (Sch. 1806 *Parm.*).

28. *Lecanora albella* Hoffm. (Sch. 1806 *Parm.*).

29. *Lecanora Hageni* Ach. (Sch. 1806 *Parm.*).

147. *Parmeliaceae*.

30. *Collema atro-coeruleum* Schaer. (T. 1788 *Tremella lichenoides*).

31. *Collema crispum* Hoffm. (T. 1788 Lichen).

32. *Micaraea Wüstneii* Auerswald (Wüstnei 1857), bei Schwerin am Ufer des Medeweger Sees.

33. *Imbricaria tiliacea* Ehr. (Sch. 1806 als *Parm.*).

34. *Imbricaria saxatilis* L. (T. 1788 Lichen).

35. *Imbricaria physodes* L. (Sch. 1806).

36. *Imbricaria Acetabulum* Neck. (Sch. 1806 *Parmelia corrugata*).

37. *Imbricaria olivacea* L. (T. 1788 Lichen).

38. *Imbricaria caperata* L. (T. 1788 Lichen).

39. *Imbricaria conspersa* Ehr. (T. 1793 als Lichen *centrifugus*?).

40. *I. diffusa* Körb. (Wüst. 1860!) an Kiefern b. Schwerin.

41. *Imbricaria parietina* L. (T. 1788 Lichen). S. 126.
42. *Imbricaria aspera* Körb. (Wüstnei 1860!) bei Schwerin an Sorbus und Pappeln.
43. *Parmelia obscura* Ehr. (Sch. 1806) auch bei Schwerin.
44. *Parmelia stellaris* L. (T. 1788 Lichen).
45. *Parmelia caesia* Hoffm. (Sch. 1806).
46. *Parmelia pulverulenta* Schreb. (T. 1788 Lichen orbicularis).
47. *Sticta scrobiculata* Scop. (Sch. 1806 Parm.).
48. *Lobaria pulmonaria* L. sp. (T. 1788). S. 36. 126.
49. *Peltigera venosa* L. (T. 1788).
50. *Peltigera horizontalis* L. (T. 1788).
51. *Peltigera canina* L. (T. 1788).
52. *Peltigera polydactyla* Hoffm. (Sch. 1806).
53. *Peltigera aphtosa* L. (T. 1788).
54. *Peltigera malacea* Ach. (Flörke 182?).
55. *Calycium adpersum* Pers. (T. 1788 *Mucor* 148. Calyci-
neae lichenoides).
56. *Calycium chlorellum* Wahlb. (Sch. 1806).
57. *Calycium hyperellum* Ach. (Sch. 1806).
58. *Calycium lenticulare* Ach. (T. 1788 *Mucor* sphaerocephalus).
59. *Coniocybe furfuracea* L. sp. (T. 1788 *Mucor*).
60. *Lecidea citrinella* Ach. (Sch. 1806). 149. Lecide-
aceae.
61. *Lecidea abietina* Ach. (Thede 1806 in d. N. Beitr.).
62. *Lecidea albo-atra* Schaer. (Sch. 1806 *L. corticola*).
63. *Lecidea dolosa* Wahl. (Sch. 1806 *Parmelia exigua*).
64. *Lecidea sanguinaria* Hoffm. (T. 1788 Lichen).

65. *Lecidea enteroleuca* Ach. (Wüstnei 1860!) bei Schwerin an alten Weiden.

66. *Lecidea parasema* Ach. (Sch. 1806).

67. *Lecidea punctata* Fr. (Wüst. 1860!) bei Schwerin an alten Kiefern die der Sonne ausgesetzt sind.

68. *Lecidea geographica* L. (T. 1791 als Lichen).

69. *Biatora ferruginea* Fr. (Dr. A. Brück. 1860!) bei Schwerin.

70. *Biatora uliginosa* Schrad. (Sch. 1806 *Lecidea*).

71. *Biatora microphylla* Schrad.? (Sch. 1806 *Lecidea*?)

72. *Biatora anomala* Spr. sp. (Sch. 1806 *Lecid. cyrtella*).

73. *Biatora granulosa* Ehr. (Wüst. 1860!) auf Sandboden bei Schwerin.

74. *Biatora sphaeroides* Schaer. β . *effusa* (Dr. A. Brück. 1860!) Schwerin am Haselholz und auf dem Berder an Pinus und Fagus.

75. *Biatora rubella* Ehr. (Sch. 1806 *Lecid. vernalis*).

76. *Biatora rosella* Pers. (Sch. 1806 *Lecidea*).

77. *Biatora byssoides* L. (Sch. 1806 *Baeomyces rupestris*).

78. *Baeomyces roseus* Pers. (T. 1788 Lichen *Baeomyces*).

150. Cladoniaceae.

Anm. Um die ohnehin schon große Verwirrung, welche in der nachfolgenden Gattung *Cladonia* herrscht, nicht meinerseits durch vielleicht irrtümliche Unterbringung der von unseren Floristen aufgezählten Arten unter die von Rabenhorst recipirten deutschen Species noch zu vermehren, werde ich für diese Gattung Florke's *Commentatio de Cladoniis* (Nostock 1828) zu Grunde legen, in welcher die mecklenburgischen Cladonien ganz speciell berücksichtigt sind; nur einige Aenderungen in den Namen habe ich nach F. v. Flotow *Lichenes Florae Silesiae* (in der Uebersicht der Arbeiten der Schlesischen Gesellschaft u. s. w. Breslau 1850 S. 98 ff.) vorgenommen.

79. *Cladonia papillaria* L. Flörke p. 5. (1828) auf Torf- und Schlammboden bei Markgrafenheide.

β. *stipata* p. 6. in dem Walde „Damerow“ unweit Barnsdorf.

80. *Cladonia delicata* Ach. sp. Fl. p. 7 (Sch. 1806 als *Baeomyces*) in der Rostocker und Milbenitzer Heide.

81. *Cladonia caespiticia* Ach. sp. Flörke p. 8 (1828) in der Rostocker Heide bei Meyer's Hofstelle.

82. *Cladonia decorticata* L. Fl. p. 10 (1828) in den Gehlsdorfer = Fähr = Tannen, und auf dem Harkenberge bei Pohnsdorf unweit Zeterow.

83. *Cladonia cariosa* L. Fl. p. 12 (Sch. 1806), auf sandigem Boden an Wegen und Grabenrändern in den Wäldern Damerow und Aramonberg unweit Rostock; zw. Sponholz und Warlin in M. Strelitz.

β. *strepilis* Ach. Fl. p. 14 in Nadelholzwaldungen der Rostocker Gegend.

γ. *symphyrcarpia* Ach. Fl. p. 15 (Sch. 1806) auf Heideboden und in Nadelholzwaldungen ziemlich verbreitet.

84. *Cladonia botrytes* L. Fl. p. 18 (Sch. 1806) in der Rostocker Heide und in Nadelholzwald. bei Friedland.

85. *Cladonia incrassata* Flörke p. 21 (1828) in der Rostocker Heide.

86. *Cladonia alcicornis* Ach. Fl. p. 23 (Sch. 1806) nicht selten in M.

87. *Cladonia cervicornis* Ach. = *verticillata* Fl. p. 26 (1828) häufig in M.

β. *phyllophora* Fl. p. 28.

88. *Cladonia gracilis* L. Fl. p. 30 (Sch. 1806) desgl. in manchen Abänderungen.

β. aspera p. 40.

89. *Cladonia degenerans* L. Fl. p. 41. (1828) in vielen Varietäten weit verbreitet.

90. *Cladonia pyxidata* L. = *neglecta* Fl. p. 49 (1828) bei Klostodf.

91. *Cladonia fimbriata* L. = *pyxidata* Flörke p. 51 (Sch. 1806).

β. costata p. 66. *γ. expansa* p. 68.

δ. pterygota p. 69. *ε. chlorophaea* p. 70.

92. *Cladonia ochrochlora* Flör. p. 75 (1828) häufig.

β. phyllostrota p. 79. *γ. nana* p. 79.

93. *Cladonia pityrea* L. Fl. p. 79 (Fl. 1828) häufig.

β. cladomorpha p. 81. *γ. pellucida* p. 82.

δ. hololepis p. 83.

94. *Cladonia coniocraea* L. Flör. p. 84 (T. 1788 *Lichen cornutus*).

β. phyllotoca p. 87.

95. *Cladonia coccifera* L. Fl. p. 89 (T. 1788) gemein.

β. phyllocoma p. 94. *γ. ochrocarpia* p. 95.

96. *Cladonia Flörkeana* Fr. Fl. p. 99 (1828) hin und wieder durch M.

β. leucophylla p. 101.

96. *Cladonia digitata* L. Fl. p. 102 (T. 1788) gemein.

98. *Cladonia deformis* L. = *crenulata* Flör. p. 105 (1828), nicht selten.

β. pleurota p. 107.

99. *Cladonia macilenta* Ehr. = *polydactyla* Flör. p. 108 (Sch. 1806 als *Baeomyces bacillaris*), häufig.

100. *Cladonia uncinata* Hoffm. = *cenotea* Fl. p. 125 (1828).

β. brachiata Fr. (Wüstnei 1860!) bei Schwerin und Güstrow.

101. *Cladonia squamosa* L. Fl. p. 129 (1828).

β. asperella p. 132. *γ. lactea* p. 136.

δ. polychonia p. 136.

102. *Cladonia glauca* Flör. p. 140 (1828) auf Sandboden in Nadelholzwäldern bei Waren und im Damerow.

103. *Cladonia furcata* L. Fl. p. 141 (Sch. 1806).

β. spadicea p. 146. *γ. recurva* p. 147.

δ. crispatella p. 148. *ε. crispata* p. 148.

ζ. fissa p. 151. *η. racemosa* p. 152.

104. *Cladonia pungens* Flörke p. 156 (1828) gemein.

β. nivea p. 158. *γ. foliosa* p. 159.

105. *Cladonia rangiferina* L. Fl. p. 160 (T. 1788), gemein.

β. major p. 163. *γ. tenuis* p. 164.

δ. alpestris p. 165. *ε. sylvatica* p. 167.

106. *Cladonia Arbuscula* W. C. (Flörke 1828 als *C. rangif. grandis* p. 169) bei Rostock; ist nach v. Flo-tow und Rabenhorst von der vorausgehenden als Species zu trennen.

107. *Cladonia stellata* Schaer. Fl. p. 172 (1828).

108. *Stereocaulon condensatum* Hoff. (Wüstnei 1860!) in den Tannen bei Neumühl unv. Schwerin nicht selten.

109. *Stereocaulon tomentosum* Wahl. (T. 1788 als *Lichen paschalis*) durch ganz Mecklenburg.

110. *Cetraria glauca* L. sp. (T. 1788).

151. Ramali-
neae.

111. *Cetraria saepincola* Ehr. (Sch. 1806).

112. *Cetraria juniperina* L. (T. 1788).

113. *C. pinastri* Scop. (Thede 1806 in d. N. Beitr.).

152. Usnea-
ceae.

- 114. *Hagenia ciliaris* L. sp. (T. 1788).
- 115. *Evernia furfuracea* L. (Sch. 1806 *Parmelia*).
- 116. *Evernia prunastri* L. (T. 1788).
- 117. *Ramalina pollinaria* Ach. (Sch. 1806 *Parmelia*).
- 118. *Ramalina fraxinea* L. (T. 1788).
- 119. *Ramalina calicaris* L. (T. 1788).
- 120. *Ramalina farinacea* L. (T. 1788).
- 121. *Cornicularia aculeata* Schreb. (T. 1788).
- 122. *Bryopogon jubatus* L. (T. 1788).
- 123. *Usnea barbata* L. (T. 1788).
- 124. *Usnea florida* L. (T. 1788).

VIII. Fungi.

(Geordnet nach *Nabenhorst* 1844.)

Anm. Aus dieser Classe sind in neuerer Zeit nur einige Familien genauer durchforscht und von Dr. Fiedler (vergl. S. 154) bearbeitet worden, nämlich die Familien 153 und 160 ff.; die Kenntniß der übrigen läßt noch sehr viel zu wünschen übrig. — Hinsichtlich der Standorte muß ich der Raumersparniß wegen auf die Quellschriften und auf *Nabenhorst's* *Kryptogamen-Flora* verweisen.

Ordo 1. Coniomycetes (Nesselpilze).

153. Uredi-
nel.

- 1. *Rhizosporium Solani* Wal. Rabh. 3. (Boll 1860).
- Uredo utriculosa* Cord. R. 8 (F. 1848).
- U. olivacea* DC. R. 9 (F. 1853).
- U. Caricis* Pers. R. 10. (T. 1848).
- U. sitophila* Ditm. 1812 t. 34. R. 11.
- U. segetum* Pers. R. 12. Ditm. t. 33. (Sch. 1806).
- U. Maydis* DC. R. 14. (F. 1848).
- U. longissima* Sow. R. 18. (F. 1848).
- U. Anemones* Pers. R. 20. (Sch. 1806).
- 10. *U. apiculata* Strauss R. 26. (F. 1848).
- U. Ficariae* Alb. Schw. R. 29. (F. 1848).
- U. Geranii* DC. R. 32. (F. 1848).

13. *Uredo argentatum* Schultz sp. 1806. R. 35. (= *Im-patientis* Rab.).
 - U. appendiculata* Pers. R. 38. (Sch. 1806).
 - U. muricella* Wallr. R. 42. (F. 1848).
 - U. Scrophulariae* Lasch. R. p. 579 (F. 1848).
 - U. suaveolens* Pers. R. 43. (Sch. 1806).
 - U. flosculosorum* Alb. Schw. R. 44. (Sch. 1806).
 - U. formosa* Rab. 45. (F. 1848).
20. *U. Polygonorum* DC. R. 47. (F. 1848).
 - U. Rumicum* DC. R. 48. (F. 1848).
 - U. Violarum* DC. R. 49. (F. 1848).
 - U. Betae* Pers. R. 50. (F. 1848).
 - U. Galii* Rab. 53. (F. 1848).
 - U. Armeriae* Dub. R. 61. (F. 1848).
 - U. Leguminosarum* Rab. 62. (Sch. 1806).
 - U. Evonymi* Mart. R. 64. (F. 1848).
 - U. Poterii* R. 67. (F. 1848).
 - U. Lini* DC. R. 68. (F. 1848).
30. *U. Euphorbiae* Pers. R. 70. (Sch. 1806).
 - U. Capracarum* DC. R. 72. (Sch. 1806).
 - U. epitea* Kze. Rab. 73. (F. 1848).
 - U. mixta* Steud. R. 75. (F. 1848).
 - U. gyrosa* Reb. R. 78. (F. 1848).
 - U. populina* Jacq. R. 79. (Sch. 1806).
 - U. Valerianae* DC. R. 80. (F. 1848).
 - U. Pulsatillae* Steud. R. 81. (F. 1860).
 - U. Potentillarum* DC. R. 84. (F. 1848).
 - U. Pyrolae* Schultz sp. 1806 R. 85.
40. *U. Labiatarum* DC. R. 86. (Sch. 1806).
 - U. Alchemillae* Pers. R. 87. (F. 1860).
 - U. Campanularum* Pers. R. 95. (F. 1848).
 - U. Rhinanthacearum* DC. R. 96. (1848).
 - U. Circeae* Alb. Schw. R. 98. (Siems. 1806).
 - U. Caryophyllacearum* Rab. 100. (F. 1848).
 - U. miniata* Pers. R. 102. (F. 1848).

47. *Uredo Ruborum* DC. R. 103. (Sch. 1806).
U. Rosae Pers. R. 104. (Sch. 1806).
U. Hypericorum DC. R. 106. (F. 1848).
50. *U. fulva* Schum. C. 109. (Sch. 1806).
U. Senecionis Schum. R. 110. (F. 1848).
U. Artemisiae Rab. 111. (F. 1848).
U. oblonga R. 113. (F. 1860).
U. linearis Pers. R. 117. (F. 1848).
U. Rubigo-vera DC. R. 118. (F. 1848).
U. candida Pers. R. 123. (Sch. 1806).
Physoderma gibbosum Wallr. R. 125. (F. 1848).
Aecidium Convallariae Schum. R. 145. (F. 1848).
Ae. Compositarum Mart. R. 149. (Sch. 1806).
60. *Ae. rubellatum* Rab. 150. (Sch. 1806).
Ae. Cichoriacearum DC. R. 152. (F. 1848).
Ae. Asperifolii Pers. R. 161. (F. 1848).
Ae. Urticae Schum. R. 162. (F. 1848).
Ae. Grossulariae DC. R. 163. (Sch. 1806).
Ae. Violae Schum. R. 166. (F. 1860).
Ae. Parnassiae Rab. 168. (F. 1848).
Ae. punctatum Pers. R. 169. (Sch. 1806).
Ae. leucospermum DC. R. 170. (Sch. 1806).
Ae. Ranunculacearum DC. R. 181. (F. 1848).
70. *Ae. Periclymeni* DC. R. 182. (F. 1860).
Ae. Euphorbiae Pers. R. 185. (Sch. 1806).
Ae. Leguminosarum Lk. sp. R. 186. (Sch. 1806).
Ae. elongatum Rab. 187. (Sch. 1806).
Ae. Phaseolorum Wallr. R. 189. (F. 1848).
Ae. cornutum Pers. R. 190. (Sch. 1806).
Ae. Scrophularinarum Lsch. R. p. 579 (F. 1848).
Ae. Ari Rudolphi (F. 1848).
Ae. Umbelliferarum Schl. (Sch. 1806 No. 1286).
Ae. Adoxae Grav. (F. 1860).
80. *Ae. Orchidearum* Fied. ed. 1. No. 1690 (1860).
Ae. Sweertiae Ditm. (Siems. 1806).

82. *Roestelia cancellata* L. sp. R. 192. (Sch. 1806).
Peridermium Pini Wallr. R. 193. (Tode 1793).
Puccinia Graminis Pers. R. 198. (Sch. 1806).
P. arundinacea Hedw. R. 199. (F. 1848).
P. Caricis DC. R. 201. (F. 1848).
P. Asparagi DC. R. 204. (F. 1848).
P. Polygonorum Schl. R. 207. (Sch. 1806).
P. Calthae Lk. R. 208. (Sch. 1806).
90. *P. Circaeae* Pers. R. 213. (Sch. 1806).
P. Glechomatis DC. R. 215. (Sch. 1806).
P. Veronicarum DC. R. 216. (F. 1848).
P. Menthae Pers. R. 218. (F. 1848).
P. Compositarum Schl. R. 221. (F. 1848).
P. Discoidearum Lk. R. 222. (F. 1860).
P. Bardanae Corda R. 231. (F. 1848).
P. Tragopoginis Corda R. 232. (F. 1848).
P. Galiorum Lk. R. 235. (F. 1848).
P. Umbelliferarum DC. R. 237. (F. 1848).
100. *P. Aegopodii* Lk. R. 238. (F. 1848).
P. Aethusae Lk. R. 239. (F. 1848).
P. Pimpinellae Lk. R. 240. (F. 1848).
P. Saniculae Rab. ed. 2. No. 350 (F. 1860).
P. Cicutae Lasch. (F. 1848).
P. Adoxae DC. R. 241. (F. 1848).
P. Ribis DC. R. 243. (F. 1848).
P. Epilobii DC. R. 244. (F. 1848).
P. Prunorum Lk. R. 247. (F. 1848).
P. Anemones Pers. R. 248. (Sch. 1806).
10. *P. Noli tangeris* Corda R. 249. (F. 1848).
P. Acerum Lk. R. 250. (Siems. ap. Link 1813).
P. Violarum Lk. R. 251. (F. 1848).
P. Lychnidearum Lk. R. 252. (Sch. 1806).
P. Spergulae Lasch (F. 1860).
P. Stellariae Dub. R. 253. (F. 1848).
Triphragmium Ulmariae Lk. R. 265. (F. 1848).

117. *Sporidesmium atrum* Lk. R. 298. (Lk. 1809).
Phragmidium incrassatum Lk. R. 311. (Sch. 1806).
Ph. asperum Wallr. R. 314. (F. 1848).
20. *Exosporium Tiliae* Lk. R. 317. (Lk. 1809).
Torula expansa Pers. 328. (F. 1860).
T. herbarum Lk. R. 341. (Lk. 1809).
T. aurea Pers. sp. R. 356. (Lk. 1809).
T. heterospora Rab. Herb. 1268. (F. 1860).
T. Casei Corda Rab. ed. 2 No. 674 (F. 1860).
Helicomyces roseus Lk. R. 370. (Dit. 1809 ap. Lk.).
Conoplea hispidula Pers. R. 378. (F. 1860).
Bispora monilioides Rab. 380. (Dit. 1806).
Phragmotrichum Bullaria Corda. R. 387. (F. 1848).
30. *Fusidium griseum* Lk. R. 397. (Dit. 1809; und
1812 t. 17).
F. flavo-virens Ditm. 1812, 18. R. 398.
F. aureum Lk. 1809. R. 404.
F. candidum Lk. 1809. R. 405.
Septoria populi Desmz. Rab. Herb. 1958. (F. 1860).
Melanconium sphaerospermum Pers. sp. R. 421.
(Sch. 1806).
M. glomeratum Lk. 1809 (atrum). R. 438.
Stilbospora angustata Pers. R. 461. (F. 1860).
Sporocadus Fiedleri Rab. Herb. 882. (F. 1860).
Myrothecium inundatum Tode 1790. R. 486. Dit. t. 3.
40. *M. Verrucaria* A. S., R. 487. (Ditm. 1812, 4.).
M. roridum Tode 1790. R. 488.
Fusarium roseum Lk. 1809. R. 498.
F. lateritium Nees. R. 504. (F. 1860).
F. Stilbaster Lk. R. 505. (Dit. 1809, ap. Lk.).
F. Betae Rab. Fungi europ. No. 69. (F. 1860).
Dacryomyces Urticae Pers. sp. R. 517. (Sch. 1806).
D. lacrymalis Pers. sp. R. 519. (Ditm. 1806).
Tubercularia vulgaris Tode 1790. R. 527. (T. 1788).
T. confluens Pers. (F. 1858).

150. *Tubercularia granulata* Pers. (F. 1858).
T. ciliata Ditm. 1812, 14. R. 538.
T. persicina Ditm. 1812, 49. R. 539.
Dermatea carpineae Fr. (Tode 1790).
Ditiola paradoxa Hedw. sp. R. 550. (F. 1858).
D. radicata Fr. (F. 1858).
D. volvata Tode sp. 1790. R. 551.
D. sulcata Tode sp. 1790. R. 552.
Epicoccum versicolor R. 562. (Lk. 1813).
 α . *nigrum* Lk.
 β . *purpurascens* Ehrb. (Fiedl.).

Ordo 2. *Hyphomycetes* (Schimmelpilze).

- Hypha papyracea* Pers. sp. R. 578. (Sch. 1806). ^{155. Byssa-}
60. *Xylostroma corium* R. 580. (Tode 1790). ^{cel.}
Ozonium auricomum Lk. 1809. R. 581.
O. candidum Huds. sp. R. 581. (Sch. 1806).
Dematium nigrum Lk. 1809. R. 601.
Rhizomorpha subcorticalis Pers. R. 611. (Sch. 1806).
R. subterranea Pers. R. 612. (Sch. 1806).
Taphrina populina Schum. sp. R. 618. (Sch. 1806).
Erineum roseum Schultz 1806. R. 621.
E. betulinum Schum. R. 622. (Lk. 1809).
E. populinum Pers. R. 625. (Sch. 1806).
70. *E. alneum* Pers. R. 626. (Sch. 1806).
E. fagineum Pers. R. 627. (Sch. 1806).
E. purpurascens Gärtn. R. 631. (Lk. 1809).
Phyllerium tiliaceum Pers. R. 633. (Sch. 1806).
Ph. pyrinum Pers. sp. R. 638. (Sch. 1806).
Ph. acerinum Pers. sp. R. 639. (Sch. 1806).
Epochnium monilioides Lk. 1809. R. 656. ^{156. Muce-}
Collarium nigrospermum Lk. R. 663. (Siems. ap. ^{dinci.}
 Lk. 1809).
Mycogone rosea Lk. 1809. R. 665.
M. cervina Ditm. 1812, 53. R. 666.

180. *Sepedonium mycophilum* Lk. 1809. R. 667.
Chloridium viride Lk. R. 698. (Ditm. ap. Lk. 1809).
Geotrichum candidum Lk. 1809. R. 720.
Sporotrichum laxum N. E. R. 726. (F. 1860).
Sp. candidum Lk. 1809. R. 727.
Sp. Fiedleri Rab. Herb. N. 1573. (F. 1860).
Sp. densum Lk. R. 735. (Ditm. ap. Lk. 1809).
Sp. griseum Lk. 1809. R. 746.
Sp. luteo-album Lk. 1809. R. 749.
Sp. vitellinum Lk. R. 752. (Siems. 1808).
90. *Sp. aureum* Lk. 1809. R. 754.
Sp. croceum Pers. Lk. sp. R. 756. (Sch. 1806).
Sp. roseum Lk. 1813. R. 757.
Sp. fuscum R. 766. (Lk. 1809).
Sp. virescens Lk. R. 770. (*Medusula labyr.*
Tode 1790).
Sp. olivaceum Pers. sp. R. 772. (Lk. 1809).
Byssocladium fenestrale Roth sp. R. 777. (Ditm.
sp. 1812. t. 1).
Fusisporium aurantiacum Lk. 1809. R. 778.
F. Solani Mast. R. p. 579. (Boll 1860).
Acremonium verticillatum Lk. 1809. R. 796.
200. *A. alternatum* Lk. R. 797. (Ditm. 1809. ap.
Sturm 1812 t. 2).
Trichothecium roseum Lk. 1809. R. 808.
Oidium Fusisporioides Fr. R. 822. (F. 1860).
O. Aceris Rab. Herb. 1892. (F. 1860).
O. Lamii R. l. c. 1777. (F. 1860).
Peronospora Rumicis Corda. R. 830. (F. 1860).
P. Umbelliferarum Rab. Herb. ed. 2. 169. (F. 1860).
Stachylidium terrestre Lk. 1809. R. 832.
St. bicolor Lk. 1809. R. 833.
Monilia digitata Pers. R. 841. (T. 1788).
10. *Penicillium glaucum* Lk. R. 844 (T. 1788).
P. candidum Lk. 1809. R. 845.

212. *Coremium vulgare* Corda. R. 863. (Lk. 1809).
Aspergillus glaucus L. sp. R. 866. (T. 1788).
A. virens Lk. 1809 R. 868.
A. candidus Lk. 1809. R. 871.
A. flavus Lk. 1809. R. 874.
Dactylium nigrum Lk. sp. R. 878. (Ditm. 1809).
D. macrosporum Ditm. sp. 1809 und 1812, 50.
R. 884.
D. dendroides Fr. R. 886. (Ditm. 1812 t. 51).
20. *Botrytis grisea* Lk. 1809. R. 889.
B. vulgaris Lk. 1809. R. 895.
B. umbellata Pers. sp. R. 905. (Lk. ap. Fries 1832).
B. parasitica Pers. R. 907. (Lk. 1809).
B. elegans Lk. 1809. R. 909.
B. densa Ditm. 1812, 52. R. 910.
B. nigra Lk. R. 913. (Ditm. 1809).
B. polyspora Lk. 1809. Ditm. 1812, 35. R. 914.
B. bruneola Rab. ed. 2, 771. (F. 1860).
Acrostalagmus cinnabarinus Corda R. 916. (F. 1860).
30. *Verticillium allochromum* Lk. sp. R. 922. (Ditm. 1809).
Haplotrichum capitatum Lk. 1809. R. 932.
Acladium conspersum Lk. 1809. R. 936.
A. microspermum Lk. 1809. R. 937.
Gonosporium puccinoides Lk. R. 950. (F. 1860).
Arthrimum caricicola Kze. R. 951. (F. 1860).
Rhacodium cellare Pers. R. 959. (Lk. 1809).
Myxotrichum murinum Ditm. sp. 1812, 36. R. 964.
Helminthosporium velutinum Lk. 1809. R. 982.
H. arundinaceum Corda. R. 995. (F. 1860).
40. *Cladosporium herbarum* Lk. R. 1028. (Sch. 1806).
C. epiphyllum Pers. sp. R. 1033. (Sch. 1806).
C. fasciculare Fr. R. 1037. (Sch. 1806).
C. nodulosum Corda. R. 1046. (F. 1860).
Cephalotrichum rigescens Lk. R. 1065. (Ditm. 1809).
Periconia Stemonitis Pers. R. 1071 (Dit. 1806).

157. Mucorini.

246. *Stilbum vulgare* Tode 1790. R. 1093. Dit. t. 58.
St. bulbosum Tode 1790. R. 1094.
St. turbinatum Tode 1790. R. 1097.
St. luteum Pers. R. 1098. (Tode 1790).
50. *St. xanthocephalum* Ditm. 1812, 60. R. 1105.
 (Tode 1790).
St. erythrocephalum Ditm. 1812, 45. R. 1106.
St. rigidum Pers. (Ditm. 1812 t. 59.). R. 1107.
St. pubidum Tode 1790. R. 1109.
St. tomentosum Schrad. R. 1111. (Ditm. 1812, 46).
St. rubicundum Tode 1790. R. 1120.
St. herbarum Rab. ed. 2, 763. (F. 1860).
Ceratium hydroides Alb. Schw. R. 1136. (Lk. 1809).
Epichysium argenteum Tode 1791. R. 1142.
Isaria farinosa Dicks. sp. R. 1155. (Dit. 1812, 54).
60. *I. arachnophila* Ditm. 1812, 55. R. 1156.
I. sphaecophila Ditm. 1812, 57. R. 1159.
I. citrina Pers. R. 1161. (Ditm. 1812, 37).
I. clavata Ditm. 1812, 56. R. 1165.
I. glauca Ditm. 1812, 19. R. 1166.
I. sulphurea Fiedler 1860. Rab. Fung. europ. 60.
Sporodinia grandis Lk. R. 1174. (Ditm. 1809).
Ascophora Mucedo Tode 1790. R. 1177.
A. elegans Lk. sp. R. 1183. (Ditm. 1809).
Mucor Mucedo L. R. 1188. (Sch. 1806).
70. *M. caninus* Pers. R. 1189. (Sch. 1806).
M. minimus Tode sp. 1791. R. 1198.
M. tenellus Tode sp. 1791. R. 1199.
M. stercoreus Tode sp. 1791. R. 1200.
M. fimetarius Lk. 1809. R. 1204.
M. Juglandis Lk. 1809. R. 1207.
M. flavidus Pers. R. 1210. (Ditm. 1806).
Eurotium herbariorum Wig. sp. R. 1214. (Sch. 1806).
Syzygites megalocarpus Ehrb. R. 1220. (Sch. 1806).

279. *Chordostylum capillare* Tode 1790. R. 1228.

80. *Pilobolus crystallinus* Tode 1790. R. 1229.

Ordo 3. *Dermatomyces*.

Depazea juglandina Fr. R. 1240. (F. 1860).

158. *Sphaeriacel.*

D. Ribicola Fr. R. 1244. (F. 1860).

D. Linnaeae Ditm. R. 1249. (v. Kptz. 1806).

D. Brassicaecola Fr. R. 1255. (F. 1860).

D. Calthaecola DC. R. 1261. (F. 1860).

D. vagans Fr. R. 1265. (F. 1860).

D. Lysimachiae Lsch. R. Herb. N. 989. (F. 1860).

D. Aquilegiae R. l. c. N. 1651. (F. 1860).

D. Saponariae DC. R. l. c. N. 1653. (F. 1860).

90. *D. Petroselini* Fiedler 1860.

Leptostroma scirpinum Fr. R. 1273. (F. 1858).

L. Scirpi Rab. 1274 (F. 1858).

L. caricinum Fr. R. 1275. (F. 1858).

L. juncinum Fr. R. 1276. (F. 1858).

L. filicinum Fr. R. 1277 (F. 1858).

L. Spiraeae Fr. R. 1278 (F. 1858).

L. areolatum Lk. R. 1281. (Wust. 1858).

L. herbarum Fr. R. 1282. (F. 1858).

L. hysterioides Fr. R. 1285 (F. 1858).

300. *L. Sedi* Lk. R. 1290. (Wust. 1858).

L. Loniceraecola Rab. (F. 1858).

L. Phragmitis Fr. (F. 1858).

Actinothyrium graminis Kze. R. 1291. (F. 1860).

Labrella Ptarmicis Desmz. R. Herb. 1394. (F. 1860).

Phoma saligna Pers. sp. R. 1296. (Sch. 1806).

P. Pustula Pers. sp. R. 1297. (Sch. 1806).

Ascochyta Heraclei Lib. R. 1318. (F. 1860).

Nemaspora aurea Fr. R. ed. 2. 584. (F. 1860).

Cytispora leucomyxa R. Herb. 1352. (F. 1860).

10. *C. rubescens* Fr. R. 1346. (F. 1860).

Sphaeronema subulatum Tode sp. 1791. R. 1349.

312. *Sphaeronema aciculare* Fr. R. 1351. (Tode 1791).
Sph. Acrospermum Tode sp. 1791. R. 1353.
Sph. conicum Tode sp. 1791. R. 1356.
Sph. cylindricum Tode sp. 1791. R. 1357.
Sph. parabolicum Tode sp. 1791. R. 1358.
Sph. Uredineorum Fiedler 1860. R. Herb. 1659.
Sph. Piceae Fiedl. 1860. R. l. c. 664.
Excipula strigosa Lib. sp. R. 1379. (F. 1860).
20. *Hysterium pulicare* Pers. R. 1393. (Sch. 1806).
H. contortum Ditm. 1812, 32. R. 1396.
H. elongatum Wahlb. R. 1397. (F. 1858).
H. angustatum Pers. R. 1402. (Sch. 1806).
H. lineare Fr. R. 1403 (Wüst. 1858).
H. degenerans Fr. R. 1408. (F. 1858).
H. Fraxini Pers. R. 1409. (F. 1858).
H. conigenum MN. R. 1410. (F. 1858).
 Ann. *H. quercinum* Pers. cf. No. 650.
H. Rubi Pers. R. 1415. (F. 1858).
H. Pinastris Schr. R. 1417. (Sch. 1806).
30. *H. apiculatum* Fr. R. 1428 (F. 1858).
H. herbarum Fr. R. 1430. (F. 1858).
H. commune Fr. R. 1431. (F. 1858).
H. scirpinum Fr. R. 1432. (F. 1858).
H. arundinaceum Schr. R. 1433. (F. 1858).
H. culmigenum Fr. R. 1434. (F. 1858).
H. Taxi Pers. (F. 1858) R. 1448?
Phacidium coronatum Fr. Dit. t. 63. R. 1438 (T. 1788).
Ph. Rubi Fr. 1440. (F. 1858).
Ph. dentatum Schm. R. 1442 (F. 1806).
40. *Ph. Pini* Fr. R. 1450. (F. 1858).
Ph. carbonaceum Fr. R. 1453. (F. 1858).
Ph. pulverulentum Schm. R. 1455. (F. 1858).
Ph. Patella Tode sp. 1791. R. 1457.
Ph. caliciiforme Spr. R. 1459. (F. 1858).
Ph. pityum Fr. R. 1461. (F. 1858).

346. *Phacidium Plinthis* Fr. (F. 1858).
Ph. Buxi Lasch. (F. 1858).
Rhytisma Urticae Fr. R. 1463. (Sch. 1806 No. 1017).
R. punctatum Fr. R. 1465 (F. 1858).
50. *R. acerinum* Fr. R. 1466. (Sch. 1806).
R. confluens Fr. (Wust. 1858).
R. salicinum F. R. 1467 (F. 1858).
R. Andromedae Fr. R. 1468 (Sch. 1806).
R. Euphorbiae Schub. R. 1469 (F. 1858).
R. giganteum Fr. R. 1470 (F. 1858).
R. umbonatum Rab. 1471 (F. 1858).
Actidium hysterioides Fr. R. 1472 (Sch. 1806).
Lophium mytilinum Pers. sp. R. 1473 (Sch. 1806).
Stegilla Ilicis R. 1478 (F. 1858).
60. *Dothidea Ribesia* Pers. sp. R. 1481 (Sch. 1806),
D. Sambuci Pers. sp. R. 1482 (Sch. 1806).
Polystigma rubrum Pers. sp. R. 1503. (Sch. 1806).
P. Ulmi Schultz sp. No. 1190 (1806) R. 1506.
P. Pteridis Reb. sp. R. 1507 (Thede 1806).
Pestalozzia phacidiioides Cesati. R. Herb. 724
(F. 1860).
Sphaeria punctiformis Pers. R. 1514 (Sch. 1806).
S. maculaeformis Pers. R. 1515 (Sch. 1806).
S. alnea Pers. sp. R. 1530 (Sch. 1806).
S. Grossulariae Fr. R. 1531 (F. 1860).
70. *S. Artocreas* Tode 1791 R. 1534.
S. Eryngii Fr. R. 1537 (F. 1860).
S. tubaeformis Tode 1791 R. 1550.
S. Gnomon Tode 1791 R. 1551.
S. setacea Pers. R. 1558 (Sch. 1806).
S. Lingam Tode 1791 R. 1561.
S. Doliolum Pers. R. 1562. (Sch. 1806).
S. pulveracea Ehr. = *mollis* Tode 1791 R. 1563.
S. sanguinea Sibth. R. 1571. (Ditm. 1806).
S. herbarum Pers. R. 1576 (Tode 1791).

380. *Sphaeria acuta* Hoffm. R. 1579. (F. 1851).
S. comata Tode 1791. R. 1581.
S. pulvis pyrius Pers. R. 1585 (Sch. 1806).
S. spermoides Hoffm. R. 1588 (Tode 1793).
S. moriformis Tode 1791 R. 1590.
S. mammaeformis Pers. R. 1592 (Sch. 1806)
S. Bombarda Batsch. R. 1593 (Sch. 1806).
S. mobilis Tode 1791. R. 1599.
S. trichostoma Wallr. R. 1614. (F. 1851).
S. orthoceras Fr. R. 1619 (F. 1860).
90. *S. rubella* Pers. R. 1620 (Tode 1791).
S. foveolaris Fr. R. 1632 (F. 1851).
S. inquinaus Tode 1791 R. 1637.
S. Xylostei Pers. R. 1639 (Sch. 1806).
S. ditopa Fr. R. 1648 (F. 1851).
S. ocellata Fr. R. 1651 (F. 1851).
S. pileata Tode 1791 R. 1660.
S. macrostoma Tode 1791 R. 1663.
S. Arundinis Fr. R. 1667 (F. 1851).
S. rostellata Fr. R. 1678 (F. 1851).
400. *S. stricta* Pers. R. 1683 (Ditm. 1806).
S. rostrata Tode 1791 R. 1684.
S. dryina Pers. R. 1686 (F. 1851).
S. lagenaria Pers. R. 1689 (F. 1851).
S. Trifolii Pers. R. 1694 (Sch. 1806).
S. Podagrariae Roth. R. 1695 (F. 1851).
S. Aegopodii Schultz! 1806. R. p. 580.
S. Asteroma Wallr. R. 1704 (F. 1851).
S. Anemones DC. sp. R. 1705 (F. 1851).
S. frondicola Fr. R. 1706 (Sch. 1806).
10. *S. fimbriata* Pers. R. 1707 (T. 1788).
S. Evonymi Kze. R. 1709 (F. 1851).
S. Graminis Pers. R. 1711 (Sch. 1806).
S. episphaerica Tode 1691. R. 1714.
S. Peziza Tode 1791. R. 1715.

415. *Sphaeria lecanodes* Cesati. R. ed. 2. 525 (F. 1860).
S. Anethi Pers. R. 1724 (F. 1851).
S. nebulosa Pers. R. 1725 (Sch. 1806).
S. longissima Pers. R. 1726. (F. 1851).
S. rudis Fr. R. 1741 (F. 1851).
20. *S. exigua* Fiedler 1860 R. Herb. 970.
 Anm. „*S. exili* A. S. *simillima*, sed differt perithecio globoso, ascis clavatis, sporis ellipticis. — Ad ligna pinea.“ Fiedler.
- S. calva* Tode 1791. R. 1747.
S. pilosa Pers. R. 1750 (Ditm. 1806).
S. hispida Tode 1791. R. 1752.
S. mutabilis Pers. R. 1765 (Ditm. 1812, 64).
S. mucida Fr. R. 1767 (Tode 1791).
S. ovina Pers. R. 1768 (Tode 1791).
S. tristis Tode 1791. R. 1776.
S. byssiseda Tode 1791. R. 1778.
S. Aquila Fr. R. 1779. (Tode 1791).
30. *S. fissa* Pers. (= *Myrothecium dubium* Tode 1790) R. 1791.
S. Spartii NE. R. 1792 (F. 1851).
S. Dulcamarae Schm. R. 1796 (F. 1851).
S. Dothidea Moug. R. 1799 (F. 1851).
S. Berberidis Pers. R. 1807 (F. 1851).
S. Cucurbitula Tode 1791. R. 1810.
S. Laburni Pers. R. 1816 (F. 1851).
S. Coluteae Rab. Herb. 1239 (F. 1860).
S. Pteleae Rab. Herb. 1238 (F. 1860).
S. Ribis Tode 1791 R. 1818.
40. *S. coccinea* Pers. R. 1819 (Tode 1791).
S. cinnabarina Tode 1791. R. 1823.
S. convergens Tode 1791. R. 1825.
S. quaternata Pers. R. 1830 (Sch. 1806).
S. pulchella Pers. R. 1840 (Sch. 1806).
Sphaeria stilbostoma Fr. R. 1845. (Tode 1791).

446. *S. ambiens* Pers. R. 1846 (Tode 1791).
S. salicina Pers. R. 1848 (Tode 1791).
S. deplanata NE. R. 1849 (F. 1860).
S. turgida Pers. R. 1851 (Sch. 1806).
50. *S. tessellata* Pers. R. 1860 (Thede 1806).
S. leucostoma Pers. R. 1874 (Tode 1791).
S. nivea Hoffm. R. 1875 (Tode 1791).
S. Carpinii Pers. R. 1877 (Sch. 1806).
S. Hystrix Tode 1791 R. 1886.
S. ceratosperma Tode 1791. R. 1887.
S. ferruginea Pers. R. 1888 (F. 1851).
S. lata Pers. R. 1897 (Tode 1791).
S. spinosa Pers. R. 1900. (F. 1851).
S. insitiva Tode 1791. R. 1903.
60. *S. quercina* Pers. R. 1906 (Sch. 1806).
S. scabrosa DC. R. 1909. (Ditm. 1808).
S. uda Pers. R. 1910 (Ditm. 1806).
S. flavovirens Pers. R. 1911 (Sch. 1806).
S. disciformis Hoffm. R. 1915 (Sch. 1806).
S. Stigma Hoffm. R. 1917 (Sch. 1806).
S. bullata Ehr. R. 1919 (Tode 1791).
S. lenta Tode 1791. R. 1920.
S. succenturiata Tode 1791. R. 1923.
S. nummularia DC. R. 1924 (Tode 1791).
70. *S. deusta* Hoffm. R. 1927 (Tode 1791).
S. incrustans Pers. R. 1928 (Sch. 1806).
S. confluens Tode 1791. R. 1930.
S. rubiginosa Pers.? Tode 1791. R. 1934.
S. rosea Pers. R. 1939 (Ditm. 1808).
S. gelatinosa Tode 1791. R. 1944.
S. multiformis Fr. R. 1946. (F. 1851).
S. cohaerens Pers. R. 1948 (Sch. 1806).
S. fusca Pers. R. 1949 (Sch. 1806).
S. fragiformis Pers. R. 1952 (Tode 1791).
480. *S. concentrica* Bolt. R. 1953 (T. 1788).

481. *Sphaeria Delphinii* Rab. Herb. 747 (F. 1860).
S. Carduorum Wallr. R. l. c. 1560 (F. 1860).
S. Racodium Pers. R. l. c. ed. 2. 649 (F. 1860).
Hypoxylon vulgare Lk. R. 1954 (Sch. 1806).
H. polymorphum Pers. sp. R. 1956. (Sch. 1806).
H. carpophilum Pers. sp. R. 1958 (Sch. 1806).
Poronia punctata L. sp. R. 1961 (T. 1788).
Cordyceps ophioglossoides Ehr. sp. R. 1965
 (Sch. 1806).
Illosporium roseum Fr. R. 1967 (Sch. 1806).
 90. *Perisporium populinum* Pers. sp. R. 1992 (Sch. 1806).
Erysibe macularis Schl. R. 2011. (T. 1788).
E. holosericea Lk. R. 2014. (F. 1860).
E. lamprocarpa Lk. R. 2016 (F. 1860).
E. communis Lk. R. 2019 (F. 1851).
E. lenticularis Wallr. sp. R. 2020 (F. 1860).
E. guttata Lk. R. 2021 (Sch. 1806).
E. horridula Wallr. sp. R. 2025 (F. 1860).
E. adunca Wallr. sp. R. 2026 (F. 1860).
E. penicillata Wallr. sp. R. 2027 (F. 1860).
 500. *E. tridactyla* Wallr. R. 2030 (F. 1860).
Antennataria cellaris Fr. R. 2034 (Sch. 1806).
Sclerotium Clavus DC. R. 2037 (F. 1851).
S. Pustula DC. R. 2039 (Sch. 1806).
S. immersum Tode 1790 R. 2058.
S. muscorum Pers. R. 2065 (Tode 1790).
S. truncorum Fr. R. 2066 (Tode 1790).
S. fungorum Pers. R. 2067 (Sch. 1806).
S. Semen Tode 1790 R. 2077.
S. complanatum Tode 1790. R. 2080.
 10. *S. aurantiaco-fuscum* Rab. Herb. 936 (F. 1860).
S. populinum Pers. R. l. c. ed. 2. 494. (F. 1860).
S. calathiforme Lk. 1813 p. 45.

159. Lycoperdacei.

Num. „Flavicans, durum, hinc convexum, inde excavatum. In superficie terrae tanta copia et tam subito

saepe provenit in Ducatu Megapolitano, ut crediderint semina e coelo delapsa. Interior compages vesiculosa seminum contextum vesiculosum non male refert. Aestate praesertim pluviosa provenit.“

513. *Acrospermum*: pyramidale Tode 1790. R. 2084.
A. compressum Tode 1790. R. 2088.
A. graminum Lib. R. 2090 (F. 1860).
Anixia glabra Fr. R. 2091 (Tode 1790).
Endogone pisiforme Lk. 1809. R. 2094.
Tuber cibarium Sib.? R. 2103 (Boll 1860: foff auf dem Sonnenberge bei Parchim gefunden sein).
Spumaria alba DC. R. 2131 (Sch. 1806).
20. *Aethalium septicum* L. sp. R. 2133 (T. 1788).
Reticularia maxima Fr. R. 2135 (Lk. 1809).
R. umbrina Fr. R. 2137 (Ditm. 1808 u. 1817, 38).
R. muscorum AS. sp. R. 2140 (Ditm. 1809).
Lycogala epidendron Buxb. sp. R. 2145. (T. 1788).
Arcyria ochroleuca Trentep. sp. R. 2149 (Ditm. 1817, 8).
A. nutans Bull. sp. R. 2151 (Sch. 1806).
A. cinerea Pers. R. 2153 (Sch. 1806).
A. incarnata Pers. R. 2157 Ditm. t. 44. (Sch. 1806).
A. punicea Pers. R. 2159 (T. 1788).
30. *Trichia varia* Pers. R. 2162 (Sch. 1806).
T. circumscissa Wallr. R. 2163 (F. 1860).
T. chrysosperma Bull. R. 2164 (T. 1788).
T. clavata Pers. R. 2168 Ditm. t. 25. (Sch. 1806).
T. fallax Pers. R. 2169 (Ditm. 1806).
T. pyriformis Hoff. R. 2172 (Ditm. 1806).
T. rubiformis Pers. R. 2173 (T. 1788).
Perichaena strobilina AS. sp. R. 2176. (Ditm. 1817, 20).
Licea contorta Ditm. sp. 1817, 5. R. 2189.
L. variabilis Schr. R. 2192 (Thede 1806).
40. *Tubulina cylindrica* DC. R. 2193 (Sch. 1806).

541. *Dictydium umbilicatum* Schr. R. 2205 (Sch. 1806).
D. trichioides Bull. sp. R. 2207 (Sch. 1806).
Stemonitis fusca Roth. R. 2211 (T. 1788).
St. typhoides Bull. sp. R. 2213 (Sch. 1806).
St. ovata Pers. R. 2216 (T. 1788).
Diachea elegans Trent. sp. R. 2223 (Dit. 1806).
Cupularia leucocephala Pers. sp. R. 2224 (Ditm. 1817, 11.).
Craterium pedunculatum Trent. R. 2227 Dit. t. 9. (Lk. 1809).
C. pyriforme Ditm. 1817, 10. R. 2228.
50. *Physarum album* Fr. R. 2234 (F. 1860).
Ph. sinuosum Bull. sp. R. 2237 (Ditm. 1808).
Ph. conglobatum Ditm. 1817, 40. R. 2240.
Ph. virescens Ditm. 1817, 61. R. 2241.
Ph. bullatum Ditm. 1817, 22. R. 2257.
Ph. psittacinum Ditm. 1817, 62. R. 2258.
Ph. alatum Trentepohl 1800? R. 2262.
Ph. sulcatum Lk. 1809. R. 2263.
Ph. aureum Pers. R. 2267. (Ditm. 1817, 23).
Ph. nutans Pers. R. 2268. Ditm. t. 24 u. 41 (Lk. 1809).
60. *Cionium farinaceum* Lk. 1809. R. 2269.
C. xanthopus Dit. 1817, 43. R. 2270.
C. Iridis Lk. 1809. R. 2271. Dit. t. 7.
Didymium cinereum Pers. sp. R. 2273 (Sch. 1806).
D. rufipes Fr. R. 2281 (Sch. 1806).
D. farinaceum Pers. sp. R. 2287 (Sch. 1806).
D. nigripes Lk. sp. 1809. R. 2288. Dit. t. 42.
D. leucopus Lk. sp. 1809. R. 2291.
Diderma muscicola Lk. 1809. R. 2292.
D. contextum Pers. R. 2294 (Dit. 1817, 39).
70. *D. ochraceum* Hoffm. R. 2295 (Sch. 1806).
D. globosum Pers. R. 2305 (Ditm. 1817, 6).
Leocarpus vernicosus Pers. sp. R. 2312 (Sch. 1806).
L. spermoides Lk. 1809. R. 2313.

574. *Leocarpus calcareus* Lk. R. 2314 (Dit. 1809).
L. cyanescens Fr. R. Herb. 992 (F. 1860).
Leangium floriforme Pers. sp. R. 2315 (Lk. 1809).
L. stellare Pers. sp. R. 2316 (Dit. 1806).
L. lepidotum Ditm. 1817, 21. R. 2318.
Aegerita candida Pers. R. 2321 (Lk. 1809).
80. *Trichoderma viridis* Pers. R. 2328 (Tode 1790).
T. dubium AS. R. 2330 (Tode 1790).
Hyphelia terrestris Fr. R. 2332 (F. 1860).
Onygena equina Pers. R. 2338 (Sch. 1806).
O. corvina AS. R. 2339 (Dit. 1817, 12).
Asterophora agaricoides Fr. R. 2341 (Dit. 1817, 26).
Elaphomyces granulatus NE. R. 2346 (T. 1788).
Scleroderma vulgare Fr. R. 2370. (Sch. 1806).
Tulostoma mammosum Fr. R. 2376 (Lk. 1795).
T. fimbriatum Fr. R. 2378. (Sch. 1806).
90. *Lycoperdon pyriforme* Schäf. R. 2381 (Sch. 1806).
L. gemmatum Batsch. R. 2382 (T. 1788).
L. Bovista L. R. 2385 (Sch. 1806).
Bovista plumbea Pers. R. 2388 (Lk. 1809).
B. nigrescens Pers. R. 2390 (Sch. 1806).
Geaster rufescens Pers. sp. R. 2393 (Sch. 1806).
G. fimbriatus Batsch sp. R. 2396 (Lk. 1795).
G. striatus Fr. R. 2398 (Lk. 1832? pr. Rostock).
Sphaerobolus stellatus Tode 1790. (R. 2400).
Thelebolus stercoreus Tode 1790. R. 2403.
600. *Polyangium vitellinum* Lk. R. 2405 (Dit. 1809;
 1817, 27).
Cyathus Crucibulum Hoffm. R. 2411 (T. 1788).
C. Olla Pers. R. 2412 (T. 1788).
C. striatus W. R. 2413 (T. 1788).
Phallus impudicus L. R. 2415 (Sch. 1806).
Ph. caninus Huds. R. 2416 (Tode 1792 semel
 tantum lectum!)
Pyrenium terrestre Tode 1790. R. 2427.

607. *Tremella sarcoides* With. R. 2435 (Tode 1790).
Exidia repanda Fr. R. 2446 (F. 1855).
E. glandulosa Fr. R. 2449 (T. 1788).
10. *E. recisa* Fr. R. 2451 (Dit. 1808 u. 1817 t. 13).
E. Auricula Judae Fr. R. 2452 (Sch. 1806).
Cyphella muscigena Fr. R. 2457 (F. 1855).
Helotium glabrum Tode 1790. R. 2461.
H. hirsutum Tode 1790. R. 2462.
Pistillaria pusilla Fr. R. 2464 (F. 1855).
P. ovata Fr. R. 2466 (F. 1855).
P. quisquiliaris Fr. R. 2467 (F. 1855).
P. culmigena Fr. R. 2468 (F. 1855).
P. coccinea Fr. R. 2469 (F. 1855).
20. *P. micans* Fr. R. 2470 (F. 1855).
Typhula Todei Fr. R. 2472 (Tode 1790).
Calocera cornea Fr. R. 2483 (T. 1788).
C. viscosa Fr. R. 2485 (Boll 1845!).
Clavaria contorta Holms. R. 2494 (F. 1855).
C. Lingula Schaef. R. 2495 (Lk. 1795).
C. pistillaris L. R. 2496 (T. 1788).
C. fragilis Holms. R. 2501 (F. 1855).
C. inaequalis Mull. R. 2504 (F. 1855).
C. formosa Pers. R. 2522 (Ditm. 1806).
30. *C. rugosa* Bull. R. 2531 (Ditm. 1809).
C. cristata Pers. R. 2532 (F. 1855).
C. coralloides L. R. 2534 (T. 1788).
C. muscoides L. R. 2536 (T. 1788).
C. fastigiata L. R. 2537 (T. 1788).
C. amethystina Bull. R. 2538 (F. 1855).
C. flava Pers. R. 2540 (Lk. 1795).
Geoglossum carneum Schultz 1806. R. 2541.
G. hirsutum Pers. R. 2544 (Sch. 1806).
G. viride Pers. Ditm. t. 48. R. 2550 (Sch. 1806).
40. *Mitrula paludosa* Fr. R. 2552 (F. 1858).
M. cucullata Fr. R. 2553 (Thede 1806).

161. *Clavari-*
aceae.

162. Helvel-
lacc.

642. *Spathulea flavida* Fr. R. 2554 (F. 1858).
Sparassis crispa Fr. R. 2555 (Sch. 1806).
Stictis versicolor Fr. R. 2557 (F. 1858).
St. radiata Fr. R. 2567 (Tode 1790).
St. arundinacea Pers. R. 2569 (F. 1858).
St. Lecanora Fr. R. 2572 (F. 1858).
St. longa Reb. 2574 (Sch. 1806).
St. Tiliae Lasch (F. 1858).
50. *Cenangium ferruginosum* Fr. R. 2575 (F. 1858).
C. quercinum Fr. R. 1411 (Tode 1791).
C. Urceolus Fr. R. 2576 (F. 1858).
C. Aucupariae Fr. R. 2580 (Tode 1791).
C. Prunastri Fr. R. 2581 (F. 1858).
C. Ribis Fr. R. 2583 (Sch. 1806).
C. Populi Lasch (F. 1858).
Tympanis conspersa Fr. R. 2585 (Tode 1791
Sphaeria fissivela).
T. cupularis Wallr. R. 2586 (Tode 1791).
T. saligna Tode 1790. R. 2587.
60. *T. obtexta* Wallr. R. 2596 (F. 1860).
T. viticola Schw. R. Herb. 139 (F. 1860).
Volutella volvata Tode 1790 R. 2602.
Bulgaria sarcoides Fr. R. 2604 (Sch. 1806).
B. inquinans Fr. 2606 (T. 1788).
Ascobolus furfuraceus Pers. R. 2619 (Ditm. 1806).
A. denudatus Fr. R. 2620 (Tode 1790).
Lecanidion atrum R. 2623 (F. 1858).
Peziza fimetaria Fr. R. 2626. (F. 1858).
P. acicularis Fr. R. 2628 (Ditm. 1806).
70. *P. aurea* Fr. R. 2629 (F. 1858).
P. epiblastematica Wallr. R. 2632 (F. 1858).
P. Artemisiae Lasch. R. 2636 (F. 1858).
P. atrata Pers. R. 2651 (F. 1858).
P. Pteridis Alb. Schw. R. 2662 (Thede 1806).
P. lacustris Fr. R. 2663 (F. 1858).

676. *Peziza cinerea* Batsch. R. 2664 (F. 1858).
P. uda Pers. 2665 (Ditm. 1806).
P. chrysocoma Bull. R. 2671 (F. 1858).
P. Ulmariae Lasch (F. 1858).
80. *P. epiphylla* Pers. R. 2677 (F. 1858).
P. faginea Pers. R. 2678 (F. 1858).
P. Humuli Lasch (F. 1858).
P. herbarum Pers. R. 2679 (F. 1858).
P. salicella Fr. R. 2686 (F. 1858).
P. lenticularis Bull. R. 2688 (Sch. 1806).
P. chionea Fr. R. 2690 (F. 1858).
P. citrina Batsch. R. 2692 (T. 1788).
P. aeruginosa Pers. R. 2694 (Ditm. 1806).
P. Calyculis Sow. R. 2697 (T. 1788).
90. *P. Volutella* Fr. R. 2701 (Tode 1790).
P. cyathoidea Bull. R. 2705 (F. 1858).
P. Capula Act. Hafn. R. 2706 (F. 1858).
P. striata Nees. R. 2708 (F. 1858).
P. Personii Moug. R. 2715 (F. 1858).
P. coronata Bull. R. 2718 (F. 1858).
P. fructigena Bull. R. 2721 (F. 1858).
P. Lonicerae Alb. Schw. R. 2724 (F. 1858).
P. Pinicola Reb. R. 2732 (W. 1858).
P. sanguinea Pers. R. 2741 (Schultz 1806 N. 1500).
700. *P. Kneiffii* Wallr. R. 2744 (F. 1858).
P. caesia Pers. R. 2746 (Ditm. 1817. 31).
P. fibrillosa Wallr. R. 2747. (F. 1858).
P. poriaeformis DC. R. 2749 (F. 1858).
P. anomala Pers. R. 2750 (F. 1858).
P. punctiformis Fr. R. 2753 (F. 1858).
P. Arundinis Fr. R. 2754 (F. 1858).
P. sulphurea Pers. R. 2757 (Sch. 1806).
P. aterrima Lasch. R. 2763 (W. 1858).
P. pineti Batsch. R. 2765 (W. 1858).
10. *P. flavo-fuliginea* Alb. Schw. R. 2768 (Ditm. 1809).

711. *Peziza rufo-olivacea* Alb. Schw. R. 2769 (W. 1858).
P. hispidula Schr. R. 2773 (F. 1858).
P. flammea Alb. Schw. R. 2774 (Wüst. 1858).
P. corticalis Pers. R. 2775 (F. 1858).
P. sphaerocephala Wallr. R. 2783 (F. 1858).
P. caulicola Fr. R. 2784 (F. 1858).
P. clandestina Bull. R. 2785 (F. 1858).
P. sericea Alb. Schw. R. 2788 (Wüst. 1858).
P. cerina Pers. R. 2789 (Wüst. 1858).
20. *P. bicolor* Bull. R. 2790 (F. 1858).
P. calycina Schum. R. 2791 (Sch. 1806).
P. nivea Fr. R. 2794 (Link 1795).
P. virginea Batsch. R. 2796 (Sch. 1806).
P. ciliaris Schr. R. 2797 (F. 1858).
P. stercorea Pers. R. 2802 (Sch. 1806).
P. scutellata L. R. 2805 (T. 1788).
P. umbrosa L. R. 2807 (F. 1858).
P. hemisphaerica Wig. R. 2815 (Tode 1790?).
P. fusco-atra Reb. R. 2817 (Sch. 1806).
30. *P. coccinea* Jacq. R. 2821 (T. 1788).
P. leucoloma Rehb. R. 2840 (Sch. 1806).
P. cupularis L. R. 2855 (Link 1795).
P. tuberosa Bull. R. 2863 (T. 1788).
P. macropus Pers. R. 2866 (Sch. 1806).
P. vesiculosa Bull. R. 2873 (T. 1788).
P. Marsupium Pers. R. 2874 (A. Brück. 1858).
P. repanda Wahl. R. 2876 (F. 1858).
P. cochleata Huds. R. 2878 (Link 1795).
P. aurantia Oed. R. 2879 (Sch. 1806).
40. *P. onotica* Pers. R. 2880 (Ditm. 1817 t. 16).
P. leporina Batsch. R. 2881 (L. Sch. 1777).
P. abietina Pers. R. 2883 (Ditm. 1808).
P. Acetabulum L. R. 2889 (T. 1788).
Leotia lubrica Pers. R. 2892 (Ditm. 1808).
Verpa conica Sw. R. 2895 (T. 1788).

746. *Helvella esculenta* Pers. R. 2911 (F. 1858).
H. lacunosa Afz. R. 2913 (L. Sch. 1777).
H. crispa Fr. R. 2914 (A. Brück. 1858).
H. sulcata Afz. (Lk. 1795).
50. *Morchella esculenta* Pers. R. 2915 (L. Sch. 1777).
 Bergl. S. 112.
- Phlebia merismoides* Fr. R. 2932 (F. 1855). 163. *Pileati*.
Thelephora calcea Pers. R. 2934 (Sch. 1806 N. 1499).
Th. comedens Fr. R. 2938 (F. 1855).
Th. incarnata Pers. R. 2945 (F. 1855).
Th. cinerea Pers. R. 2946 (F. 1855).
Th. quercina Pers. R. 2947 (Sch. 1806).
Th. cinnamomea Pers. R. 2953 (F. 1855).
Th. sulphurea Fr. R. 2954 (Sch. 1806).
Th. radiosa Fr. R. 2959 (F. 1855).
60. *Th. lactea* Fr. R. 2960 (Sch. 1806).
Th. gigantea Fr. R. 2961 (F. 1855).
Th. aurea Schaef. (A. Brück. 1858).
Th. mesenterica Pers. R. 2970 (T. 1788).
Th. Pini Fr. R. 2976 (F. 1858).
Th. rugosa Pers. R. 2978 (F. 1858).
Th. tabacina Fr. R. 2984 (F. 1855).
Th. rubiginosa Schr. R. 2985 (F. 1855).
Th. sanguinolenta Alb. Schw. R. 2987 (F. 1855).
Th. spadicea Pers. R. 2988 (F. 1855).
70. *Th. hirsuta* Willd. R. 2989 (Lk. 1795).
Th. purpurea Schum. R. 2990 (Sch. 1806 N. 1498).
Th. ferruginea Pers. R. 2995 (Sch. 1806).
Th. chalybaea Pers. R. 2996 (F. 1855).
Th. domestica Fr. R. 2997 (Sch. 1806).
Th. puteanea Schum. R. 3001 (F. 1855).
Th. laciniata Pers. R. 3007 (T. 1788).
Th. terrestris Ehr. R. 3011 (F. 1855).
Th. caryophyllea Pers. R. 3014 (F. 1855).
Th. radiata Fl. D. R. 3016 (F. 1855).

780. *Craterellus cornucopioides* Fr. R. 3021 (T. 1788).
Grandinia crustosa Fr. R. 3023 (F. 1855).
Radulum fagineum Fr. R. 3028 (Sch. 1806).
R. quercinum Fr. R. 3031 (Sch. 1806).
R. orbiculare Fr. R. 3032 (F. 1855).
Jrpex fusco-violaceus Fr. R. 3040 (F. 1858).
Hydnum mucidum Pers. R. 3052 (F. 1855).
H. macrodon Pers. R. 3055 (F. 1855).
H. cirrhatum Pers. R. 3066 (Sch. 1806).
H. gelatinosum L. R. 3067 (T. 1788).
90. *H. Erinaceus* Bull. R. 3068 (Dr. A. Brück. 1855).
H. coralloides Scop. R. 3069 (G. Brück. 1855).
H. Auriscalpium L. R. 3070 (T. 1788).
H. tomentosum L. R. 3072 (F. 1855).
H. connatum Schultz 1806. R. 3075.
H. ferrugineum Fr. R. 3081 (F. 1855).
H. compactum Pers. R. 3083 (F. 1855).
H. repandum L. R. 3088 (T. 1788).
H. laevigatum Sw. R. 3090 (Sch. 1806).
H. imbricatum L. R. 3093 (T. 1788).
800. *Fistulina hepatica* Fr. R. 3094 (T. 1788).
Merulius lacrymans Schum. R. 3099 (Tode 1790?)
M. serpens Tode 1790? R. 3100.
M. Corium Fr. R. 3105 (F. 1855).
M. tremellosus Schr. R. 3106 (F. 1855).
Daedalea unicolor Fr. R. 3108 (Sch. 1806).
D. quercina Pers. R. 3109 (T. 1788).
Trametes gibbosa Fr. R. 3110 (F. 1855).
Tr. suaveolens Fr. R. 3113 (T. 1788). ♂. 126.
Polyporus reticulatus NE. R. 3116 (F. 1855).
10. *P. vaporarius* Fr. R. 3118 (F. 1855).
P. Radula Fr. R. 3119 (F. 1855).
P. sanguinolentus Fr. R. 3120 (W. 1855).
P. obducens Fr. R. 3125 (F. 1855).
P. mucidus Fr. R. 3127 (W. 1855).

815. *Polyporus Medulla panis* Fr. R. 3128 (T. 1788).
P. micans Fr. R. 3129 (F. 1855).
P. violaceus Fr. R. 3130 (F. 1855).
P. rufus Fr. R. 3132 (F. 1855).
P. contiguus Fr. R. 3135 (Sch. 1806).
20. *P. abietinus* Fr. R. 3138 (T. 1788).
P. versicolor Fr. R. 3140 (T. 1788).
P. velutinus Fr. R. 3142 (W. 1855).
P. hirsutus Fr. R. 3143 (Link 1795).
P. radiatus Fr. R. 3149 (W. 1855).
P. marginatus Fr. R. 3159 (Sch. 1806).
P. salicinus Fr. R. 3162 (F. 1855).
P. conchatus Fr. R. 3163 (F. 1855).
P. Ribis Fr. R. 3164 (W. 1855).
P. fulvus Fr. R. 3165 (Sch. 1806).
30. *P. ignarius* Fr. R. 3166 (T. 1788).
P. nigricans Fr. R. 3167 (Siemerling 1858).
P. fomentarius Fr. R. 3168 (T. 1788). S. 126.
P. appplanatus Fr. R. 3169 (F. 1855).
P. betulinus Fr. R. 3171 (Sch. 1806).
P. hispidus Fr. R. 3178 (F. 1855).
P. amorphus Fr. R. 3179 (W. 1855).
P. adustus Fr. R. 3182 (F. 1855).
P. fumosus Fr. R. 3183 (F. 1855).
P. rutilans Fr. R. 3184 (Sch. 1806).
40. *P. destructor* Fr. R. 3187 (F. 1855).
P. alligatus Fr. R. 3196 (F. 1855).
P. sulphureus Fr. R. 3198 (F. 1855).
P. giganteus Fr. R. 3200 (Sch. 1806).
P. cristatus Fr. R. 3203 (F. 1855).
P. frondosus Fr. R. 3205 (F. 1855).
P. umbellatus Fr. R. 3206 (Sch. 1806).
P. lucidus Fr. R. 3207 (T. 1788).
P. varius Fr. R. 3210 (T. 1788).
P. Michelii Fr. R. 3215 (F. 1855).

850. *Polyporus squamosus* Fr. R. 3217 (T. 1788).
P. pictus Fr. R. 3219 (Sch. 1806).
P. perennis Fr. R. 3220 (T. 1788).
P. leptcephalus Fr. R. 3223 (Sch. 1806).
P. brumalis Fr. R. 3226 (F. 1855).
Boletus cyanescens Bull. R. 3236. (F. 1855).
B. scaber Bull. R. 3238. (Sch. 1806).
B. edulis Bull. R. 3243. (G. Brück. 1849).
B. luridus Schaef. R. 3246. (F. 1855).
B. pachypus Fr. R. 3250. (F. 1855).
60. *B. subtomentosus* L. R. 3255. (Link 1795).
B. variegatus Fr. R. 3257. (F. 1855).
B. piperatus Bull. R. 3260. (Dit. 1806).
B. bovinus L. R. 3264. (T. 1788).
B. luteus L. R. 3267. (T. 1788).
Lenzites sepiaria Fr. R. 3270. (Sch. 1806).
L. trabea Fr. R. 3271. (W. 1855).
L. betulina Fr. R. 3273 (F. 1855).
Schizophyllum commune Fr. R. 3274 (T. 1788).
Cantharellus crispus Fr. R. 3275 (Sch. 1806).
70. *C. lobatus* Fr. R. 3278 (F. 1855).
C. retirugus Fr. R. 3279 (F. 1855).
C. muscigenus Fr. R. 3283 (Sch. 1806).
C. cinereus Fr. R. 3284 (Dr. A. Brück. 1858).
C. lutescens Fr. R. 3286 (W. 1855).
C. tubaeformis Bull. sp. R. 3287 (Ditm. 1806 und 1817 t. 30).
C. umbonatus Fr. R. 3289 (F. 1855).
C. aurantiacus Fr. R. 3290 (Sch. 1806).
C. cibarius Fr. R. 3291 (T. 1788).
Nyctalis asterophora Fr. R. 3292 (Ditm. 1806).
80. *Russula alutacea* Pers. R. 3298 (F. 1855).
R. emetica Fr. R. 3307 (T. 1788).
R. virescens Pers. R. 3310 (Ditm. 1817 t. 47).
R. adusta Pers. R. 3318 (Sch. 1806).

884. *Gomphidius glutinosus* Fr. R. 3320 (Link 1795).
Rhymovis pannoides Fr. R. 3322 (F. 1855).
R. atro-tomentosa Fr. R. 3323 (Sch. 1806).
R. involuta Fr. R. 3324 (Link 1795).
Agaricus domesticus Pers. R. 3329 (Lk. 1795).
A. radiatus Bolt. R. 3330 (Dit. 1808).
90. *A. narcoticus* Batsch. R. 3331 (T. 1788).
A. deliquescens Bull. R. 3335 (F. 1858).
A. papillatus Batsch. R. 3337 (Lk. 1795).
A. micaceus Bull. R. 3339 (Sch. 1806).
A. fimetarius L. R. 3341 (T. 1788).
A. atramentarius Bull. R. 3346 (Sch. 1806).
A. comatus Müll. R. 3348 (Sch. 1806).
A. disseminatus Pers. R. 3349 (Sch. 1806).
A. papilionaceus Bull. R. 3362 (Sch. 1806).
A. campanulatus L. R. 3363 (T. 1788).
900. *A. titubans* Bull. R. 3366 (Sch. 1806).
A. spadiceo-griseus Schäf. R. 3375 (Sch. 1806).
A. callosus Fr. R. 3381 (Sch. 1806).
A. fascicularis Huds. R. 3399 (T. 1788).
A. lateritius Batsch. R. 3401 (Sch. 1806).
A. semiglobatus Batsch. R. 3403 (Sch. 1806).
A. stercorarius Schum. R. 3404 (A. Brück. 1858).
A. squamosus Pers. R. 3405 (Lk. 1795).
A. aeruginosus Curt. R. 3407 (F. 1855).
A. arvensis Schäf. R. 3414 (Lk. 1795).
10. *A. campestris* L. R. 3415 (T. 1788). ☉. 112.
A. depluens Batsch. R. 3419 (Sch. 1806).
A. variabilis Pers. R. 3420 (Sch. 1806).
A. mollis Schäf. R. 3424 (Lk. 1795).
A. Hypnorum Bat. R. 3430 (Sch. 1806).
A. tener Schäf. R. 3436 (Dit. 1808).
A. carbonarius Fr.? R. 3468 (Lk. 1795).
A. fastibilis Pers. R. 3484 (Sch. 1806).
A. geophyllus Bull. R. 3488 (Ditm. 1806).

919. *Agaricus rimosus* Bull. 3491 (Sch. 1806).
20. *A. mutabilis* Schäf. R. 3502 (Lk. 1795).
A. adiposus Bat. R. 3508 (F. 1855).
A. squarrosus Müll. R. 3511 (T. 1788).
A. radicosus Bull. R. 3513 (Lk. 1795).
A. praecox Pers. R. 3514 (F. 1855).
A. castaneus Bull. R. 3526 (W. 1855).
A. bulbosus Sow.? R. 3546 (Dit. 1806).
A. bivelus Fr. R. 3547 (Dit. 1808).
A. cinnamomeus L. R. 3552 (T. 1788).
A. violaceus L. R. 3568 (T. 1788).
30. *A. fulgens* A. Schw. R. 3585 (F. 1855).
A. euchrous Pers. R. 3619 (Dit. 1806).
A. clypeatus L. R. 3636 (T. 1788).
A. phlebophorus Dit. 1817 t. 15. R. 3642.
A. nanus Pers. R. 3646 (F. 1858).
A. cervinus Schäf. R. 3652. Dit. t. 28 (Lk. 1795).
A. volvaceus Bull. R. 3656 (Wüst. 1855).
A. applicatus Bat. R. 3662 (T. 1788).
A. nidulans Pers. R. 3667 (T. 1855).
A. mitis Pers. R. 3672 (Sch. 1806).
40. *A. stypticus* Bull. R. 3673 (T. 1788).
A. serotinus Pers. R. 3674 (F. 1855).
A. petaloides Bull. R. 3675 (F. 1855).
A. conchatus Bull. R. 3676 (T. 1788).
A. ulmarius Bull. R. 3686 (Wüst. 1855).
A. tigrinus Bull. R. 3692 (F. Koch 1858).
A. umbelliferus L. R. 3701 (T. 1788).
A. pyxidatus Bull. R. 3706 (F. 1855).
A. corticola Pers. R. 3715 (Sch. 1806).
A. stylobates Pers. R. 3720 (Dit. 1817 t. 29).
50. *A. citrinellus* Pers. R. 3722 (Sch. 1806).
A. vulgaris Pers. R. 3723 (Sch. 1806).
A. alliaceus Jacq. R. 3732 (T. 1788).
A. atro-albus Bolt. R. 3741 (Sch. 1806).

954. *Agaricus galericulatus* Scop. R. 3743 (F. 1855).
A. lacteus Pers. R. 3749 (Lk. 1795).
A. rosellus Fr. R. 3757 (Sch. 1806).
A. epiphyllus Pers. R. 3763 (Sch. 1806).
A. perforans Hoffm. R. 3764 (Wüst. 1855).
A. Rotula Scop. R. 3765 (Sch. 1806).
60. *A. androsaceus* L. R. 3766 (T. 1788).
A. ramealis Bull. R. 3769 (Sch. 1806).
A. scorodonius Fr. R. 3771 (W. 1855).
A. Clavus L. R. 3779 (T. 1788).
A. dryophilus Bull. R. 3781 (Sch. 1806).
A. oreades Bolt. R. 3790 (F. 1855).
A. tuberosus Bull. R. 3798 (Sch. 1806).
A. confluens Pers. R. 3802 (Sch. 1806).
A. velutipes Curt. R. 3804 (Sch. 1806).
A. radicans Relh. R. 3812 (F. 1855).
70. *A. laccatus* Scop. R. 3813 (Lk. 1795).
A. gibbus Pers. R. 3828 (Dit. 1806).
A. candicans Pers. R. 3835 (Sch. 1806).
A. odoratus Bull. R. 3847 (A. Brück. 1855).
A. nebularius Bat. R. 3864 (Sch. 1806).
A. glyciosmus Fr. R. 3869 (W. 1855).
A. rufus Scop. R. 3873 (F. 1855).
A. subdulcis Bull. R. 3876 (Sch. 1806).
A. volemus Fr. R. 3880 (W. 1855).
A. deliciosus L. R. 3894 (Lk. 1795).
80. *A. vellereus* Fr. R. 3895 (F. 1855).
A. piperatus L. R. 3896 (T. 1788).
A. pergamenus Sw. R. 3898 (Lk. 1795).
A. torminosus Schäf. R. 3918 (F. 1855).
A. scrobiculatus Scop. R. 3919 (F. 1855).
A. brevipes Bull. R. 3923 (F. 1855).
A. personatus Fr. R. 3928 (F. 1855).
A. graveolens Pers. R. 3934 (W. 1855).
A. chrysenterus Bull. R. 2940 (Fleischer 1844).

989. *Agaricus sulphureus* Bull. R. 3945 (W. 1855).
 90. *A. vaccinus* Pers. R. 3957 (Lk. 1795).
 A. Columbetta Fr. R. 3959 (Sch. 1806).
 A. rutilans Schaef. R. 3963 (F. 1855).
 A. Russula Schaef. R. 3964 (Lk. 1795).
 A. equestris L. R. 3973 (F. 1855).
 A. conicus Scop. R. 3978 (Sch. 1806).
 A. puniceus Fr. R. 3980 (F. 1855).
 A. coccineus Pers. R. 3982 (Sch. 1806).
 A. virgineus Jacq. R. 3990 (F. 1855).
 A. pratensis Pers. R. 3991 (Lk. 1795).
 1000. *A. limacinus* Scop. R. 3997 (Sch. 1806).
 A. hypothejus Fr. R. 4000 (W. 1855).
 A. eburneus Bull. R. 4004 (Sch. 1806).
 A. mucidus Schr. R. 4008 (W. 1855).
 A. melleus Vahl. R. 4011 (Sch. 1806).
 A. granulosus Bat. R. 4023 (Sch. 1806).
 A. cepaestipes Sow. R. 4024 (Lehmeyer 1855).
 A. cristatus Fr. R. 4030 (Sch. 1806).
 A. excoriatus Schaef. R. 4036 (W. 1855).
 A. procerus Scop. R. 4037 (Sch. 1806).
 10. *A. vaginatus* Bull. R. 4038 (F. 1855).
 A. rubescens Fr. R. 4044 (W. 1855).
 A. pantherinus DC. R. 4049 (Sch. 1806).
 A. muscarius L. R. 4050 (T. 1788). S. 140.
 A. phalloides Fr. R. 4052 (Sch. 1806).

* * *

1015. *Wüstneia sordida* Rab. (W. 1859) vergl. Archiv
 XIII. S. 3. — Wo diese Pilzgattung einzureihen
 sei, habe ich noch nicht in Erfahrung bringen
 können.

X. Schluß.

(Berichtigungen und Zusätze.)

Hiermit hätte ich den vaterländischen Botanikern die erste vollständige, d. h. alle Pflanzenklassen und Landestheile umfassende Flora von Mecklenburg vorgelegt. Ich weiß sehr wohl, daß diese Arbeit nicht ohne Mängel ist, bitte aber, sie deswegen nicht etwa sogleich in Haufen und Bogen zu verwerfen, sondern wenigstens zu versuchen, ob nicht durch Beseitigung derselben in ihr ein Fundament für einen weiteren Fortbau gewonnen werden könnte. Begründete Kritiken und Berichtigungen, die man mir *sine ira* giebt, werden mir immer willkommen sein. Ich bitte im Interesse der Sache recht sehr um solche, und damit man sehe, daß es mir mit dieser Bitte Ernst sei, will ich selbst mit Angabe der Berichtigungen und Zusätze, die sich noch während des Druckes mir herausgestellt haben, hier vorangehen. Dieselben scheinen zahlreicher, als sie es in der That sind, weil die Anlage meiner Arbeit es mit sich bringt, daß ein und derselbe Fehler in verschiedenen Capiteln wiederkehrt, also an mehreren Stellen berichtigt werden muß, was in den späteren Abschnitten zum Theil während des Druckes schon geschehen ist. Manche derselben hätte ich vermieden, wenn ich den IX. Abschnitt, die systematische Aufzählung der Pflanzen, zuerst definitiv abgeschlossen und, da er die Grundlage für die übrigen Capitäl bildet, dem Ganzen vorangestellt hätte, was mir auch noch in anderer Weise die Arbeit wesentlich erleichtert haben würde; ich erwähne diesen Umstand, damit vielleicht Andere durch diese von mir zu meinem Nachtheile gemachte Erfahrung bei ähnlichen Arbeiten vor einem gleichen Miß-

griffe sich warnen lassen. Die Berichtigungen und Zusätze, welche ich jetzt schon zu geben habe, sind folgende:

§. 18 Col. 2 unten ist hinter *Viola Rivin.* einzuschreiben: *Viola lactea.*

§. 19 Col. 1 ist *Elatine triandra* zu streichen und Col. 2 das Wort *Moenchii* etwas einzurücken und statt *Potentilla opaca* zu lesen „*Viola*“ *opaca*; ebenba ist hinter *Rumex palustris* einzuschreiben *Polygonum mite* und *Hydropiper*, zu streichen aber *Salix angustifolia*.

§. 23 ist hinter *Salix Russel.* einzuschreiben: *Smithiana*.

§. 30 Z. 4 v. u. hinter „Erdbeeren“ einzuschreiben: auch im holländischen heißen dieselben *aardbezie*.

§. 31 ist hinter dem Artikel „Broekwied“ einzuschreiben: „Buchweizen s. Archiv VIII. §. 137.

§. 36 Z. 1 v. u. *Molinia* statt *Melica*.

§. 37 Z. 10 v. o. *Stellaria* st. *Alsine*.

Z. 4 v. u. ist hinter *Ledum palustre* einzuschreiben: (vergl. §. 269 unten).

§. 38 hinter *Quitschenboom* ist hinzu zu fügen: (*Sorbus Aucuparia*).

§. 38 Z. 7 v. u. hinter (Franz) einzuschalten: „*Convallaria Polygonatum* und.“

§. 39 Z. 9 v. o. *Ribes* st. *Rubus*.

Z. 7 u. 6 v. u. sind zu streichen die Worte „(vielleicht aus“ u. „corrupirt)“.

§. 41 Z. 5 v. o. *cathartica*.

§. 49 Col. 1 Z. 8 v. u. *carinata* st. *coronata* u. Col. 2 Z. 7 v. u. *ochroleuca*.

§. 53 Col. 1 ist hinter *Dianthus aren.* einzuschreiben: *Geranium sylvaticum*, Col. 2 aber *Narthecium ossifragum* zu streichen.

§. 91 Z. 3 v. o. statt *Linnaei* Griew. (*officinalis* und *anglica* L.), zu lesen: „*Cochlearia anglica* L.“

§. 93 Z. 5 v. o. sind die Worte: *c. var.?* *filiformis* zu streichen.

§. 96 Z. 14 v. o. *der* selben st. denselben.

§. 123 Z. 14 v. o. *Verbascum phlomoides* st. *Thapsus*.

§. 133 Z. 12 v. u. ist *Viburnum Opulus* zu streichen.

§. 135 Z. 5 v. u. l. Wasser-Schierling.

§. 144 ist hinter Z. 3 einzuschalten: 1860 Eggers Flora excurs.

§. 148 Z. 7 v. o. hinter *Arundo varia* einzuschreiben: *Meesia Albertini*.

§. 150 Z. 8 v. u. hinzuzufügen: *Stilephora rhizoides*.

Z. 5 v. u. statt „seit 1814 ff.“ zu lesen: seit 1813 praktischer Arzt in Ludwigslust und gestorben daselbst am 30. März 1860; einen ausführlicheren Nekrolog über ihn findet man in dem vorliegenden XIV. Jahrgange dieses Archivs.

§. 151 Z. 3 v. o. *Fucus serratus* zu streichen.

§. 153 Z. 14 v. u. l. 95 Pilzarten.

Hinter dem Artikel „Dreves“ ist einzuschreiben:

Eggers G., Lieutenant in Neustrelitz, veröffentlichte während des Druckes dieser Arbeit eine „Flora excursoria. Botanisches Taschenbuch zum Gebrauch auf Excursionen in Mecklenburg. Neustrelitz 1860.“ 12mo. 195 S. 10 Sgr.; dieselbe ist nach dem linneischen Systeme geordnet, und hat mehr einen populären als einen kritischen Zweck.

§. 154 Z. 8 v. u. l. 359 Pilzarten.

§. 155. Nach Flörke trägt auch die in den süddeutschen Alpen wachsende *Primula Flörkeana* Schr. den Namen.

§. 156 Z. 3 v. o. ist *Lepturus incurvatus* zu streichen und in Z. 13 v. o. zu versetzen, da nach einem Briefe G. Brückners an mich d. d. 8. April 1845 dies Gras damals schon von Häder in M. entdeckt war.

§. 156 Z. 12 v. u. *Stilephora rhizoides* zu streichen.

§. 157 Koch F., Baumeister, bereicherte unsere Flora auch noch durch die Entdeckung von 29 mikroskopischen Algen, vergl. §. 194 Anm.

§. 159 Z. 11 v. o. ist *Narthecium ossifragum* einzuschreiben.

§. 159. Nach v. Dörken benannte F. Schultz ein von jenem auf dem Monte Rosa entdecktes Laubmoos *Grimmia Oertzeniana* (Syll. Ratisb. 1828 p. 124), und auch eine Mikrolepidoptere trägt nach ihm den Namen *Eudorea Oertziella* (Archiv IV. 13).

§. 160. A. Schmidt ist am 23. März 1860 in seinem 92. Lebensjahre gestorben.

§. 162 Z. 12 v. u. Meesia Albertini zu streichen.

§. 163 Z. 13 v. o. l. 220 neue Arten.

§. 173 Z. 9 v. u. l. 78.

§. 174 Z. 15 v. o. l. 106 Arten st. 108.

§. 179 ff. Tabelle A. ist folgendermaßen zu ändern:

Col. 1 Phan. zu lesen: Griewant 17. Häcker 1. Nolte 4. — S. 1023.

Col. 3 M. Fr.: Beuthe 1. Schults 45.

Col. 5 Alg.: Koch F. 29. — S. 140.

Col. 7 Fungi: Ditmar 95. Fiedler 359. Schults 220. Timm
Z. 78. Tode 106. — S. 1015.

Col. 8 S. S. Beuthe 6. Ditmar 108. Fiedler 385. Griewant
18. Häcker 3. Koch F. 30. Nolte 4. Schults 375. Timm 643. Tode
106. — S. 2634.

Diese Aenderungen der Zahlen bitte ich auch bei den statistischen
Angaben §. 187 ff. zu berücksichtigen.

§. 182 Tabelle B. ist zu ändern.

Col. 1 Phan. VI. 62. — S. 1023.

Col. 5 Alg. IX. 49. — S. 140.

Col. 7 Fung. II. 121. IV. 340. V. 46. IX. 336. — S. 1015.

Col. 8 S. S. II. 396. IV. 614. V. 93. VI. 87. IX. 419. —
S. 2634.

§. 184 Z. 2 v. o. lies statt Sanguisorbeae und der dahin ge-
hörigen Zahlen: (S. G.)

Sanguisorbeae 4 . . . 4 . 4

Pomaceae 5 . 1 . . 6 . 6

§. 186 bei Lilaceae ist aus der Columne der zweifelhaften Arten
die Zahl 1 zu streichen, und dafür in der ersten Col. st. 12 zu lesen 13.
Die Summe der eingebor. Monocotyledonen ist demnach 245, die
der zweifelhaften nur 1.

§. 191 Z. 16 v. o. Narthecium ossifr. zu streichen; Z. 4 v.
u. st. 94 zu lesen 93.

§. 192 Z. 5 v. o. l. „Isstriens“ statt Italiens.

§. 217 Z. 10 v. u. l. meinem st. mein.

§. 252 No. 358. Hr. Arndt fand am 21. April d. Js. im
Finkenthaler Holz bei Onoien zwei Exemplare blühenden Epheus.

S. 362—376, wo mehrere Male Ditmar 1812 steht, ist statt jener Zahl 1817 zu lesen. Die vier von Ditmar bearbeiteten Hefte von Sturms Flora sind nämlich in verschiedenen Jahren erschienen, und haben erst im J. 1817 einen Gesamttitel erhalten; da ich S. 153 letzteres Jahr, als das, worin jene Arbeit veröffentlicht ist, ausgegeben habe, muß dies auch hier, um Irrthümern vorzubeugen, festgehalten werden.

S. 362 in der Anm. Z. 3 l. 158 ff. statt 160 ff.

S. 372 in der Anm. lies 651.

* *

Sollte es möglich sein, die vorliegende Arbeit auf dem von mir angedeuteten Wege zu einem von unsern botanischen Autoritäten anerkannten floristischen Codex umzugestalten, der die Resultate der sämmtlichen bisherigen Forschungen im Bereiche der mecklenburgischen Flora umfaßte, so würde man letztere für die Zukunft vor neuen Verwirrungen wohl am besten dadurch bewahren können, daß (etwa von Seiten unseres Vereins) ein Normal-Herbarium angelegt würde, in welchem alle neuen Entdeckungen, welche in der Landesflora Aufnahme beanspruchten, niedergelegt werden müßten. Andere deutsche Länder sind uns in dieser zweckmäßigen Einrichtung schon vorangegangen, warum sollten wir zurückbleiben?

Register der Gattungsnamen.

(Wo mehrere Seitenzahlen stehen, bezieht sich die letzte auf die systematische Aufzählung der Pflanzen in Abschnitt IX.)

Abies 301.
Acer 228.
Achillea 258.
Achnanthes 195. 347.
Achyrophorus 263.
Acladium 369.
Aconitum 208.
Acorus 306.
Acremonium 368.
AcrospERMum 378.
Acrostalagmus 369.
Actaea 208.
Actidium 373.
Actinococcus 195.
Actinocyclus 347.
Actinothyrium 371.
Adonis 189.
Adoxa 253.
Aecidium 364.
Aegagropila 349.
Aegerita 380.
Aegopodium 249.
Aesculus 133.
Aethalium 378.
Aethusa 250.
Agaricus 389.
Agrimonia 241.
Agrostemma 223.
Agrostis 319.
Ahnfeltia 351.
Aira 191. 321.
Ajuga 288.
Alchemilla 241.
Alicularia 346.
Alisma 302.
Alliaria 214.
Allium 311.
Alnus 301.
Alopecurus 191. 319.
Alsine 225.
Althaea 227.
Alyssum 189. 215.
Amaranthus 292.
Amblyodon 336.
Ammophila 320.
Ampelopsis 133.

Amphipleura 195.
Amphitetras 195.
Amphora 195.
Amygdalus 133.
Anabaina 348.
Anacalypta 332.
Anacamptis 308.
Anagallis 290.
Anchusa 275.
Andromeda 269.
Anemone 189. 204.
Aneura 193. 343.
Angelica 251.
Anixia 378.
Anomodon 339.
Antennataria 377.
Anthemis 258.
Anthericum 310.
Anthoceros 343.
Anthoxanthum 319.
Anthriscus 252.
Anthyllis 231.
Antirrhinum 280.
Apera 319.
Apium 114. 138. 249.
Aquilegia 208.
Arabis 212.
Archangelica 251.
Arctostaphylos 269.
Arcyria 378.
Arenaria 225.
Aristolochia 133. 297.
Armeria 291.
Armoracia 215.
Arnica 259.
Arnoseris 262.
Arrhenatherum 321.
Artemisia 258.
Arthrimum 369.
Arum 306.
Asarum 191. 297.
Ascobolus 382.
Ascochyta 371.
Ascophora 370.
Asparagus 114. 309.
Aspergillus 369.

Asperugo 275.
Asperula 253.
Aspidium 327.
Asplenium 326.
Aster 190. 256.
Asterophora 380.
Astragalus 189. 233.
Athyrium 327.
Atriplex 190. 294.
Atropa 139. 277.
Avena 114. 321.
Aulacomnion 336.
Auliscus 348.
Auricularia 385.

Bacillaria 346.
Baeomyces 358.
Ballota 288.
Bangia 196.
Barbarea 212.
Barbula 332.
Bartramia 336.
Batrachium 10. 205.
Batrachospermum 195.
Bellis 256.
Berberis 133. 209.
Berula 250.
Beta 114. 190.
Betckea 147.
Betonica 288.
Betula 301.
Biatora 358.
Bidens 257.
Biotia 256.
Bispora 366.
Blandowia 148.
Blasia 343.
Blechnum 326.
Blitum 293.
Boletus 388.
Borago 117. 275.
Botrychium 328.
Botrydium 350.
Botrytis 369.
Bovista 380.

Brachypodium 323.
 Brassica 114. 214.
 Briza 321.
 Bromus 323.
 Bryonia 190. 246.
 Bryopogon 362.
 Bryopsis 196.
 Bryum 193. 335
 Bulgaria 382.
 Bunias 218.
 Bupleurum 250.
 Butomus 302.
 Buxbaumia 338.
 Buxus 133.
 Byssocladium 368.

Cakile 218.
 Calamagrostis 320.
 Calamintha 285.
 Calendula 260.
 Calla 306.
 Callithamnion 196.
 351.
 Callitriche 246.
 Calluna 269.
 Calocera 381.
 Calothrix 348.
 Caltha 207.
 Calycanthus 133.
 Calycium 357.
 Calypogeia 344.
 Camelina 189. 216.
 Campanula 190. 267.
 Campylodiscus 347.
 Cannabis 298.
 Cantharellus 388.
 Capsella 217.
 Cardamine 213.
 Carduus 260.
 Carex 191. 316.
 Carlina 261.
 Carpinus 298. 4
 Carum 249.
 Castanea 133.
 Caulis 251.
 Cenangium 382.
 Centaurea 261.
 Centunculus 290.
 Cephalanthera 308.
 Cephalotrichum 369.
 Ceramium 351.
 Cerastium 225.

Ceratium 370.
 Ceratodon 333.
 Ceratonēis 346.
 Ceratophyllum 246.
 Cetraria 361.
 Chaerophyllum 114.
 252.
 Chaiturus 288.
 Chamagrostis 191.
 Chara 74. 354.
 Chelidonium 210.
 Chenopodina 292.
 Chenopodium 190.
 293.
 Chilosecyphus 344.
 Chloridium 368.
 Chondrilla 264.
 Chondrus 196. 352.
 Chorda 197. 352.
 Chordostylum 371.
 Chrysanthemum 258.
 Chrysosplenium 248.
 Cicendia 272.
 Cichorium 114. 262.
 Cicuta 249.
 Cinclidotus 338.
 Cineraria 259.
 Cionium 379.
 Circaea 244.
 Cirsium 260.
 Cladium 314.
 Cladonia 358.
 Cladosporium 369.
 Cladostephus 196.
 Clavaria 381.
 Clematis 133.
 Climacium 339.
 Clinopodium 285.
 Onidium 250.
 Cochlearia 215.
 Cocconēis 195. 347.
 Cocconema 347.
 Colchicum 312.
 Collarium 367.
 Collema 356.
 Collomia 273.
 Colutea 133.
 Comarum 233.
 Conferva 195. 349.
 Coniocybe 357.
 Conium 252.
 Conoplea 366.

Convallaria 310.
 Convolvulus 273.
 Conyza 190.
 Corallorrhiza 309.
 Cordyceps 377.
 Coremium 369.
 Cornicularia 362.
 Cornus 133. 252.
 Coronilla 189.
 Corrigiola 247.
 Corticium 385.
 Corydalis 210.
 Corylus 114. 298.
 Corynephorus 321.
 Coscinodiscus 347.
 Cotula 190.
 Crambe 218.
 Crataegus 133. 242.
 Craterellus 386.
 Craterium 379.
 Crepis 190. 265.
 Cruoria 195.
 Cucubalus 223.
 Cupularia 379.
 Cuscuta 273.
 Cyathus 380.
 Cydonia 133. 190.
 Cylindrospermum
 195. 348.
 Cynanchum 271.
 Cynoglossum 275.
 Cynosurus 322.
 Cyperus 313.
 Cyphella 381.
 Cyripedium 191.
 Cystoclonium 196.
 Cystopteris 327.
 Cytispora 371.
 Cytisus 133. 189. 231.

Dacryomyces 366.
 Dactylis 322.
 Dactylium 369.
 Daedalea 386.
 Daphne 296.
 Datura 277.
 Daucus 114. 251. ^(q3)
 Delesseria 352.
 Delphinium 208.
 Dematium 367.
 Dentaria 214.
 Depazea 371.

Dermatea 367.
 Desmarestia 197. 353.
 Dethardingia 153.
 Deutzia 133.
 Diachea 379.
 Dianthus 189. 221.
 Diatoma 346.
 Dieranum 333.
 Dictydium 379.
 Dictyocha 195. 348.
 Dictyosiphon 196.
 Diderma 379.
 Didymium 379.
 Diervillia 133.
 Digitalis 279.
 Diphyscium 338.
 Diplonëis 348.
 Diplostromium 196.
 Diplotaxis 189. 214.
 Dipsacus 117. 255.
 Distichium 332.
 Ditiola 367.
 Ditmaria 153.
 Dothidea 373.
 Draba 215.
 Draparnaldia 349.
 Drosera 220.
 Dumontia 196.

Echinops 260.
 Echinopsilon 293.
 Echinosperrum 275.
 Echium 276.
 Ectocarpus 196. 350.
 Elachista 197.
 Elaphomyces 380.
 Elatine 226.
 Elsholtzia 285.
 Elymus 325.
 Empetrum 297.
 Encalypta 338.
 Endogone 378.
 Enteromorpha 196.
 351.
 Epichysium 370.
 Epicoccum 367.
 Epilobium 190. 244.
 Epimedium 209.
 Epipactis 309.
 Epipogon 308.
 Epochnium 367.
 Equisetum 329.

Eranthis 208.
 Erica 269.
 Erigeron 256.
 Erineum 367.
 Eriophorum 315.
 Erodium 229.
 Ervum 114. 235.
 Eryngium 249.
 Erysibe 377.
 Erysimum 214.
 Erythraea 272.
 Eunotia 195. 346.
 Eupatorium 255.
 Euphorbia 297.
 Euphrasia 283.
 Eurotium 370.
 Evernia 362.
 Evonymus 230.
 Exacum 272.
 Exeipula 372.
 Exidia 381.
 Exosporium 366.

Fagus 298.
 Falcaria 249.
 Farsetia 215.
 Fegatella 343.
 Festuca 323.
 Ficaria 207.
 Fiedleria 154. 193.
 Filago 257.
 Fissidens 342.
 Fistulina 386.
 Floerkea 155.
 Fontinalis 338.
 Fossombronia 343.
 Fragaria 113. 239.
 Fraxinus 271.
 Frullania 343.
 Fucus 128. 353.
 Fumaria 189. 211.
 Funaria 331.
 Furcellaria 351.
 Fusarium 366.
 Fusidium 366.
 Fuisporium 368.

Gagea 311.
 Galanthus 309.
 Galea 233.
 Galeobdolon 286.
 Galeopsis 286.

Galium 190. 254.
 Gallionella 347.
 Gaudinia 324.
 Geaster 380.
 Gelidium 352.
 Genista 128. 230.
 Gentiana 271.
 Geocalyx 194.
 Geoglossum 381.
 Geotrichum 368.
 Geranium 228.
 Geum 236.
 Glaucium 210.
 Glaux 291.
 Glechoma 285.
 Gleditschia 133.
 Glyceria 322.
 Gnaphalium 257.
 Gomphidius 389.
 Gomphonema 195.
 Gonosporium 369.
 Goodyera 309.
 Grammatophora 347.
 Grandinia 386.
 Graphis 355.
 Gratiola 279.
 Grimmia 337.
 Grischowia 178.
 Gumbelia 337.
 Gymnadenia 307.
 Gymnostomum 333.
 Gypsophila 189. 221.

Hagenia 362.
 Halianthus 225.
 Halidrys 353.
 Halorrhiza 197.
 Haplomitrium 194.
 Haplotrichum 369.
 Hedera 252.
 Heleocharis 191. 314.
 Helvella 385.
 Helianthemum 218.
 Helianthus 114. 257.
 Helichrysum 257.
 Helicomycetes 366.
 Helleborus 208.
 Helminthia 263.
 Helminthosporium 369.
 Helosciadium 249.
 Helotium 381.

Hepatica 204.
 Heracleum 251.
 Herminium 308.
 Herniaria 247.
 Hesperis 214.
 Heteractis 195.
 Hieracium 190. 265.
 Hierochloa 318.
 Hildebrandtia 197.
 Himanthalia 353.
 Hippophaë 296.
 Hippuris 245.
 Holcus 321.
 Holosteum 225.
 Honckenya 225.
 Hordeum 114. 325.
 Hormidium 195.
 Hormiscia 196.
 Hottonia 291.
 Humulus 116. 298.
 Hydnum 386.
 Hydrilla 191.
 Hydrocharis 302.
 Hydrocotyle 249.
 Hydrodictyon 350.
 Hymenostomum 333.
 Hyoscyamus 277.
 Hypericum 228.
 Hypha 367.
 Hyphelia 380.
 Hypnum 339.
 Hypochaeris 263.
 Hypoglossum 352.
 Hypoxylon 377.
 Hysterium 372.

Jasione 267.
 Ilex 270.
 Illecebrum 247.
 Illosporium 377.
 Imbricaria 356.
 Impatiens 229.
 Inula 190. 256.
 Iris 309.
 Iripex 386.
 Isaria 370.
 Isnardia 190.
 Isoetes 192.
 Juglans 116.
 Juncus 128. 191. 312.
 Jungermannia 193.
 344.

Juniperus 301.
 Jurinea 261.

Kamptzia 156.
 Kerria 133.
 Knautia 255.
 Kochia 293.
 Koeleria 320.

Labrella 371.
 Lactuca 264.
 Laminaria 353.
 Lamium 286.
 Lampsana 262.
 Lappa 261.
 Laserpitium 251.
 Lathraea 284.
 Lathyrus 235.
 Leangium 380.
 Leathesia 197.
 Lecanidion 382.
 Lecanora 356.
 Lecidea 357.
 Ledum 269.
 Leersia 319.
 Leibleinia 195.
 Lejeunia 343.
 Lemna 305.
 Lenzites 388.
 Leocarpus 379.
 Leontodon 262.
 Leonurus 288.
 Leotia 384.
 Lepidium 217.
 Lepidozia 344.
 Lepigonum 224.
 Leptobrymenium 338.
 Leptostroma 371.
 Lepturus 325.
 Leskea 339.
 Leucodon 338.
 Leucojum 309.
 Levisticum 250.
 Libanotis 250.
 Licea 378.
 Lichnia 197.
 Ligustrum 133. 271.
 Limnanthemum 271.
 Limosella 282.
 Linaria 190. 280.
 Linkia 158.
 Linnæa 253.

Linosyris 190.
 Linum 115. 226.
 Lioclaena 344.
 Liparis 309.
 Listera 191. 309.
 Lithospermum 276.
 Littorella 292.
 Lobaria 357.
 Lobelia 267.
 Lolium 325.
 Lonicera 133. 253.
 Lophium 373.
 Lophoclea 344.
 Lotus 13. 233.
 Lunularia 343.
 Lupinus 114.
 Luzula 313.
 Lychnis 223.
 Lycium 133. 277.
 Lycogala 378.
 Lycoperdon 380.
 Lycopodium 329.
 Lycopsis 276.
 Lycopus 285.
 Lyngbya 195.
 Lysimachia 290.
 Lythrum 190.

Madotheca 343.
 Majanthemum 310.
 Malachium 225.
 Malaxis 309.
 Malva 226.
 Marchantia 343.
 Marrubium 288.
 Mastigobryum 193.
 344.
 Matricaria 258.
 Medicago 231.
 Meesia 336.
 Melampyrum 190. 282.
 Melanconium 366.
 Melandrium 223.
 Melica 321.
 Melilotus 232.
 Melosira 195.
 Mentha 284.
 Menyanthes 271.
 Mercurialis 298.
 Merismopodia 348.
 Merulius 386.
 Mesogloia 197. 352.

Mespilus 30. 113.
Metzgeria 343.
Micaraea 356.
Microcoleus 348.
Microstylis 191.
Milium 320.
Mitrlula 381.
Mnium 334.
Moehringia 225.
Moenchia 189.
Molinia 322.
Monilia 368.
Monotropa 270.
Montia 247.
Morchella 385.
Morus 116 f.
Mucor 370.
Muscari 312.
Mycogone 367.
Myosotis 276.
Myosurus 205.
Myrica 301.
Myrionema 196.
Myriophyllum 245.
Myriotheceum 366.
Myxotrichum 369.

Najas 191. 305.
Narcissus 309.
Nardus 326.
Narthecium 191. 312.
Nasturtium 211.
Navicula 195. 346.
Neckera 339.
Nemalion 351.
Nemaspora 371.
Neottia 309.
Nepeta 285.
Nephrodium 327.
Neslea 217.
Nicandra 277.
Nicotiana 114.
Nigella 189.
Nitella 197. 353.
Nonnea 275.
Nostoc 348.
Nuphar 209.
Nyctalis 388.
Nymphaea 209.

Obione 293.
Odontites 283.

Oedogonium 349.
Oenanthe 250.
Oenothera 117. 244.
Oidium 368.
Omphalodes 275.
Ononis 231.
Onopordon 261.
Onygena 380.
Opegrapha 355.
Ophioglossum 328.
Ophrys 308.
Orchis 191. 306.
Origanum 285.
Ornithogalum 310.
Ornithopus 233.
Orobanche 190. 283.
Orobis 235.
Orthotrichum 193.
 337.
Oscillaria 348.
Osmunda 328.
Oxalis 229.
Ozonium 367.
Ozothallia 197.

Palmella 348.
Paludella 336.
Panicum 318.
Papaver 210.
Parietaria 298.
Paris 310.
Parmelia 357.
Parnassia 221.
Pastinaca 251.
Paxillus 389.
Pedicularis 282.
Pellia 343.
Peltigera 357.
Penicillium 368.
Peplis 246.
Perichaena 378.
Periconia 369.
Peridermium 365.
Perisporium 377.
Peronospora 368.
Persica 113.
Pertusaria 355.
Pestalozzia 373.
Petasites 190. 256.
Pucedanum 251.
Peziza 382.
Phacidium 372.

Phalaris 318.
Phallus 380.
Phaseum 331.
Phaseolus 113.
Philadelphus 133.
Phlebia 385.
Phleum 319.
Phoenixopus 264.
Phoma 371.
Phormidium 195.
Phragmidium 366.
Phragmites 128. 320.
Phragmotrichum 366.
Phycodrys 352.
Phycolapathum 196.
Phycoseris 351.
Phyllactidium 196.
Phyllerium 367.
Phyllitis 197.
Phyllophora 351.
Physactis 195. 349.
Physalis 277.
Physarum 379.
Physcomitrium 331.
Physoderma 364.
Phyteuma 267.
Picris 262.
Pilobolus 371.
Pilularia 329.
Pimpinella 249.
Pinguicula 289.
Pinnularia 347.
Pinus 133. 301.
Pistillaria 381.
Pisum 235.
Placodium 355.
Plagioclila 345.
Plantago 292.
Platanthera 191. 307.
Poa 322.
Podosphenia 195.
Polemonium 273.
Polyangium 380.
Polycnemum 293.
Polygala 189. 221.
Polygonum 115. 295.
Polypodium 327.
Polypogon 320.
Polyporus 386.
Polysiphonia 196. 352.
Polystichum 327.
Polystigma 373.

Polytrichum 338.
 Populus 133. 300.
 Poronia 377.
 Porphyra 196.
 Portulaca 247.
 Potamogeton 191. 302.
 Potentilla 239.
 Poterium 242.
 Pottia 193. 331.
 Preissia 343.
 Primula 290.
 Prismatocarpus 269.
 Prunella 288.
 Prunus 113. 236.
 Ptelea 133.
 Pteris 326.
 Ptilidium 343.
 Puccinia 365.
 Pulicaria 257.
 Pulmonaria 276.
 Pulsatilla 204.
 Punctaria 197.
 Pyramidium 193.
 Pyrenium 380.
 Pyrola 270.
 Pyrus 113. 243.

Quercus 298.

Racomitrium 193.
337.

Radiola 226.
 Radula 343.
 Radulum 386.
 Ramalina 362.
 Ranunculus 205.
 Raphanus 218.
 Raphidogloea 195.
 Rebouillia 343.
 Reseda 220.
 Reticularia 378.
 Rhabdonema 195.
 Rhacodium 369.
 Rhamnus 230.
 Rhinanthus 283.
 Rhizomorpha 367.
 Rhizosporium 362.
 Rhodomela 352.
 Rhus 138.
 Rhymovis 389.
 Rhynchospora 314.
 Rhytisma 373.

Ribes 114. 133. 248.
 Riccia 342.
 Rivularia 195. 349.
 Robinia 133.
 Roepera 160.
 Roestelia 365.
 Rosa 133. 241.
 Rubia 117.
 Rubus 113. 190. 237.
 Rudbeckia 257.
 Rumex 191. 294.
 Ruppia 304.
 Russula 388.

Sagina 189. 223.
 Sagittaria 302.
 Salicornia 293.
 Salix 21. 133. 191. 299.
 Salsola 292.
 Salvia 190. 285.
 Salvinia 192.
 Sambucus 252.
 Samolus 291.
 Sanguisorba 241.
 Sanicula 249.
 Saponaria 222.
 Saprolegnia 349.
 Sarcosecyphus 194.
 346.
 Sarothamnus 230.
 Saxifraga 248.
 Scabiosa 255.
 Scandix 251.
 Scapania 194. 345.
 Scheuchzeria 302.
 Schistidium 193. 337.
 Schizogonium 195.
 Schizonema 195.
 Schizophyllum 388.
 Schizosiphon 195.
 Schoberia 292.
 Schoenus 313.
 Schultzia 161.
 Schwerinia 178.
 Scirpus 191. 315.
 Scleranthus 247.
 Scleroderma 380.
 Sclerotium 377.
 Scorzonera 114. 190.
 263.
 Scrophularia 279.
 Scutellaria 288.

Sedum 247.
 Seligeria 193.
 Selinum 251.
 Sempervivum 131.
 248.
 Senebiera 189. 217.
 Senecio 190. 259.
 Sepedonium 368.
 Septoria 366.
 Serratula 261.
 Seseli 250.
 Setaria 318.
 Sherardia 253.
 Silene 189. 223.
 Silybum 260.
 Sinapis 214.
 Sisymbrium 214.
 Sium 250.
 Smilacina 310.
 Solanum 116. 277.
 Solidago 256.
 Sonchus 264.
 Sorbus 243.
 Sparassia 382.
 Sparganium 306.
 Spathulea 382.
 Specularia 269.
 Spergula 114. 224.
 Spergularia 224.
 Sphaacelaria 196.
 Sphaeria 373.
 Sphaerobolus 380.
 Sphaerococcus 196.
 352.
 Sphaeronema 371.
 Sphaeroplea 349.
 Sphagnocoetis 344.
 Sphagnum 330.
 Spiraea 133. 190. 236.
 Spiranthus 309.
 Spirogyra 350.
 Splachnum 331.
 Sporidesmium 366.
 Sporocadus 366.
 Sporodinia 370.
 Sporotrichum 368.
 Spumaria 378.
 Stachylidium 368.
 Stachys 287.
 Stannia 178.
 Staphylea 133.
 Statice 292.

Stegilla 373.
 Stellaria 189. 225.
 Stemonitis 379.
 Stenactis 190.
 Stereocaulon 361.
 Stereum 385.
 Sticta 357.
 Stictis 382.
 Stilbospora 366.
 Stilbum 370.
 Stilephora 197. 353.
 Stipa 320.
 Stratiotes 128. 302.
 Strelitzia 178.
 Striatella 195. 347.
 Sturmia 309.
 Stypocaulon 196.
 Succisa 255.
 Surirella 346.
 Sweertia 271.
 Symphoricarpos 133.
 Synphytum 190. 276.
 Syncyclia 347.
 Synedra 195. 346.
 Syringa 133.
 Syzygites 370.

Tabellaria 347.
 Tanacetum 258.
 Taphrina 367.
 Taraxacum 264.
 Taxus 301.
 Teesdalea 217.
 Tessella 195.
 Tetragonolobus 189.
 Tetraphis 338.
 Tetraspora 348.
 Teucrium 190. 289.
 Thalictrum 189. 203.
 Thelebolus 380.
 Thelephora 385.
 Thesium 296.
 Thlaspi 217.

Thrincia 262.
 Thuja 133.
 Thymus 285.
 Thysanomitrium 334.
 Thysselinum 251.
 Tilia 227.
 Timmia 169. 336.
 Tithymalus 297.
 Todea 175.
 Torilis 251.
 Torula 366.
 Tragopogon 263.
 Trametes 386.
 Trapa 69. 190. 244.
 Trematodon 333.
 Tremella 381.
 Trevirana 176.
 Trichia 378.
 Trichocolea 343.
 Trichoderma 380.
 Trichostomum 332.
 Trichothecium 368.
 Trientalis 290.
 Trifolium 114. 232.
 Triglochin 302.
 Triodia 321.
 Triphragmium 365.
 Triticum 114. 324.
 Trollius 207.
 Tuber 378.
 Tubercularia 366.
 Tubulina 378.
 Tulipa 310.
 Tulostoma 380.
 Turritis 212.
 Tussilago 256.
 Tympanis 382.
 Typha 305.
 Typhula 381.

Ulex 230.
 Ulva 196. 351.
 Ulmus 298.

Urceolaria 355.
 Uredo 362.
 Urtica 298.
 Usnea 362.
 Utricularia 289.


Vaccinium 111.
 128. 269.
 Valeriana 254.
 Valerianella 254.
 Vaucheria 196. 350.
 Verbascum 277.
 Verbena 289.
 Veronica 190. 280.
 Verpa 384.
 Verrucaria 355.
 Verticillium 369.
 Viburnum 33. 253.
 Vicia 114. 189. 234.
 Villarsia 271.
 Vinca 271.
 Viola 189. 218.
 Viscum 252.
 Vitis 115.
 Volutella 382.

Weigelia 133.
 Weisia 333.
 Wredowia 177.
 Wüstneia 177. 392.

Xanthium 190. 266.
 Xylostroma 367.

Zannichellia 191.
 305.
 Zea 115.
 Zeora 355.
 Zostera 128. 365.
 Zygnuma 350.
 Zygogonium 350.





Boll, Ernst/Flora von Meklenburg, in ge



3 5185 00089 5662



8 032919 990020

